

## پاسخ سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال و بیان ژن سایتوکاین‌های آنژیوژنیک خون به پیش‌آماده‌سازی با تمرین مقاومتی در مردان سالمند

سجاد کرمی<sup>۱</sup>، دکتر فرشته شهیدی<sup>۱</sup>، دکتر حمید رجبی<sup>۲</sup>، دکتر فرشته گلاب<sup>۳</sup>

۱) گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران. ۲) گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران. ۳) گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. نشانی مکاتبه‌ی نویسنده‌ی مسئول: تهران، لویزان، خ شهید شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، سجاد کرمی؛ e-mail:karami.sp@gmail.com

### چکیده

**مقدمه:** با افزایش سن اختلال در عملکرد اندوتلیال آغاز می‌شود و تمرین ورزشی می‌تواند موجب کاهش یا توقف آن گردد. این مطالعه با هدف بررسی پاسخ سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال و بیان ژن سایتوکاین‌های آنژیوژنیک خون به پیش‌آماده‌سازی با تمرین مقاومتی در افراد سالمند انجام گردید. **مواد و روش‌ها:** در این مطالعه نیمه تجربی ۲۴ مرد سالمند به صورت تصادفی به دو گروه برابر کنترل و تجربی، با تعداد افراد برابر، تقسیم شدند. نمونه خون در ۴ مرحله شامل: قبل و بعد از برنامه یک جلسه ای فعالیت مقاومتی (پرس سینه، ساق، اسکوات، پشت پا، جلو پا و سیم کش زیر بغل) و قبل و بعد از ۸ هفته تمرین مقاومتی (هر هفته سه جلسه تمرین شامل ۷ ست ۱۰ تکرار در مدت ۴۰ دقیقه حرکات جلو بازو، پشت بازو، جلو ران، پشت پا، قفسه سینه، سرشانه و شکم) جمع‌آوری شد. نمونه‌ها برای بررسی بیان ژن عامل القای هایپوکسی-۱-آلفا، عامل رشد اندوتلیال عروقی و هم‌چنین آنالیز فلوسیتومتری سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال سلول‌های تک هسته‌ای بافت خون استفاده شد. جهت بررسی تفاوت‌ها از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر طراحی مختلط ( $P < 0.05$ ) در نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‌ها: تعداد سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال گروه تجربی در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون ثانویه نسبت به گروه کنترل افزایش داشت. هم‌چنین بیان ژن عامل القای هایپوکسی-۱-آلفا گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در مراحل پس‌آزمون اولیه و پیش‌آزمون و پس‌آزمون ثانویه افزایش داشت. بیان ژن عامل رشد اندوتلیال عروقی گروه تجربی نیز نسبت به گروه کنترل، در مراحل پس‌آزمون اولیه و پیش‌آزمون و پس‌آزمون ثانویه، افزایش داشت. نتیجه‌گیری: این یافته‌ها پیشنهاد می‌کند که تمرین مقاومتی می‌تواند به عنوان یک عامل موثر در روند بهبود و بازسازی عروق پس از آسیب، به ویژه در سالمندان، مفید باشد.

**واژگان کلیدی:** تمرین مقاومتی، عامل القای هایپوکسی-۱-آلفا، عامل رشد اندوتلیال عروقی، سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال

دریافت مقاله: ۹۹/۸/۷ - دریافت اصلاحیه: ۹۹/۱۰/۳۰ - پذیرش مقاله: ۹۹/۱۲/۱۷

### مقدمه

فیزیولوژی یک سیستم قلب و عروق، اختلال در عملکرد اندوتلیال می‌باشد و از آنجایی که اختلال در عملکرد اندوتلیال مقدم بر گسترش آسیب‌های آترواسکلروزیس است و عوارض بالینی آن را تسریع می‌کند، بنابراین محافظت و ترمیم اندوتلیال می‌تواند از وقوع رخداد‌های قلبی-عروقی پیشگیری کند.<sup>۱</sup> در همین راستا مشخص شده است که

جمعیت سالمندان ایران به سرعت در حال افزایش است و کاهش فعالیت بدنی، ناشی از تغییر سبک زندگی، در سالمندی سبب تغییرات آناتومیک و فیزیولوژیک در اکثر بافت‌های بدن می‌شود.<sup>۱</sup> یکی از مهم‌ترین تغییرات

ساختار و عملکرد قلب و عروق همراه با افزایش آنژیوژنز، پرخونی واکنشی، تنش برشی، اتساع عروقی ناشی از جریان خون می‌شود.<sup>۷-۱۰</sup> مشخص شده است که بیان ژن HIF-1 $\alpha$  عضله اسکلتی بعد از فعالیت ورزشی مقاومتی افزایش یافته و همین امر سلول‌های ماهواره‌ای و فیبروبلاست‌ها را قادر به ترشح کموکاین‌هایی به منظور جذب EPCs به بافت ایسکمیک می‌کند.<sup>۱۱</sup> علاوه بر این تمرین مقاومتی حاد می‌تواند EPCs گردش خون و سایتوکاین‌های آنژیوژنیک که منجر به انطباق و محافظت عروقی می‌شود را افزایش دهد،<sup>۱۲</sup> و میزان افزایش به شدت تمرین مقاومتی وابسته و شدت بالاتر تمرین، باعث افزایش بیشتر در میزان EPCs گردش خون می‌شود.<sup>۱۳</sup> از سوی دیگر، برخی مطالعه‌ها کاهش EPCs گردش خون و سایتوکاین‌های آنژیوژنیک را به دنبال تمرین مقاومتی گزارش کرده‌اند.<sup>۱۴-۲۱</sup> بنابراین با توجه به تناقض در نتایج مطالعه‌ها و پیشینه انجام گرفته، فرض ما بر این است که سازگاری‌های کسب شده از تمرین مقاومتی در افراد سالمند، در روند فراخوانی EPCs از مغز استخوان به گونه‌ای متفاوت از سایر انواع تمرین‌های ورزشی اثر گذار باشد. با این رویکرد خواهیم توانست ابعاد جدیدی را در ارتباط با پیش آماده سازی با فعالیت ورزشی مقاومتی در افراد سالمند که ذاتاً مستعد تخریب کارکرد اندوتلیال و بیماری‌های عروقی هستند، ایجاد کنیم.

## مواد و روش‌ها

با توجه به استفاده از نمونه‌های انسانی و عدم کنترل کلیه متغیرهای مداخله‌گر، این مطالعه از نوع نیمه تجربی و به لحاظ لزوم اجرای برنامه‌ی مورد مطالعه، از نوع میدانی می‌باشد. با توجه به شرایط مطالعه و امکانات آسایشگاه خیریه کهریزک کرج، ۲۴ سالمند مرد از بین ۱۰۰ سالمند مرد تحت مراقبت‌های روزانه، به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (۶۳/۸۳±۲/۴۰ سال) و تجربی (۶۶/۴۲±۳/۷۰ سال)، با تعداد اعضاء برابر تقسیم شدند. داشتن سن در دامنه ۷۵-۶۵ سال و هم‌چنین توانایی انجام فعالیت ورزشی معیار ورود به مطالعه بود. سالمندان واجد شرایط پس از مطالعه و تکمیل رضایت‌نامه مورد پذیرش قرار گرفتند، هم‌چنین سالمندان با شرایط سابقه‌ی بیماری‌های ارتوپدی در ۵ سال گذشته، مشکل بینایی، بیماری‌های قلبی، عروقی و ریوی، دیابت، سابقه‌ی افتادن، استفاده کردن از عصا یا واکر، عدم

سلول‌های پیش ساز اندوتلیال (EPCi) توانایی بازگرداندن فعالیت از دست رفته‌ی ارگان‌ها را از طریق واسکولوژنز و آنژیوژنز در نواحی ایسکمیک و یا اندوتلیالیزاسیون مجدد در عروق آسیب دیده دارا هستند.<sup>۲۳</sup> در واقع این سلول‌ها به واسطه محرک‌هایی همچون ایسکمی، ورزش، سایتوکاین‌ها، کموکاین‌ها، هورمون‌ها و داروها می‌توانند از مغز استخوان به گردش خون سیستمی فراخوانده شده و در حفظ سلامت اندوتلیال، جلوگیری از اختلال اندوتلیال و هم‌چنین افزایش رگ زایی ایفای نقش کنند.<sup>۲</sup> مطالعه‌های بسیاری نشان داده‌اند که پیری منجر به کاهش تعداد و اختلال در مهاجرت EPCs از مغز استخوان می‌شود.<sup>۳-۵</sup> در مطالعه‌ای که با ایجاد آسیب شریان کاروتید در موش انجام گرفت، مشخص شد که توانایی ترمیم اندوتلیوم وابسته به سن می‌باشد. موش‌هایی که EPCs "جوان" (EPCs به دست آمده از افراد جوان) دریافت کرده بودند در مقایسه با کسانی که EPCs "پیر" (EPCs به دست آمده از افراد پیر) دریافت کرده بودند، توانایی بیشتری برای ترمیم اندوتلیوم آسیب دیده از خود نشان دادند.<sup>۶</sup> بر این اساس ارتباط بین سن و اختلال در عملکرد EPCs توسط تعدادی از مطالعه‌ها حمایت می‌شود.<sup>۵</sup> از عواملی که در فراخوانی EPCs از مغز استخوان به گردش خون سیستمیک نقش دارد، سایتوکاین‌های آنژیوژنیک خون می‌باشند.<sup>۴،۵</sup> مطالعاتی وجود دارد که ارتباط بین EPCs و عوامل محرک آنژیوژنز به ویژه عامل قابل القاء هیپوکسی-۱-آلفا (HIF-1 $\alpha$ <sup>ii</sup>) و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF<sup>iii</sup>) را گزارش می‌کند.<sup>۵-۸</sup> همان‌طور که بیان شد توانایی ترمیم اندوتلیال وابسته به سن می‌باشد و مشخص شده که فعالیت ورزشی هوازی در افزایش EPCs و بهبود عملکرد بیولوژیکی آن‌ها کارآمد است.<sup>۷</sup> هم‌چنین، تمرین‌های منظم هوازی اینتروال با دو شدت متفاوت سطوح بیان ژن سلول‌های پیش ساز اندوتلیال (CD34+ و VEGFR2+) را افزایش می‌دهد.<sup>۸</sup> بنابراین فعالیت ورزشی ممکن است به عنوان یک عامل غیردارویی، منجر به برگشت عملکرد اندوتلیال در سالمندان دارای آترواسکلروزیس شود.<sup>۲</sup> فعالیت ورزشی مقاومتی به گونه‌ای متفاوت از فعالیت‌های ورزشی هوازی باعث فعالیت ورزشی هوازی منجر به مهار روند کاهش وابسته به سن EPCs در ظرفیت نگه‌داری اندوتلیوم می‌شود.<sup>۶</sup> تغییر در

i- Endothelial Progenitor Cells

ii- Hypoxia - Inducible Factors-1

iii- Vascular Endothelial Growth Factor

وسیله فرمول، توده‌ی بدن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد به متر محاسبه گردید و WHR از تقسیم دور کمر به دور لگن محاسبه شد. درصد چربی بدن نیز توسط اندازه‌گیری چربی زیرپوستی بدن در سه نقطه‌ی سینه، شکم، و ران توسط کالیپر اندازه‌گیری شد. حداکثر قدرت بیشینه از تست یک تکرار بیشینه (IRM) استفاده شد که توسط روش‌های برآورد حداکثر قدرت توسط فرمول‌های برزیکی مشروط بر آنکه تعداد تکرارها نایستی بیشتر از ۱۰ بار باشد، استفاده شد (جدول ۱).

توانایی در راه رفتن مستقل و داشتن برنامه‌ی تمرینی ورزشی منظم، سابقه هرگونه مصرف داروی خاص، مکمل ورزشی، مواد آنتی‌اکسیدانی نظیر ویتامین C، E و کافئین از ورود به مطالعه منع شدند. یک هفته قبل از آغاز روند مطالعه، مشخصات پیکرسنجی آزمودنی‌ها از قبیل قد، وزن، درصد چربی، شاخص توده بدن، نسبت دور کمر به لگن و حداکثر قدرت بیشینه اندازه‌گیری شد.<sup>۲۲،۲۵</sup> اندازه‌گیری قد و وزن با استفاده از قد سنج و ترازوی دیجیتالی SECA مدل ۷۸۰ ساخت کشور آلمان انجام شد. شاخص توده‌ی بدن به

جدول ۱- ویژگی‌های پیکرسنجی آزمودنی‌ها در گروه‌های مورد مطالعه (M±SD)

گروه	کنترل	تمرین	P
تعداد	۱۲	۱۲	-
سن (سال)	۶۳/۸۳±۲/۴۰	۶۶/۴۲±۳/۷۰	۰/۳۸۴
قد (سانتی‌متر)	۱۶۳/۵۵±۴/۷۰	۱۶۶/۰۱±۶/۳۰	۰/۵۱۸
وزن (کیلوگرم)	۶۷/۸۰±۳/۸۰	۶۶/۰۷±۲/۴۰	۰/۴۶۹
شاخص توده بدن (کیلوگرم/متر مربع)	۲۵/۲۰±۷/۲۰	۲۴/۶۰±۴/۴۰	۰/۱۰۳
درصد چربی (درصد)	۱۹/۶۰±۵/۳۰	۱۹/۹۰±۸/۲۰	۰/۱۱۶
توده بدون چربی (کیلوگرم)	۵۱/۳۰±۶/۲۰	۵۲/۰۴±۳/۷۰	۰/۱۰۹
نسبت دور کمر به لگن (درصد)	۸۷/۴۰±۸/۴۰	۸۶/۵۰±۳/۳۰	۰/۱۲۱

آزمودنی‌های گروه تجربی آغاز شد.<sup>۲۴</sup> آزمودنی‌ها در گروه تجربی ۳ جلسه در هفته، هر بار به مدت ۴۰ دقیقه، برنامه تمرین مقاومتی را اجرا کردند (جدول ۲). در ۲ هفته ابتدایی؛ هر حرکت از برنامه ذکر شده در ۴ دور، ۱۰ تکرار و شدت برابر ۵۰-۴۵ درصد یک تکرار بیشینه همراه با وهله‌های استراحتی ۶۰ ثانیه‌ای در بین هر دور و وهله‌های استراحتی ۱۸۰ ثانیه‌ای در بین هر حرکت در مدت زمان ۲۵ دقیقه انجام گرفت. ضرب آهنگ تکرارها بوسیله مترونوم تنظیم گردید به نحوی که هر حرکت به مدت ۲ ثانیه (یک ثانیه درونگرا و یک ثانیه برونگرا) طول می‌کشید. به منظور رعایت اصل اضافه بار، در پایان هر دو هفته ۵ دقیقه به مدت زمان جلسه تمرین و ۵ درصد یک تکرار بیشینه، به شدت تمرین اضافه گردید. در مدت این ۸ هفته آزمودنی‌های گروه کنترل از شرکت در فعالیت‌های ورزشی، به جهت مداخله بر نتایج مطالعه، منع شدند و پس از گذشت ۸ هفته اجرای برنامه تمرینی و دقیقاً ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، نمونه خون پیش و بلافاصله پس از برنامه یک جلسه‌ای فعالیت مقاومتی به حجم ۵ سی‌سی خون سیاهرگی، در شرایط برابر با نمونه‌گیری

مطالعه‌ی حاضر در کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی بر اساس موازین اخلاقی وزرات علوم به تصویب رسیده است (IR.SSRI.REC.1397.2). از آزمودنی‌ها پس از ۱۰-۸ ساعت ناشتایی شبانه، راس ساعت ۸ صبح، در دمای ۲۸-۲۵ درجه سانتی‌گراد و رطوبت ۵۵-۵۰ درصد، ۵ سی‌سی خون سیاهرگی، به عنوان نمونه پیش از آزمون، از ورید دست غیر برتر، توسط متخصص آزمایشگاه گرفته شد. پس از ۱ ساعت آزمودنی‌های گروه تجربی و کنترل برنامه‌ی یک جلسه‌ای فعالیت مقاومتی (شامل ۶ حرکت پرس سینه، پشت ساق، اسکوات، پشت پا، جلو پا و سیم کش زیر بغل) را انجام دادند.<sup>۲۳</sup> شدت برنامه‌ی یک جلسه‌ای فعالیت مقاومتی برای هر آزمودنی جنبه اختصاصی داشته و توسط محقق؛ بر اساس ۷۰ درصد یک تکرار بیشینه برای هر فرد، تنظیم و تعدیل شد. پس از اتمام برنامه‌ی یک جلسه‌ای فعالیت مقاومتی، نمونه پس از آزمون شامل ۵ سی‌سی خون سیاهرگی، گرفته شد. برنامه ۸ هفته‌ای تمرین مقاومتی (شامل ۷ حرکت جلو بازو، پشت بازو، جلو ران، پشت پا، قفسه سینه، سرشانه و شکم) توسط

خون در قبل از ۸ هفته تمرین مقاومتی، از هر دو گروه گرفته شد. شدت برنامه یک جلسه‌ای فعالیت مقاومتی که پس از ۸ هفته تمرین مقاومتی انجام گرفت بر اساس یک تکرار بیشینه جدید تعدیل گردید (جدول ۲).

جدول ۲- جزئیات برنامه ۸ هفته تمرین مقاومتی و یک جلسه فعالیت مقاومتی مورد استفاده در مطالعه

برنامه یک جلسه فعالیت مقاومتی						
حرکت	دور	تکرار	۱ تکرار بیشینه %	استراحت هر ست (ثانیه)	استراحت هر حرکت (ثانیه)	
پرس سینه	۳	۱۰	۷۰	۶۰	۱۲۰	
پشت ساق	۳	۱۰	۷۰	۶۰	۱۲۰	
اسکوات	۳	۱۰	۷۰	۶۰	۱۲۰	
پشت پا	۳	۱۰	۷۰	۶۰	۱۲۰	
جلو پا	۳	۱۰	۷۰	۶۰	۱۲۰	
سیم کش زیر بغل	۳	۱۰	۷۰	۶۰	۱۲۰	
برنامه تمرین (هفته اول)						
حرکت	دور	تکرار	۱ تکرار بیشینه %	استراحت هر ست (ثانیه)	استراحت هر حرکت (ثانیه)	
جلو بازو	۴	۱۰	۴۵-۵۰	۶۰	۱۲۰	
پشت بازو	۴	۱۰	۴۵-۵۰	۶۰	۱۲۰	
جلو ران	۴	۱۰	۴۵-۵۰	۶۰	۱۲۰	
پشت پا	۴	۱۰	۴۵-۵۰	۶۰	۱۲۰	
قفسه سینه	۴	۱۰	۴۵-۵۰	۶۰	۱۲۰	
سر شانه	۴	۱۰	۴۵-۵۰	۶۰	۱۲۰	
شکم	۴	۱۰	۴۵-۵۰	۶۰	۱۲۰	
شدت و زمان تمرین مقاومتی در هر هفته						
هفته	% یک تکرار بیشینه		زمان کل تمرین (دقیقه)		هفته	
هفته اول - دوم	۴۵-۵۰		۴۰		هفته اول - دوم	
هفته سوم - چهارم	۵۰-۵۵		۴۰		هفته سوم - چهارم	
هفته پنجم - ششم	۵۵-۶۰		۴۰		هفته پنجم - ششم	
هفته هفتم - هشتم	۶۰-۶۵		۴۰		هفته هفتم - هشتم	
میانگین حجم برنامه ۸ هفته تمرین مقاومتی در هفته اول و هفته هشتم (کیلوگرم)						
حرکت	دور	تکرار	هفته اول (کیلوگرم)	هفته هشتم (کیلوگرم)		
جلو بازو	۴	۱۰	۱۰۱/۸۰±۴/۵۶	۱۴۷/۶۵±۳/۷۸		
پشت بازو	۴	۱۰	۱۱۲/۳۶±۵/۱۶	۱۵۶/۸۰±۴/۲۲		
جلو ران	۴	۱۰	۳۲۰/۵۵±۷/۸۴	۵۱۲/۲۱±۶/۳۳		
پشت پا	۴	۱۰	۱۱۷/۴۱±۵/۳۲	۱۸۴/۶۳±۲/۵۵		
قفسه سینه	۴	۱۰	۱۷۸/۲۲±۳/۸۶	۲۶۸/۱۵±۴/۳۵		
سر شانه	۴	۱۰	۱۲۸/۴۴±۴/۳۸	۲۰۸/۳۳±۳/۵۶		
شکم	۴	۱۰	۴۸۰/۷۵±۶/۳۶	۷۴۸/۲۴±۷/۴۷		
حجم برنامه تمرین (کیلوگرم)	-	-	۱۴۴۰	۲۲۲۶		

منظور بررسی میزان بیان ژن HIF-1 $\alpha$  و هم‌چنین آنالیز فلوسیتومتری EPCs بافت خون، به مرکز تحقیقات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران منتقل گردید.

با اجرای برنامه‌های تمرینی مورد نظر و هم‌چنین گرفتن نمونه‌های خونی در ۴ مرحله، روند میدانی مطالعه به پایان رسید و نمونه‌های خونی جهت انجام مراحل آزمایشگاهی، به

برای این منظور از کیت استخراج RNA (RNX) و کیت سنتز cDNA ساخت شرکت Bioneer (کشور کره جنوبی) استفاده شد. کلیه مراحل روی یخ و در زیر هود در شرایط استریل انجام گرفت. پس از استخراج RNA و سنتز cDNA واکنش PCR در حجم ۱۰ میکرولیتر انجام شد. در هر تیوب ۵ میکرولیتر 2x Master Mix و ۳ میکرولیتر آب حاوی DEPC و ۰/۵ میکرولیتر از پرایمر اضافه شد. در این مرحله cDNA روی یخ ذوب گردید و بعد از یک سانتیفریوژ کوتاه به هر تیوب ۱ میکرولیتر اضافه گردید. تکثیر DNA با استفاده از دستگاه ترموسایکلر (Comfort Compendorf، کشور آلمان) مطابق برنامه دمایی: مرحله اتصال ۱۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ ثانیه، مرحله سنتز ۴۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴ دقیقه، مرحله ذوب ساختار ثانویه ۵۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ ثانیه و مرحله نهایی غیر فعال‌سازی گرما با دمای ۹۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵ دقیقه اجرا شد. پس از تهیه نمونه‌های cDNA، میکروتیوب‌ها به دمای ۴ درجه سانتی‌گراد انتقال داده شدند. پرایمرها توسط شرکت سینا کلون طراحی گردید (جدول ۳).

شمارش تعداد EPCs (CD34+ و VEGFR2+) با روش فلوسیتومتری انجام شد. بطور خلاصه سلول‌های تک‌هسته‌ای توسط سانتیفریوژ کردن از خون هپارینه جدا شدند. سلول‌ها با آنتی‌بادی مونوکلنال مخصوص برای ۳۰ دقیقه تحت اثر سرم جنینی گوساله قرار گرفتند و سپس با بافر حاوی سالین فسفات، بافر شده و با آلبومین گاوی ۱ درصد شسته شدند. سلول‌ها با با کمک آنتی‌بادی مونوکلنال شامل آنتی‌بادی CD34+ و VEGFR2+ کنژوگه با فیکواری‌ترین (PE) (e-bioscience USA) رنگ آمیزی شده و پس از آن شسته و جداسازی اولیه بر مبنای پراکندگی جلویی و کناری سلول‌ها انجام شد. پس از جدا کردن جمعیت لنفوسیتی، با تعیین تعداد سلول‌های CD34+/VEGFR2+، تعداد EPCs تعیین شد. آنالیز فلوسیتومتری از طریق یک فلوسیتومتر Cell FACS calibur و نرم‌افزار Quest انجام شد و نتایج بر اساس تعداد در میکرولیتر ثبت گردید.

جهت بررسی بیان ژن HIF-1 $\alpha$  و VEGF؛ پس از جمع‌آوری نمونه‌های خون در لوله‌های حاوی ماده ضد انعقاد، استخراج RNA و سپس سنتز cDNA انجام گرفت و

جدول ۳- ترتیب پرایمرهای بکار رفته در این مطالعه برای تکثیر ژن‌های هدف (HIF-1 $\alpha$ ) و (VEGF) و ژن مرجع (b-actin)

شماره	نام پرایمر	توالی پرایمر 5'→3'	طول قطعه جفت باز	OD
		توالی 5'→3' (10-50 bp)		
۱	HIF-1 $\alpha$ -F	CTAGCCGAGGAAGAAGACTATGAAC	۲۳	۲-۴
۲	HIF-1 $\alpha$ -R	CACTGAGGTTGGTTACTGTTGG	۲۲	۲-۴
۳	VEGF - $\alpha$ -F	AAGGGGCAAAAACGAAAGCG	۲۰	۲-۴
۴	VEGF - $\alpha$ -R	GGAGGCTCCAGGGCATTAGA	۲۰	۲-۴
۵	b-actin-F	CATGTACGTTGCTATCCAGGC	۲۲	۲-۴
۶	b-actin-R	CTCCTTAATGTACGCACGAT	۲۱	۲-۴

Virtual Mode طراحی شده بوسیله شرکت کوربت آلمان به داده‌های عددی تبدیل شد. سپس از فرمول  $2^{-\Delta\Delta C_t}$  (۲ به توان منفی  $\Delta\Delta C_t$ ) در نرم افزار Excel استفاده کردیم و با در نظر گرفتن میزان بیان ژن گروه کنترل بعنوان عدد ۱، میزان برابری بیان ژن HIF-1 $\alpha$  و VEGF در گروه تجربی محاسبه گردید.

برای بررسی معنی‌داری تفاوت بین مقادیر متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه کنترل و تجربی، از تحلیل واریانس

ژن بتا اکتین ( $\beta$ -actin) به عنوان ژن مرجع برای نرمالیزه کردن واکنش استفاده شد. هر واکنش PCR با استفاده از رنگ SYBR Green در دستگاه 5 Corbett Plex HRM شرکت Corbett ساخت کشور استرالیا طبق دستورالعمل شرکت سازنده انجام گرفت و ۴۵ سیکل تکثیر انجام پذیرفت. جهت کمی سازی مقادیر بیان ژن مورد نظر، ابتدا داده‌های ضریب جذب نوری بدست آمده در دستگاه کوربت، توسط نرم‌افزار Rotor Gene 6000 series

## یافته‌ها

مشخصات دموگرافیک و اندازه‌گیری‌ها در جدول ۱ ارائه شده‌اند. داده‌های مربوط به مقادیر  $CD34+$ ،  $VEGFR2+$ ،  $HIF-1\alpha$  و  $VEGF$  در جدول ۲ به صورت میانگین  $\pm$  انحراف استاندارد ارائه شده است.

با اندازه‌گیری مکرر میکس دیزاین استفاده شد. قبل از آن، جهت رعایت پیش فرض‌ها، نتایج آزمون‌های  $M$  باکس، کرویت موچلی و لوین بررسی شد. برای مقایسه‌ی زوجی مراحل و مشخص شدن محل تفاوت‌ها، از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. سطح معنی‌داری  $P \leq 0/05$  در نظر گرفته شده است. کلیه داده‌ها با استفاده از SPSS V 18 تجزیه و تحلیل شد.

جدول ۴- تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر میکس دیزاین (دو راهه)

متغیرها	مرحله	گروه کنترل	گروه تجربی	P تعامل زمان × گروه
CD34+ سلول/ میکرولیتر	پیش آزمون اولیه	۱/۵۸ ± ۰/۲۷	۱/۵۴ ± ۰/۱۹	۰/۰۰۱
	پس آزمون اولیه	۱/۵۷ ± ۰/۲۲	۱/۵۱ ± ۰/۱۸	
	پیش آزمون ثانویه	۱/۵۵ ± ۰/۲۶	۳/۵۹ ± ۰/۲۸ <sup>§†</sup>	
	پس آزمون ثانویه	۳/۳۹ ± ۰/۱۸ <sup>¶</sup>	۱/۷۴ ± ۱/۸۹ <sup>¶*</sup>	
* سطح معناداری $P \leq 0/001$ بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون. † سطح معناداری $P \leq 0/05$ بین گروه کنترل و تمرین. ‡ سطح معناداری $P \leq 0/001$ بین گروه کنترل و تمرین. § سطح معناداری $P \leq 0/05$ در مقایسه با پیش‌آزمون اولیه. ¶ سطح معناداری $P \leq 0/05$ در مقایسه با پس‌آزمون اولیه.				
VEGFR سلول/ میکرولیتر	پیش آزمون اولیه	۹/۳۵ ± ۰/۷۸	۹/۲۴ ± ۰/۷۸	۰/۰۰۱
	پس آزمون اولیه	۹/۰۷ ± ۰/۸۱	۹/۱۴ ± ۰/۹۷	
	پیش آزمون ثانویه	۹/۷۹ ± ۰/۵۸	۱۱/۳۹ ± ۱/۰۱ <sup>†§</sup>	
	پس آزمون ثانویه	۱۱/۲۷ ± ۰/۹۵ <sup>¶</sup>	۲۵/۰۳ ± ۲/۳۷ <sup>¶*</sup>	
* سطح معناداری $P \leq 0/001$ بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون. † سطح معناداری $P \leq 0/05$ بین گروه کنترل و تمرین. ‡ سطح معناداری $P \leq 0/001$ بین گروه کنترل و تمرین. § سطح معناداری $P \leq 0/05$ در مقایسه با پیش‌آزمون اولیه. ¶ سطح معناداری $P \leq 0/05$ در مقایسه با پس‌آزمون اولیه.				
HIF-1 $\alpha$ پیکوگرم/ میلی‌لیتر	پیش آزمون اولیه	۱/۳۶ ± ۰/۶۵	۰/۹۰ ± ۰/۴۶	۰/۰۰۱
	پس آزمون اولیه	۱/۱۲ ± ۰/۴۶	* ۱/۳۳ ± ۰/۴۱	
	پیش آزمون ثانویه	۱/۲۷ ± ۱/۱۱	†‡ ۱/۸۰ ± ۰/۷۰	
	پس آزمون ثانویه	۱/۹۰ ± ۱/۱۹ <sup>§¶</sup>	* ۱/۳۶ ± ۰/۸۴	
* سطح معناداری $P \leq 0/05$ بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون. † سطح معناداری $P \leq 0/05$ در مقایسه با پیش‌آزمون اولیه. ‡ سطح معناداری $P \leq 0/001$ بین گروه کنترل و تمرین. § سطح معناداری $P \leq 0/05$ در مقایسه با پس‌آزمون اولیه. ¶ سطح معناداری $P \leq 0/001$ بین گروه کنترل و تمرین. ** سطح معناداری $P \leq 0/05$ بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون.				
VEGF پیکوگرم/ میلی‌لیتر	پیش آزمون اولیه	۱/۰۹ ± ۰/۸۸	۱/۱۵ ± ۰/۸۴	۰/۰۰۱
	پس آزمون اولیه	* ۵/۷۳ ± ۱/۸۶	۵/۶۷ ± ۲/۱۱ <sup>*</sup>	
	پیش آزمون ثانویه	۲/۰۱ ± ۱/۱۱	‡ ۳/۱۸ ± ۰/۷۰ <sup>†‡</sup>	
	پس آزمون ثانویه	* ۷/۴۴ ± ۳/۱۹ <sup>§¶</sup>	‡ ۹/۴۵ ± ۳/۶۹ <sup>‡*</sup>	
* سطح معناداری $P \leq 0/001$ بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون. † سطح معناداری $P \leq 0/05$ بین گروه کنترل و تمرین. ‡ سطح معناداری $P \leq 0/05$ در مقایسه با پیش‌آزمون اولیه. § سطح معناداری $P \leq 0/05$ در مقایسه با پس‌آزمون اولیه. ¶ سطح معناداری $P \leq 0/001$ بین گروه کنترل و تمرین. ** سطح معناداری $P \leq 0/05$ در مقایسه با پس‌آزمون اولیه.				

مقادیر  $VEGFR2+$  گروه تجربی، پس از ۸ هفته تمرین مقاومتی، در مراحل قبل از یک جلسه تمرین مقاومتی ۲۱ درصد ( $P=0/019$ ) و بعد از یک جلسه تمرین مقاومتی ۳۲ درصد ( $P=0/008$ ) افزایش نشان داد. همچنین در ارتباط با مقادیر  $CD34+$  گردش خون؛ متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی در قبل از ۸ هفته تمرین مقاومتی تغییر معنی‌داری از

تحلیل نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که در هر دو گروه کنترل و تجربی،  $VEGFR2+$  گردش خون در هر دو گروه کنترل و تجربی، متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی در قبل از ۸ هفته تمرین مقاومتی تغییر معنی‌داری مشاهده نگردید.

( $P \leq 0/001$ ) و پس از آزمون ( $P \leq 0/001$ ) ثانویه معنی‌دار بوده است.


همچنین میزان برابری بیان ژن VEGF در گروه تجربی در مرحله پیش از آزمون قبل از ۸ هفته ۱/۰۳ برابر، پس از آزمون قبل از ۸ هفته ۰/۹۸۷ برابر، پیش از آزمون بعد از ۸ هفته ۱/۰۸ برابر و پس از آزمون بعد از ۸ هفته ۱/۴۲ برابر بود (نمودار ۲). مقادیر بیان ژن VEGF گروه تجربی در مراحل پس از آزمون اولیه ( $P \leq 0/001$ ) و پیش از آزمون ( $P \leq 0/001$ ) و پس از آزمون ( $P = 0/031$ ) ثانویه معنی‌دار بوده است. در نهایت میزان تفاوت در میانگین بیان ژن هر دو متغییر HIF-1 $\alpha$  و VEGF در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل و در مراحل مختلف مطالعه در جدول ۳ ارائه شده است.

خود نشان نداد. از سوی دیگر مقادیر همین شاخص پس از ۸ هفته تمرین مقاومتی در مراحل قبل از یک جلسه تمرین مقاومتی ۱۵ درصد ( $P \leq 0/001$ ) و بعد از یک جلسه تمرین مقاومتی ۲۷ درصد ( $P \leq 0/001$ ) با افزایش معنی‌داری همراه بود.

بررسی نتایج حاصل از بیان ژن بین گروه‌های کنترل و تجربی در مراحل مختلف (شکل ۱)، با توجه به در نظر گرفتن میزان بیان ژن گروه کنترل به عنوان عدد ۱، میزان بیان نسبی ژن HIF-1 $\alpha$  در گروه تجربی در مرحله پیش از آزمون اولیه ۰/۹۸۰ برابر، پس از آزمون اولیه ۰/۸۹۳ برابر، پیش از آزمون ثانویه ۰/۹۵۸ برابر و پس از آزمون ثانویه ۲/۰۶ برابر بود (نمودار ۱). مقادیر بیان ژن HIF-1 $\alpha$  گروه تجربی در مراحل پس از آزمون اولیه ( $P \leq 0/001$ ) و پیش از آزمون




شکل ۱- تغییرات بیان ژن‌های HIF-1 و VEGF نسبت b-actin در گروه تجربی در مراحل مختلف مطالعه.



نمودار ۱- روند تغییرات بیان ژن HIF-1 گروه تجربی در مراحل مختلف مطالعه بر حسب میزان برابری (change fold) نسبت به گروه کنترل می‌باشد.

## بیان ژن VEGF



نمودار ۲- روند تغییرات بیان ژن VEGF گروه تجربی در مراحل مختلف مطالعه بر حسب میزان برابری (change fold) نسبت به گروه کنترل می‌باشد

موجب تغییر بیان عوامل موجود در گردش خون مانند VEGF، SDF-1 و EPO می‌شود، در نتیجه متالوپروتئیناز-۹ (MMP-9<sup>iv</sup>) فعال شده و منجر به فراخوانی EPCs از مغز استخوان می‌شود. علاوه بر این، ورزش می‌تواند EPC را از گیرنده‌های سطح سلولی (CXCR4<sup>v</sup>) بیان کند و تمام این عوامل بدون در نظر گرفتن نوع فعالیت ورزشی وابسته به شدت برنامه‌های تمرینی می‌باشد.<sup>۱۴</sup> شدت برنامه‌های تمرینی نیز از عوامل اثر گذار بر فراخوانی و پاسخ EPCs می‌باشد. در همین راستا مشخص شده است که تنش‌های وارد شده به سیستم عروقی در پاسخ به فعالیت ورزشی مقاومتی به احتمال زیاد به شدت، تعداد تکرار و مدت زمان بازیافت بستگی دارد. ایجاد مقاومت در برابر حرکات با بار سبک تا متوسط به همراه تعداد تکرار بالا و مدت زمان بازیافت کوتاه به عنوان بخشی از یک تمرین مقاومتی ممکن است منجر به محرک ایسکمیک بیشتری در طیف وسیع‌تری از گروه‌های عضلانی نسبت به عضلات درگیر در یک تمرین هوازی شود و همین محیط ایسکمیک عضله می‌تواند به عنوان عامل جذب EPCs به بافت ایسکمیک در نظر گرفته شود که این امر از طریق SDF-1 $\alpha$  انجام می‌گیرد.<sup>۸،۹</sup>

اگر چه به منشاء افزایش SDF-1 $\alpha$  پلاسما به روشنی ذکر نشده ولی نتایج مطالعه‌ها در این زمینه محیط ایسکمیک

## بحث

یافته‌های مطالعه حاضر نشان‌دهنده این واقعیت است که هشت هفته تمرین مقاومتی می‌تواند فراخوانی EPCs و همچنین بیان ژن HIF-1 $\alpha$  و VEGF پلاسما را در مردان سالمند، متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی و پس از هشت هفته تمرین افزایش دهد. این یافته‌ها با نتایج برخی از مطالعه‌ها که به بررسی تاثیر انواع برنامه‌های ورزشی بر فراخوانی EPCs و عوامل اثرگذار بر آن؛ از جمله HIF-1 $\alpha$  و VEGF را مطالعه کرده بودند، ناهمسو بود.<sup>۱۵-۲۱</sup> این عدم همخوانی را می‌توان به تفاوت در نوع برنامه‌های تمرینی نسبت داد. در واقع، با توجه به پیشینه مطالعه‌هایی که بر فعالیت‌های ورزشی هوازی متمرکز بودند، یافته‌های محدودی در زمینه تأثیر تمرین مقاومتی بر فراخوانی و پاسخ EPCs و عوامل موثر بر این پاسخ وجود دارد، با این وجود در ارتباط با فعالیت‌های هوازی به صورت حاد و مزمن مشخص شده است که عواملی نظیر نیتریک اکسید (NO<sup>i</sup>) و اریترپویتین (EPO<sup>ii</sup>) بر فراخوانی و پاسخ EPCs اثرگذار بوده و در این زمینه نقش مهمی بازی می‌کنند.<sup>۱۲</sup> به عبارتی، فعالیت ورزشی به طور عام سبب فعال‌سازی نیتریک اکسید سنتتاز اندوتلیالی (eNos<sup>iii</sup>) می‌شود و افزایش NO

i- Nitric Oxide

ii -Erythropoietin

iii- Endothelial Nitric Oxide Synthase

iv -Matrix Metalloproteinase-9

v- chemokine receptor type-4



اختلال در عملکرد EPCs توسط تعدادی از مطالعات حمایت می‌شود.<sup>۴۵</sup> مشخص شده که کاهش وابسته به سن در بیان عوامل پیش‌برنده آنژیوژنز، شامل عوامل رشدی، سایتوکاین‌ها و هورمون‌ها به احتمال زیاد در روند اختلال در فراخوانی EPCs نقش دارد.<sup>۴۶</sup> از آن جایی که فراخوانی EPCs از مغز استخوان و قرار گرفتن در محل آسیب و رگ‌زایی به تعدادی از عوامل، از جمله فاکتور SDF-1 $\alpha$  و VEGF وابسته است، نشان داده شده است که کاهش SDF-1 $\alpha$  و VEGF در بافت‌های پیر، نقل مکان کردن EPCs به محل‌های ایسکمیک را مختل می‌کند.<sup>۴۷</sup> در حالت پایه تعداد EPCs در افراد مسن کمتر از جوانان است ولی با تمرین ورزشی، سطوح EPCs در گروه مسن بیشتر از جوانان بهبود می‌یابد.<sup>۳۶</sup> مکانیسم‌های این اختلاف به طور کامل شناخته نشده است ولی شاید به این دلیل باشد که سطوح گونه‌های اکسیژن واکنشی (ROS) گردش خون در افراد مسن بیشتر است و این نیز با کاهش محتوای SIRT در EPC همراه است. پروتئین SIRT1 در ترمیم DNA و تنظیم چرخه سلول و پیری دخیل است. کاهش SIRT1 احتمالاً به ROS اجازه می‌دهد بدون کنترل مداوم آسیب ایجاد کند. فعالیت SIRT1 در EPCs در شرایط آزمایشگاهی، EPCs را از مرگ ناشی از H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> نجات می‌دهد.<sup>۳۷</sup>

همانند سایر متغیرهای مداخله‌گر در مطالعه‌ی حاضر، میزان آمادگی جسمانی آزمودنی‌ها نیز در تفسیر نتایج به دست آمده از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. با توجه به این مهم که آزمودنی‌های مطالعه حاضر را سالمندان مرد غیرورزشکار تشکیل دادند لذا سازگاری‌های کسب شده از ۸ هفته تمرین مقاومتی می‌تواند دلیلی بر فراخوانی و پاسخ EPCs متفاوت با سایر مطالعه‌ها می‌باشد. در واقع می‌توان تاثیر فعالیت ورزشی بر فراخوانی و پاسخ EPCs را در افراد بیمار تا ورزشکاران حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار داد، در همین راستا مطالعه‌های متعددی مشاهده کرده‌اند که فعالیت ورزشی می‌تواند EPCs گردش خون را در افراد سالم و همچنین در بیماران عروق کرونر و نارسایی قلبی افزایش دهد.<sup>۳۸،۳۹</sup> از این رو نتایج به‌دست آمده در این مطالعه را می‌توان با عدم وجود هرگونه بیماری خاص در آزمودنی‌ها مرتبط دانست و بیان داشت که یکی از این مکانیسم‌های اثرگذار بر بازسازی، نوزایی و ترمیم عروق فعالیت ورزشی است.

عضله اسکلتی ناشی از تمرین را به عنوان منبع احتمالی معرفی کرده‌اند.<sup>۱۲</sup> علاوه بر این، مشخص شده است که سلول‌های ماهواره‌ای عضلانی و فیبروبلاست‌ها قادر به ترشح و آزادسازی SDF-1 $\alpha$  برای کمک به جذب EPCs به بافت ایسکمیک هستند.<sup>۲۸،۹۱،۹۲</sup> بنابراین، شدت‌های بالاتر از تمرین مقاومتی می‌تواند شرایط ایسکمیک شدیدتری را ایجاد کند و شیب بزرگتری از فراخوانی و پاسخ EPCs را به دنبال خواهد داشت. چنین به نظر می‌رسد که بیان و ثبات HIF-1 $\alpha$  در عضله اسکلتی نقش بسزایی بر عهده دارد.<sup>۹۱</sup> در طول دوره‌های هایپوکسی بافت، سطح HIF-1 $\alpha$  افزایش می‌یابد، بنابراین منجر به فعال شدن SDF-1 $\alpha$  می‌گردد. هر چه مدت زمان هایپوکسی بافت طولانی‌تر شود، فراخوانی و پاسخ بزرگتری از EPCs مشاهده خواهیم کرد.<sup>۱۱،۳۶</sup>

از دیگر دلایل عدم هم‌خوانی نتایج می‌توان جنسیت آزمودنی‌ها را مطرح کرد. نتایج بررسی‌ها نشان داده‌اند که فراخوانی و پاسخ EPCs به واسطه تمرین مقاومتی در زنان؛ پاسخ‌های متفاوتی را در مقایسه با مردان در سلول‌های آنژیوژنیک گردش خون و EPCs بر می‌انگیزد. سازوکارهای احتمالی برای این نوع متفاوت از پاسخ در زنان را به سطوح استروژن نسبت داده‌اند. بر این اساس، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی در دو جنس متفاوت است و زنان در سنین باروری نسبت به مردان هم‌سن خود با بروز کمتری از این بیماری‌ها مواجه هستند.<sup>۳۷،۳۸</sup> این موضوع بیان‌گر نقش محافظتی هورمون استروژن و تأثیر مثبت آن در تنظیم پروفایل لیپیدی می‌باشد. هورمون بتا ۱۷ استرادیول باعث مهاجرت EPCs از مغز استخوان و ارتقای عملکرد آن‌ها می‌شود.<sup>۳۹،۴۰</sup> و دلیل آن حضور گیرنده‌های خاص استرادیول در سلول‌های اندوتلیال و عضله‌ی صاف عروق می‌باشد.<sup>۴۱</sup> به هر حال زنان به دلیل سطوح استروژن بالاتر تعداد بیشتر EPCs در گردش خون دارند و مشخص شده است که افزایش EPCs به واسطه استروژن توسط کاهش مسیر آپوپتوز به واسطه کاسپاز-۸ انجام می‌شود.<sup>۴۸</sup> فرض دیگر این است که استروژن از طریق فعال‌سازی MMP-9 به واسطه فعالیت نیتریک اکسید سنتاز موجب انتشار کیت لیگاند محلول (sKitL) و در نهایت فراخوانی EPCs می‌شود.<sup>۴۹</sup>

سن آزمودنی‌ها نیز می‌تواند توجیهی برای مشاهده‌ی نتایج متضاد مطالعه حاضر با مطالعات پیشین باشد، چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد که توانایی در ترمیم اندوتلیوم وابسته به سن می‌باشد و بر این اساس ارتباط بین سن و

در نهایت نتایج مطالعه حاضر حاکی از افزایش فراخوانی EPCs و بیان ژن سیتوکین‌های رگ‌زایی به ویژه HIF-1 $\alpha$  و VEGF به واسطه تمرین مقاومتی بود که این امر اثرات مثبتی را در بهبود عملکرد اندوتلیال در افراد سالمند که ذاتاً مستعد اختلال عملکرد اندوتلیال هستند، خواهد داشت. لذا با این رویکرد مطالعاتی توانستیم ابعاد جدیدی را در ارتباط با پیش آماده‌سازی با فعالیت ورزشی مقاومتی در افراد سالمند که ذاتاً مستعد تخریب کارکرد اندوتلیال هستند، ایجاد کنیم. از محدودیت‌های مطالعه‌ی حاضر می‌توان به عدم کنترل تغذیه آزمودنی‌ها و هم چنین این امکان که آزمودنی‌ها به بیماری‌های دیگر وابسته به سن مبتلا باشند و در پرونده سلامت و پزشکی آن‌ها به دلیل عدم تشخیص و یا عدم گزارش توسط آزمودنی‌ها، درج نشده باشد، اشاره کرد.

سپاسگزاری: این مقاله برگرفته از پایان‌نامه‌ی مقطع دکتری فیزیولوژی ورزش تحت عنوان پاسخ سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال و بیان ژن سایتوکین‌های آنژیوژنیک خون به پیش آماده‌سازی با تمرین مقاومتی در مردان سالمند می‌باشد. بدین‌وسیله از اساتید محترم برای ارائه نظرات مفید و ارزنده در به انجام رساندن این مطالعه و همچنین از موسسه خیریه کهریزک کرج و تمامی آزمودنی‌های شرکت‌کننده کمال تشکر و قدردانی را دارم. تعارض منافع: هیچ‌گونه تضاد منافع توسط نویسندگان بیان نشد. منابع مالی: مطالعه حاضر بدون حمایت مالی انجام شده است.

i- Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor

## References

- Ribeiro F, Ribeiro IP, Alves AJ, Monteiro M, Oliveira NL, Oliveira J, et al. Effects of exercise training on endothelial progenitor cells in cardiovascular disease: a systematic review. *Am J Phys Med Rehabil* 2013; 92: 1020-30.
- Lenk K, Uhlemann M, Schuler G & Adams V. Role of endothelial progenitor cells in the beneficial effects of physical exercise on atherosclerosis and coronary artery disease. *J Appl Physiol* 2011; 111: 321-8.
- Wang H, Listrat A, Meunier B, Gueugneau M, Coudy C, Combaret L, et al. Apoptosis in capillary endothelial cells in ageing skeletal muscle. *Aging Cell* 2014; 254-62.
- J. Donato, K. A. Magerko, B. R. Lawson, J. R. Durrant, L. A. Lesniewski, D. R. Seals. SIRT-1 and vascular endothelial dysfunction with ageing in mice and humans. *The Journal of Physiology* 2011; 4545-54.
- Kushner E, Guilder GV, MacEaney O, Greiner J, Cech J, Stauffer B, et al. Ageing and endothelial progenitor cell release of pro angiogenic cytokines. *Age and Ageing* 2010; 39: 268-72.
- Xia WH, Li J, Su C, Yang Z, Chen L, Wu F, et al. Physical exercise attenuates age-associated reduction in endothelium-reparative capacity of endothelial progenitor cells by increasing CXCR4/JAK-2 signaling in healthy men. *Aging Cell* 2012; 11: 111-9.
- Rezaei S, Matinhomae H, Azarbayjani MA, Farzanegi P. Effect of Interval Training Intensity on Gene Expression of Endothelial Progenitor Cells and Cardiac Stem Cells in Aged Rats. *SJIMU* 2018; 26: 27-37. [Farsi]
- Rezaei Sh, Matinhomae H, Azarbayjani MA, Farzanegi P. Effect of Interval Training Intensity on Gene Expression of Endothelial Progenitor Cells and Cardiac Stem Cells in Aged Rats. *Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences* 2018; 26: 27-37. [Farsi]
- Cheng M, Qin G. Progenitor cell mobilization and recruitment: SDF-1, CXCR4, alpha4-integrin, and c-kit. *Prog Mol Biol Transl Sci* 2012; 111: 243-64.
- Farzanegi P, Rezaei S, Azarbayjani MA. Role of Endothelial progenitor cells in angiogenesis with the approach of physical activity. *J Neyshabur Univ Med Sci*. 2020; 8: 1-17. [Farsi]
- Borde R, Hortobágyi T, Granacher U. Dose-Response Relationships of Resistance Training in healthy old adults: a systematic review and Meta-Analysis. *Sports Med* 2015; 45: 1693-720.
- Farahati S, Attarzadeh Hosseini S R, Moazzami M, Hasanzadeh Dalooe M, Hasanzadeh Dalooe S. The Impact

- of High-Intensity Interval Training Versus Moderate-Intensity Continuous Training on Endothelial Progenitor Cells in Overweight Women. *Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism* 2019; 21: 37-45. [Farsi]
13. Krüger K, Pilat C, Schild M, Lindner N, Frech T, Muders K, et al. Progenitor cell mobilization after exercise is related to systemic levels of G-CSF and muscle damage. *Scand J Med Sci Sports* 2015; 25: 283-91.
  14. Fernando R, Ilda P. R, Ana C. G, Alberto J. A, Elsa M, Raquel F, et al. Effects of resistance exercise on endothelial progenitor cell mobilization in women. *SCIENTIFIC Reports* 2017; 7: 17880.
  15. Hoetzer GL, Van Guilder GP, Irmiger HM, Keith RS, Stauffer BL, DeSouza CA, et al. Aging, exercise, and endothelial progenitor cell clonogenic and migratory capacity in men. *J Appl Physiol* 2007; 102: 847-52.
  16. Heiss C, Keymel S, Niesler U, Ziemann J, Kelm M, Kalka C, et al. Impaired progenitor cell activity in age-related endothelial dysfunction. *J Am Coll Cardiol* 2005; 45: 1441-8.
  17. Müller-Ehmsen J, Braun D, Schneider T, Pfister R, Worm N, Wielckens K, et al. Decreased number of circulating progenitor cells in obesity: beneficial effects of weight reduction. *Eur Heart J* 2008; 29: 1560-8.
  18. MacEaney OJ, Kushner EJ, Van Guilder GP, Greiner JJ, Stauffer BL, DeSouza CA, et al. Endothelial progenitor cell number and colony-forming capacity in overweight and obese adults. *Int J Obes* 2009; 33: 219-25.
  19. Tobler K, Freudenthaler A, Baumgartner-Parzer SM, Wolzt M, Ludvik B, Nansalmaa E, et al. Reduction of both number and proliferative activity of human endothelial progenitor cells in obesity. *Int J Obes* 2010; 34: 687-700.
  20. MacEaney OJ, Kushner EJ, Westby CM, Cech JN, Greiner JJ, Stauffer BL, et al. Endothelial progenitor cell function, apoptosis, and telomere length in overweight/obese humans. *Obesity (Silver Spring)* 2010; 18: 1677-82.
  21. Heida NM, Müller JP, Cheng IF, Leifheit-Nestler M, Faustini V, Riggert J, et al. Effects of obesity and weight loss on the functional properties of early outgrowth endothelial progenitor cells. *J Am Coll Cardiol* 2010; 55: 357-67.
  22. Brzycki M. Strength-predicting a one-rep max from reps-to-fatigue. *J Phys Educ Rec Dance* 1993; 64: 88-90.
  23. Graef FI, Pinto RS, Alberton CL, de Lima WC, Krueger LF. The effects of resistance training performed in water on muscle strength in the elderly. *J Strength Cond Res* 2010; 24: 3150-6.
  24. Negaresh R, Ranjbar R, Habibi A, Gharibvand MM. Effects of eight weeks resistance training on muscle hypertrophy and physiological parameters among elderly men. *Journal of Geriatric Nursing* 2016; 3: 62-75. [Farsi]
  25. Lippincott Williams and Wilkins. *American College of Sports Medicine. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 9th ed. Philadelphia 2013; 223-30.
  26. Niemi GM, Parel J, Beals J, van Vliet S, Paluska SA, Moore DR, et al. Kinetics of circulating progenitor cell mobilization during submaximal exercise. *J Appl Physiol* 2017; 675-82.
  27. Mariasole Da Boit, Rachael Sibson, Judith R, Meakin, Frank Thies, Arduino A. Mangoni, et al. Sex differences in the response to resistance exercise training in older people. *Physiol Rep* 2016; e12834.
  28. Latham N, Liu CJ. Strength training in older adults: the benefits for osteoarthritis. *Clin Geriatr Med* 2010; 26: 445-59.
  29. Brown, M. D, Hudlicka, O. Modulation of physiological angiogenesis in skeletal muscle by mechanical forces: involvement of VEGF and metallo proteinases. *Angiogenesis* 2003; 6: 1-14.
  30. Ylva H, Nora R, Jens J. Nielsen, Birgitte H, Peter K, and Jens Bangsbo. Passive leg movement enhances interstitial VEGF protein, endothelial cell proliferation, and eNOS mRNA content in human skeletal muscle. *American Journal of Physiology- Regulatory, Integrative and Comparative Physiology* 2008; 294: R975-R82.
  31. Monique E. Francois, Cody Durrer, Kevin J. Pistawka, Frank A. Halperin, and Jonathan P. Little. Resistance-based interval exercise acutely improves endothelial function in type 2 diabetes. *American Journal of Physiology* 2016; H1258-H67.
  32. Faria TO, Angeli JK, Mello LGM, Pinto GC, Stefanon I, Vassallo DV, et al. A Single Resistance Exercise Session Improves Aortic Endothelial Function in Hypertensive Rats. *Arq Bras Cardiol* 2017; 228-36.
  33. Michael J. Cross and Lena Claesson-Welsh. FGF and VEGF function in angiogenesis: signaling pathways, biological responses and therapeutic inhibition, *TRENDS in Pharmacological Sciences* 2001; 22: 201-7.
  34. Steiner S, Niessner A, Ziegler S, Richter B, Seidinger D, Pleiner J, et al. Endurance training increases the number of endothelial progenitor cells in patients with cardiovascular risk and coronary artery disease. *Atherosclerosis* 2005; 181: 305-10.
  35. Adams V, Lenk K, Linke A, Lenz D, Erbs S, Sandri M, et al. Increase of circulating endothelial progenitor cells in patients with coronary artery disease after exercise-induced ischemia. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2004; 24: 684-69.
  36. Sandri M, Viehmann M, Adams V, Rabald K, Mangner N, Hollriegel R, et al. Chronic heart failure and aging effects of exercise training on endothelial function and mechanisms of endothelial regeneration results from the leipzig exercise intervention in chronic heart failure and aging study. *Eur J Prev Cardiol* 2016; 23: 349-58.
  37. Wang YQ, Cao Q, Wang F, Huang LY, Sang TT, Liu F, Chen SY. SIRT1 protects against oxidative stress induced endothelial progenitor cells apoptosis by inhibiting FOXO3a via FOXO3a ubiquitination and degradation. *J Cell Physiol* 2015; 230: 2098-107.
  38. Soybir OC, Gurdal SO, Oran ES, Tulubas F, Yuksel M, Akyildiz AI, et al. Delayed cutaneous wound healing in aged rats compared to younger ones. *Int Wound J* 2012; 9: 478-87.
  39. Bulut D, Albrecht N, Imohl M, Gunesdogan B, Bulut-Streich N, Borgel J, et al. Hormonal status modulates circulating endothelial progenitor cells. *Clin Res Cardiol* 2007; 96: 258-63.
  40. Foresta C, Zuccarello D, Biagioli A, de Toni L, Prana E, Nicoletti V, et al. Oestrogen stimulates endothelial progenitor cells via oestrogen receptor-alpha. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2007; 67: 520-5.
  41. Lemieux C, Cloutier I, Tanguay JF. Menstrual cycle influences endothelial progenitor cell regulation: a link to gender differences in vascular protection? *Int J Cardiol* 2009; 136: 200-10.
  42. Kraemer, William J, Ratamess, Nicholas A. Hormonal responses and adaptations to resistance exercise and training. *Sports Medicine* 2005; 35: 339-61.

43. Mero AA, Hulmi JJ, Salmijärvi H, Katajavuori M, Haverinen M, Holviala J. Resistance training induced increase in muscle fiber size in young and older men. *J Appl Physiol* 2012; 113: 641-50.
44. Corona G, Rastrelli G, Monami M, Guay A, Buvat J, Sforza A, et al. Hypogonadism as a risk factor for cardiovascular mortality in men: a meta-analytic study. *Eur J Endocrinol* 2011; 165: 687-701.
45. Corona G, Rastrelli G, Vignozzi L, Mannucci E & Maggi M. How to recognize late-onset hypogonadism in men with sexual dysfunction. *Asian J Androl* 2012; 14: 251-9.
46. Wu FC, Tajar A, Beynon JM, Pye SR, Silman AJ, Finn JD, et al. Identification of late-onset hypogonadism in middle-aged and elderly men. *N Engl J Med* 2010; 363: 123-35.
47. Liao C, Wu Y, Lin F, Tsai W, Liu S, Chiang H. Testosterone replacement therapy can increase circulating endothelial progenitor cell number in men with late onset hypogonadism. *Andrology* 2013; 1: 563-9.
48. Foresta C, Zuccarello D, De Toni L, Garolla A, Caretta N, Ferlin A. Androgens stimulate endothelial progenitor cells through an androgen receptor mediated pathway. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2008; 68: 284-99.
49. Jaipersad A.S, Lip G.Y.H. Silverman S, Shantsila E. The role of monocytes in angiogenesis and atherosclerosis," *Journal of the American College of Cardiology* 2014; 63: 1-11.
50. Beate H, Koichi H, Sergio D, Matthias F, Barbara F, Neil H, et al. Recruitment of stem and progenitor cells from the bone marrow niche requires MMP-9 mediated release of kit-ligand. *Cell* 2002; 109: 625-37.

Original Article

## Response of Endothelial Progenitor Cells and Expression of Angiogenic Cytokine Genes in Preconditioning with Resistance Training in Elderly Men

Karami S<sup>1</sup>, Shahidi F<sup>1</sup>, Rajabi H<sup>2</sup>, Golab F<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Department of Physical Education and Sports Science, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran, <sup>2</sup>Department of Physical Education and Sports Science, Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran, <sup>3</sup>Department of Physiology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran

e-mail:karami.sp@gmail.com

Received: 28/10/2020 Accepted: 07/03/2021

### Abstract

**Introduction:** Impairment in the endothelial function starts with aging; however, it can be reduced or prevented by regular exercise. This study aimed to investigate the response and compatibility of endothelial progenitor cells and to evaluate the gene expression of hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1) and vascular endothelial growth factor (VEGF) after eight weeks of resistance training in the elderly. **Materials and Methods:** In this semi-experimental study, 24 elderly men were randomly divided into equal experimental and control groups. Blood samples were collected in four stages, that is, before and after one session of resistance training (chest press, calf press, squats, leg curls, leg extensions, and underhand cable pushdowns) and before and after eight weeks of resistance training (bicep, tricep, quadricep, calf, chest, shoulder, and abdomen exercises). The samples were examined for the expression of HIF-1 and VEGF genes, and a flow cytometric analysis of endothelial progenitor cells from the mononuclear cell population of blood tissue was carried out. A mixed-design repeated measures analysis of variance (ANOVA) was used in SPSS ( $P < 0.05$ ) to investigate the differences between the groups. **Results:** The number of endothelial progenitor cells in the pretest and the first posttest increased in the experimental group, compared to the control group. Also, the gene expression of HIF-1 in the experimental group increased compared to the control group in the first posttest, pretest, and second posttest. As well as, the expression of VEGF gene increased in the experimental group in comparison with the control group in the first posttest, pretest, and second posttest. **Conclusion:** The present findings suggested that resistance training could be effective in the repair and regeneration of arteries after injuries, especially in the elderly.

**Keywords:** Resistance Training, Hypoxia-Inducible Factor-1, Vascular Endothelial Growth Factor A, Endothelial Progenitor Cells