

ارزیابی ارتباط استعداد ابتلا به الگوهای مختلف بیماری مولتیپل اسکلروزیس با پلی مورفیسم rs1929992 ژن اینترلوکین ۳۳

چکیده

دریافت: ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ پذیرش: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ آنلاین: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس شایع‌ترین بیماری خودایمن سیستم اعصاب مرکزی است. سایتوکین‌ها در بروز این بیماری‌ها نقش بسزایی دارند. از جمله اینترلوکین ۳۳ (IL-33) با داشتن دو خاصیت پیش‌تنبه‌ای و ضدالتنبه‌ای در پاتوژنز برخی بیماری‌های خودایمن نقش دارد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن IL-33 در ناحیه rs1929992 با استعداد ابتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام گردید.

روش بررسی: در این مطالعه مورد-شاهدی که در فاصله زمانی فروردین ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۶ انجام گرفت، نمونه خون ۱۴۰ بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (بیماران بیمارستان افضل‌ی پور کرمان) و ۱۴۰ فرد سالم (افراد مراجعه‌کننده به سازمان انتقال خون) به‌عنوان گروه کنترل که از نظر سن و جنس همسان بودند، انتخاب گردید. جهت تعیین ژنوتایپ از DNA استخراج شده به‌روش Salting out استفاده شد. سپس پلی مورفیسم این ژن در ناحیه rs1929992 با تکنیک PCR-RFLP (Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism) بررسی گردید.

یافته‌ها: بر اساس نتایج اختلاف معناداری بین دو گروه بیمار و سالم در فراوانی ژنوتایپ وجود داشت، به‌طوری‌که فراوانی ژنوتایپ AA در بیماران نوع پیش‌رونده-تائویه (SP-MS) و نوع پیش‌رونده-اولیه (PP-MS) بیشتر از گروه کنترل بود ($P=0/03$). در بیماران نوع عودکننده-بهبودیابنده (RR-MS)، فراوانی ژنوتایپ AG کمتر از گروه کنترل بود ($P=0/01$). همچنین در بیماران RRMS، PPMS و SPMS فراوانی آلل A بالاتر از گروه کنترل بود، (به ترتیب $P=0/03$ ، $P=0/01$ و $P=0/001$)، اما آلل G در این الگوهای بیماری کمتر از گروه کنترل مشاهده شد (به ترتیب $P=0/03$ ، $P=0/01$ و $P=0/001$).

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بین پلی مورفیسم rs1929992 و استعداد ابتلا به الگوهای مختلف بیماری مولتیپل اسکلروزیس ارتباط معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: اینترلوکین ۳۳، مولتیپل اسکلروزیس، پلی مورفیسم.

میترا جمالی^۱

مهدی رستمی‌راد^۲

غلامرضا عنانی سراب^۳

رؤیا مهدوی^{۴*}

۱- گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

۲- گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

۳- گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

۴- گروه ایمونولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

* نویسنده مسئول: بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پیراپزشکی، گروه ایمونولوژی پزشکی، آزمایشگاه مرکز تحقیقات.

تلفن: ۰۵۶-۳۳۳۸۱۶۰۷

E-mail: royamahdavi1986@gmail.com

مقدمه

به نام TH1، TH2، TH17 تقسیم می‌شوند. سلول‌های TH1 با ترشح IFN-

IL-2، γ و TNF- α مشخص می‌شوند، سلول‌های TH2 سایتوکین‌های IL-

4، IL-10 و IL-13 را ترشح می‌کنند، درحالی‌که سلول‌های TH17 با

ترشح IL-17، IL-17F، IL-21 و IL-22 مشخص می‌شوند، که پاسخ

سلول‌های TH1 و TH17 علیه سلول‌های خودی منجر به بروز علائم

مربوط به بیماری MS می‌گردد.^۲ سایتوکینی به‌نام اینترلوکین ۳۳ (IL-33)

در سال ۲۰۰۵ توسط Schmitz به‌عنوان عضوی از اعضای خانواده IL-1

مولتیپل اسکلروزیس (Multiple sclerosis, MS) یک بیماری

التنبه‌ای سیستم عصبی مرکزی (Central nervous system, CNS) است

که به‌عنوان شایع‌ترین بیماری دمی‌لینه‌کننده در انسان شناخته شده

است.^۱ در پاسخ‌های ایمونولوژیک لنفوسیت‌های T کمک‌کننده (TH)

بر اساس الگوی سایتوکین‌های تولیدی حداقل به سه زیرگروه اصلی

بیماران برای ورود به پژوهش، ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان افضلی‌پور کرمان که بر اساس علائم بالینی و تست‌های آزمایشگاهی و تایید متخصص نورولوژیست بیماری آن‌ها تایید شده باشد) و اینکه تمامی افراد وارد شده به مطالعه متولد استان کرمان باشند. به‌طور کلی معیارهای خروجی شامل مواردی بود که ممکن است بر روی نتایج تاثیر داشته باشد شامل عدم ابتلا به سایر بیماری‌های خودایمن، بیماری‌های قلبی-عروقی، بیماری‌های کبدی، بیماری‌های نقص ایمنی، عفونت، درمان‌های مهارکننده سیستم ایمنی در طی شش ماه گذشته، تروما، استعمال دخانیات، آسم و آلرژی و پیوند اعضا بودند. به افراد مورد مطالعه در مورد هدف از پژوهش توضیحات کافی داده شد و رضایت تمامی بیماران و افراد سالم و توجیه آن‌ها جهت شرکت در مطالعه پیش از نمونه‌گیری انجام گردید. داده‌های مورد نیاز در هر دو گروه براساس پرسشنامه‌هایی که به‌همین منظور طراحی شده بود گردآوری گردید. بدیهی است که نمونه‌های گروه بیماران و گروه کنترل همگن انتخاب شده و نسبت زن و مرد در دو گروه مساوی انتخاب شد و همچنین دو گروه مورد مطالعه در یک رنج سنی بوده و میانگین سنی و انحراف معیار آن نیز همخوانی داشتند.

در مورد نمونه‌های بیماران پس از تأیید نهایی ابتلا به مولتیپل اسکلروزیس توسط پزشک متخصص، داده‌های بیمار از طریق پرسشنامه دریافت گردید و خونگیری توسط تکنسین آزمایشگاه انجام شد. همچنین از نمونه‌های CBC (حاوی ضد انعقاد EDTA) استخراج DNA (پس از سانتیفورژ در دور ۲۷۰۰ rpm به مدت ۱۰ دقیقه به شیوه نمک‌زدایی) به‌عمل آمد. با استفاده از Lambda 25 UV/VIS Spectrophotometer (Perkin-Elmer, Norwalk, Connecticut, USA) نسبت جذب نوری در طول موج ۲۶۰ nm (طول موجی که DNA بیشترین جذب نور UV را دارد) به ۲۸۰ nm (طول موجی که پروتئین بیشترین جذب نور UV را دارد) اندازه‌گیری شد و از نمونه‌هایی که خلوص بیشتری داشتند (دارای Optical density, OD در محدوده ۲ < ۲۶۰/۲۸۰ < ۱/۸) جهت انجام فرآیند Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) استفاده گردید.

پلی مورفیسم تک‌نوکلئوتیدی (rs1929992) در ایترون ژن IL-33 قرار گرفته است. محصول نهایی واکنش PCR برای IL-33 (rs1929992)، یک قطعه ۲۱۷ جفت بازی بود و تکثیر نیز به نحو

و لیگاندی برای ST2 (IL1R1, T1, DER4 یا FIT-1) تشخیص داده شد^۳ و به دلیل ساختمان β سه‌وجهی آن را IL-33 نامید. ژن آن بر روی کروموزوم 9p24.1 قرار دارد. این سایتوکین توسط سلول‌های بافت پوششی مانند سلول‌های اپی‌تلیال، اندوتلیال، فیروبلاست‌ها و بسیاری از ارگان‌های دیگر تولید می‌شود، همچنین بعضی از اعضای سیستم ایمنی ذاتی مانند ماکروفاژها و دندریتیک سل‌ها قادر به بیان IL-33 می‌باشند.^۴ بیان ژن IL-33 در ارگان‌ها و تیپ‌های مختلف سلولی مشاهده می‌شود، در انسان افزایش سطح این سایتوکین در عضلات صاف بورنش، سلول‌های اپی‌تلیال راه هوایی، ریه، فیروبلاست‌های پوست و کراتینوسیت‌ها، سلول‌های اندوتلیال لوزه و High endothelial venules (HEV) مشاهده می‌شود،^۵ همچنین مقدار آن در سرم، CSF و ضایعات بیماری مولتیپل اسکلروزیس و سایر بیماری‌های خودایمن مانند آلزایمر، دیابت ملیتوس، لوپوس اریتماتوز منتشر (SLE) و بیماری التهابی روده (IBD) افزایش می‌یابد.^۶

از شناخته‌شده‌ترین پلی مورفیسم تک‌نوکلئوتیدی در ایترون ژن IL-33، پلی مورفیسم rs1929992 می‌باشد،^{۷-۹} این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن ایتروکین ۳۳ و استعداد ابتلا به مولتیپل اسکلروزیس و مقایسه فراوانی آلل‌های پلی مورفیسم یادشده با افراد گروه سالم کنترل انجام شد.

روش بررسی

پژوهش کنونی به صورت مطالعه مورد-شاهدی (Case-control) و از نظر هدف نیز جز تحقیقات بنیادی-کاربردی به‌شمار می‌رود که در فاصله فروردین ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۶ در دانشگاه علوم پزشکی کرمان به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی آسان انجام گرفت. تعداد نمونه‌های این مطالعه ۲۸۰ نفر که شامل ۱۴۰ فرد بیمار که متشکل از ۱۰۲ مورد فرد مبتلا به بیماری از نوع عودکننده-بهبودیابنده (RR-MS)، ۲۸ فرد مبتلا به بیماری از نوع پیشرونده-ثانویه (SP-MS)، ۱۹ فرد مبتلا به بیماری از نوع پیشرونده-اولیه (PP-MS) و دو فرد مبتلا به بیماری از نوع عودکننده-پیشرونده (PR-MS) بودند. از تعداد ۱۴۰ فرد سالم مراجعه‌کننده به سازمان انتقال خون کرمان نیز به‌عنوان گروه کنترل، نمونه خون گردآوری شده و جهت نگهداری به آزمایشگاه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ارسال گردید. معیارهای

سپس به محصول PCR آنزیم مورد نظر را افزوده و در بن ماری ۳۷ °C به مدت ۱۶ ساعت انکوبه نموده و پس از سپری شدن زمان انکوباسیون این محصولات هضم شده، بر روی ژل ۲٪ آگاروز الکتروفورز شدند (در ولتاژ ۱۲۰ ولت به مدت ۴۰-۳۰ دقیقه در بافر TAEIX) و سپس با اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی شد و در انتها در دستگاه ژل داگ مشاهده گردید (شکل ۱). برای انجام ژنوتایپینگ و تعیین الگوی پلی مورفیسمی ژن مورد بررسی، از توالی های پرایمرها و آنزیم محدودالتر مشخص شده در جدول ۱ استفاده گردیده شد.

محصولات تکثیر یافته PCR مربوط به پلی مورفیسم (rs1929992) SspI (New England Biolabs, England) ژن IL-33 توسط آنزیم هضم گردید. در ژنوتایپ هموزیگوت (GG) قطعه ۲۱۷ جفت بازی (بدون هضم آنزیمی)، در ژنوتایپ هتروزیگوت (AG) قطعات ۲۱۷، ۱۳۴ و ۸۳ جفت بازی و در ژنوتایپ هموزیگوت (AA) قطعات ۱۳۴ و ۸۳ جفت بازی مشاهده شد.

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS software, version 22 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) انجام شد. برای بررسی تفاوت میان متغیرها از Chi-square test, Independent t-test و آنالیز واریانس (ANOVA x2) استفاده شد. در تمامی موارد سطح معناداری کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

مطلوبی انجام گردید. واکنش زنجیره ای پلیمرز PCR با استفاده از دستگاه ترموسایکلر Applied Veriti™ Thermal Cyclers (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) تحت شرایط دمایی و زمانی مشخص انجام گردید.



شکل ۱: الگوهای ژنوتایپینگ مربوط به پلی مورفیسم (rs1929992) اینترلوکین ۳۳ با استفاده از تکنیک PCR-RFLP

جدول ۱: پرایمر و آنزیم محدودالتر مورد استفاده ژن اینترلوکین ۳۳ مربوط به پلی مورفیسم rs1929992

نام آنزیم	پرایمر رفت	پرایمر برگشت
SspI	5-SGGATTGGAATCCCATGGTC-3	5-GAAGTCATCATCAACTTGGGAACC-3

جدول ۲: فراوانی پلی مورفیسم rs1929992 در ژن اینترلوکین ۳۳ در بیماران در مقایسه با افراد سالم


ژنوتایپ	بیماران	کنترل	P*
AA	۳۸ (/۲۷/۱)	۱۳ (/۹/۳)	۰/۰۰۰۱
AG	۲۵ (/۱۷/۹)	۴۱ (/۲۹/۳)	۰/۲
GG	۷۷ (/۵۵)	۸۶ (/۶۱/۴)	۰/۲۷
A	۱۰۱ (/۳۷/۰۷)	۶۷ (/۲۳/۹)	۰/۰۰۱
G	۱۷۹ (/۶۳/۹)	۲۱۳ (/۷۶/۰۷)	۰/۰۰۱

* P<۰/۰۵ معنادار می باشد. آزمون آماری مورد استفاده: Independent t-test.

جدول ۳: فراوانی پلی مورفیسم rs1929992 در ژن IL-33 در گروه‌های مختلف بیماران در مقایسه با گروه کنترل

گروه	AA	AG	GG	تعداد کل	آل A	آل G
عودکننده-بهبودیابنده (RR-MS)	۲۴ (٪۲۳/۵)	۱۹ (٪۱۸/۶)	۵۹ (٪۵۷/۸)	۱۰۲ (٪۱۰۰)	۶۷ (٪۳۲/۸۴)	۱۳۷ (٪۷۱/۵)
پیشرونده-ثانویه (SP-MS)	۱۱ (٪۳۹/۳)	۴ (٪۱۴/۳)	۱۳ (٪۴۶/۴)	۲۸ (٪۱۰۰)	۲۶ (٪۴۶/۴۲)	۳۰ (٪۵۳/۵۷)
پیشرونده-اولیه (PP-MS)	۱ (٪۵/۳)	۸ (٪۴۲/۱)	۱۰ (٪۵۲/۶)	۱۹ (٪۱۰۰)	۱۰ (٪۲۶/۳)	۲۸ (٪۷۳/۶)
عودکننده-پیشرونده (RP-MS)	۰ (٪۰/۰)	۰ (٪۰/۰)	۲ (٪۱۰۰)	۲ (٪۱۰۰)	۰ (٪۰/۰)	۴ (٪۱۰۰)
کنترل	۱۳ (٪۹/۳)	۴۱ (٪۲۹/۳)	۸۶ (٪۶۱/۴)	۱۴۰ (٪۱۰۰)	۶۷ (٪۲۳/۹۲)	۲۱۳ (٪۸۶/۰)

فراوانی ژنوتایپ AA در بیماران SP-MS و PP-MS به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل می‌باشد ($P=۰/۰۳$). در بیماران RR-MS، فراوانی ژنوتایپ AG به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود ($P=۰/۰۱$). همچنین در بیماران RR-MS، SP-MS و PP-MS فراوانی آلل A به طور معناداری بالاتر از گروه کنترل بود، (به ترتیب $P=۰/۰۳$ ، $P=۰/۰۱$ و $P=۰/۰۱$)، اما فراوانی آلل G در این فرم‌های بیماری کمتر از گروه کنترل بود (به ترتیب $P=۰/۰۳$ ، $P=۰/۰۱$ و $P=۰/۰۱$).



نمودار ۱: فراوانی پلی مورفیسم ژن (rs1929992) اینترلوکین ۳۳ در گروه‌های مختلف بیماران در مقایسه با گروه کنترل

بحث

مطابق با مطالعات Latiano و همکارانش، مشخص شد که IL-33 در برخی بیماری‌های خودایمن و التهابی نقش دارد از جمله در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده (IBD)، در این پژوهش که در ایتالیا انجام شد، گزارش گردید که پلی مورفیسم IL-33 در ناحیه rs3939286 با استعداد ابتلا به IBD ارتباط دارد.^{۱۰} همچنین در مطالعه Wang و همکارانش که بر روی بیماران مبتلا به هاشیماتو در جمعیت چین انجام شد، مشخص گردید که ارتباط معناداری بین پلی مورفیسم IL-33 در ناحیه rs917997 با فراوانی آلل A و ژنوتایپ AA وجود دارد.^{۱۱} تمام این شواهد نشان‌دهنده نقش التهابی IL-33 می‌باشد که منجر به فعال شدن سلول‌های ایمنی و افزایش مسیرهای پیام‌رسانی آن‌ها می‌شود. نقش برجسته IL-33 در گسترش بیماری‌زایی مولتیپل اسکلروزیس به واسطه افزایش بیان IL-33 یا ST2 در بافت‌های عصبی ثابت گردید.^{۱۳} به طوری که سطح این سایتوکین به میزان چشمگیری در ماده سفید مغز و پلاک‌های موجود در CNS افراد بیمار افزایش می‌یابد. قابلیت فعال‌سازی سلول‌های اندوتلیال

یافته‌ها

فراوانی ژنوتایپ‌های AA, AG, GG و همچنین آلل‌های A و G در پلی مورفیسم ژن IL-33 در بیماران مبتلا به MS و افراد سالم مشابه نبود (جدول ۲). در افراد بیمار فراوانی ژنوتایپ AA بیشتر از گروه کنترل بود ($P=۰/۰۰۱$). در مقابل فراوانی ژنوتایپ AG در گروه کنترل بیشتر از گروه بیمار بود ($P=۰/۰۲$). تفاوت معناداری در ژنوتایپ GG در دو گروه کنترل و بیمار مشاهده نشد. فراوانی آلل A در بیماران بالاتر از گروه کنترل بود، در صورتی که فراوانی آلل G کمتر از گروه کنترل بود ($P=۰/۰۰۱$).

همچنین تفاوت معناداری در میزان فراوانی ژنوتایپ‌های AA, AG و آلل‌های G و A در گروه‌های مختلف بیماران نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید (جدول ۳ و نمودار ۱). به طوری که

بهجت در جمعیت ترکیه ارتباط معناداری وجود ندارد.^۸ تناقض در این نتایج می‌تواند به دلیل متفاوت بودن جمعیت مورد مطالعه، نوع بیماری و همچنین تفاوت‌های ژنتیکی افراد و معیارهای انتخاب نمونه و تعداد نمونه‌ها باشد.

نتایج پژوهش کنونی نشان داد که تفاوت معناداری در میزان فراوانی ژنوتایپ‌های AA, AG, GG و آلل‌های A و G در گروه‌های مختلف بیماران مشاهده وجود دارد. فراوانی ژنوتایپ AA در بیماران با الگوهای RR-MS و PP-MS و فراوانی ژنوتایپ AG در گروه‌های RR-MS و SP-MS به‌طور معناداری پایین‌تر از سایر گروه‌ها بود.

سپاسگزار: نویسندگان مقاله، کمال تشکر و قدردانی را از همکاری سازمان انتقال خون کرمان و کارشناس آزمایشگاه گروه هماتولوژی، سرکار خانم مهناز محمدی‌زاده و جناب آقای دکتر عبدالله جعفرزاده را اعلام می‌دارد.

را نیز دارد و باعث افزایش نفوذپذیری سلول‌های اندوتلیال به‌همراه کاهش اتصال سلول-سلول در شرایط آزمایشگاهی می‌شود،^{۱۴} و از آنجایی که شکسته شدن سد خونی-مغزی یک مرحله ضروری برای ایجاد التهاب در CNS می‌باشد، براساس مطالعات انجام‌شده مشخص شده است که CNS دارای بالاترین میزان بیان mRNA IL-33 در بین سایر ارگان‌ها می‌باشد^{۱۵} که نشان‌دهنده این است که IL-33 از طریق اختلال در سدخونی-مغزی باعث ایجاد التهاب در بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا EAE می‌شود.^{۱۶} برخلاف نتایج مطالعات پیشین، همسو با مطالعه Fan و همکارانش در سال ۲۰۱۴ این نتیجه حاصل شد که پلی‌مورفیسم rs1929992 IL-33 با حساسیت و شدت ابتلا به بیماری اسپوندیلیت انکیلوزان (AS) در جمعیت چین ارتباط معناداری ندارد.^۷ همچنین نتایج پژوهش‌های Koca و همکارانش در سال ۲۰۱۴ نشان داد که بین پلی‌مورفیسم IL-33 در ناحیه rs1929992 و استعداد ابتلا به بیماری

References

- Jafarzadeh A, Jamali M, Mahdavi R, Ebrahimi HA, Hajghani H, Khosravimashizi A, et al. Circulating levels of interleukin-35 in patients with multiple sclerosis: evaluation of the influences of FOXP3 gene polymorphism and treatment program. *J Mol Neurosci* 2015;55(4):891-7.
- Rose LM, Ginsberg AH, Rothstein TL, Ledbetter JA, Clark EA. Selective loss of a subset of T helper cells in active multiple sclerosis. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1985;82(21):7389-93.
- Schmitz J, Owyang A, Oldham E, Song Y, Murphy E, McClanahan TK, et al. IL-33, an interleukin-1-like cytokine that signals via the IL-1 receptor-related protein ST2 and induces T helper type 2-associated cytokines. *Immunity* 2005;23(5):479-90.
- Kurowska-Stolarska M, Hueber A, Stolarski B, McInnes IB. Interleukin-33: a novel mediator with a role in distinct disease pathologies. *J Intern Med* 2011;269(1):29-35.
- Oboki K, Ohno T, Kajiwara N, Saito H, Nakae S. IL-33 and IL-33 receptors in host defense and diseases. *Allergol Int* 2010;59(2):143-60.
- Matsuyama Y, Okazaki H, Tamemoto H, Kimura H, Kamata Y, Nagatani K, et al. Increased levels of interleukin 33 in sera and synovial fluid from patients with active rheumatoid arthritis. *J Rheumatol* 2010;37(1):18-25.
- Fan D, Ding N, Yang T, Wu S, Liu S, Liu L, et al. Single nucleotide polymorphisms of the interleukin-33 (IL-33) gene are associated with ankylosing spondylitis in Chinese individuals: a case-control pilot study. *Scand J Rheumatol* 2014;43(5):374-9.
- Koca SS, Kara M, Deniz F, Ozgen M, Demir CF, Ilhan N, et al. Serum IL-33 level and IL-33 gene polymorphisms in Behçet's disease. *Rheumatol Int* 2015;35(3):471-7.
- Koca SS, Pehlivan Y, Kara M, Alibaz-Oner F, Oztuzcu S, Yilmaz N, et al. The IL-33 gene is related to increased susceptibility to systemic sclerosis. *Rheumatol Int* 2016;36(4):579-84.
- Latiano A, Palmieri O, Pastorelli L, Vecchi M, Pizarro TT, Bossa F, et al. Associations between genetic polymorphisms in IL-33, IL1R1 and risk for inflammatory bowel disease. *PLoS One* 2013;8(4):e62144.
- Wang X, Zhu YF, Li DM, Qin Q, Wang Q, Muhali FS, et al. Polymorphisms of ST2-IL18R1-IL18RAP gene cluster: a new risk for autoimmune thyroid diseases. *Int J Immunogenet* 2016;43(1):18-24.
- Cayrol C, Girard JP. IL-33: an alarmin cytokine with crucial roles in innate immunity, inflammation and allergy. *Curr Opin Immunol* 2014;31:31-7.
- Li M, Li Y, Liu X, Gao X, Wang Y. IL-33 blockade suppresses the development of experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice. *J Neuroimmunol* 2012;247(1-2):25-31.
- Choi YS, Choi HJ, Min JK, Pyun BJ, Maeng YS, Park H, et al. Interleukin-33 induces angiogenesis and vascular permeability through ST2/TRAF6-mediated endothelial nitric oxide production. *Blood* 2009;114(14):3117-26.
- Préfontaine D, Lajoie-Kadoch S, Foley S, Audusseau S, Olivenstein R, Halayko AJ, et al. Increased expression of IL-33 in severe asthma: evidence of expression by airway smooth muscle cells. *J Immunol* 2009;183(8):5094-103.
- Singhal G, Jaehne EJ, Corrigan F, Toben C, Baune BT. Inflammasomes in neuroinflammation and changes in brain function: a focused review. *Front Neurosci* 2014;8:315.

IL-33 polymorphism rs1929992 and its association with susceptibility to different pattern of multiple sclerosis

Mitra Jamali M.Sc.¹
 Mehdi Rostami Rad Ph.D.²
 Gholamreza Anani Sarab Ph.D.³
 Roya Mahdavi M.Sc.^{4*}

1- Department of Immunology,
 School of Medicine, Kerman Uni-
 versity of Medical Sciences, Ker-
 man, Iran.

2- Department of Microbiology,
 School of Medicine, Tehran Univer-
 sity of Medical Sciences, Tehran,
 Iran.

3- Department of Immunology,
 Infectious Diseases Research Cen-
 ter, Birjand University of Medical
 Sciences, Birjand, Iran.

4- Department of Immunology,
 School of Paramedicine, Birjand
 University of Medical Sciences,
 Birjand, Iran.

* Corresponding author: Laboratory of
 Research Center, Department of Medical
 Immunology, School of Paramedicine,
 Birjand University of Medical Sciences,
 Birjand, Iran.
 Tel: +98 56 32381607
 E-mail: royamahdavi1986@gmail.com

Abstract

Received: 03 May 2018 Revised: 10 May 2018 Accepted: 07 Oct. 2018 Available online: 22 Oct. 2018

Background: Multiple sclerosis is the most common autoimmune demyelinating disease of the central nervous system (CNS). Interleukin-33 (IL-33) is a cytokine with both pro-inflammatory and anti-inflammatory activities that implicated in the pathogenesis of some autoimmune diseases. The aim of this study was to determine single nucleotide polymorphism (SNP) of IL-33, rs1929992, in patient's gene with multiple sclerosis (MS) and investigation of this polymorphism with susceptibility to MS.

Methods: In this case-control study, peripheral blood samples were collected from 140 MS patients (patients in the Afzalipur Hospital in Kerman) and blood sample of 140 healthy subjects (people referred to the Blood Transfusion Organization) as a control group from March 2016 to January 2018. SNP at rs1929992 was determined by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method.

Results: There was significant difference between healthy control group and patient with multiple sclerosis in the frequency of genotypes. The frequency of AA genotype at rs1929992 was significantly higher in the MS group in comparison with healthy control subjects ($P= 0.0001$), whereas frequency of AG genotype was significantly higher in the control group as compared with MS group ($P= 0.02$). There was no significant difference between the MS patients and healthy control group in GG genotype. Moreover, the frequencies of AA genotype at SNP rs1929992 were significantly higher in patients with secondary progressive MS (SP-MS) and primary progressive MS (PP-MS) as compared with control group ($P= 0.03$). However, the frequencies of AG genotype was significantly lower in patients with relapsing-remitting MS (RRMS) in comparison to the healthy group ($P= 0.01$). In patients with RR-MS, PP-MS and SP-MS patterns, the frequencies of A allele was significantly higher than that in control group ($P= 0.03$, $P= 0.01$, $P= 0.001$). In patients with RR-MS, PP-MS and SP-MS pattern, the frequency of G allele was significantly lower than control group ($P= 0.03$, $P= 0.01$, $P= 0.001$).

Conclusion: The results of this study suggest that the SNP rs1929992 in IL-33 gene, may be associated with different pattern of MS susceptibility.

Keywords: interleukin-33, multiple sclerosis, polymorphism.