

خون

فصلنامه پژوهشی

دوره ۱۲ شماره ۴ زمستان ۹۴ (۳۰۳-۳۱۰)

مقاله پژوهشی

شیوع آنتیژن Kell در کیسه‌های خون اهدایی مورد استفاده در درمانگاه بیماران بزرگسال تالاسمی

آریانا آذرکیوان^۱، معصومه هداوند خانی^۲، مصطفی مقدم^۳، زهرا شابه پور^۴، سمانه علیزاده^۵، محسن زارعی^۶

چکیده

سابقه و هدف

یکی از مشکلات تزریق خون مزمن؛ آلوایمیونیزاسیون یا به وجود آمدن آنتی‌بادی علیه زیرگروه‌های خونی است. یکی از این زیرگروه‌ها، آنتی‌ژن‌های سیستم Kell می‌باشد. در این مطالعه بر آن شدید که درصد فراوانی گروه خونی Kell را در کیسه خون‌های اهدایی که در درمانگاه تالاسمی مصرف می‌شود تعیین نماییم.

مواد و روش‌ها

در یک مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۲، بر روی کلیه کیسه خون‌هایی که برای تزریق خون به درمانگاه تالاسمی آورده می‌شد، ابتدا مشخصات هر کیسه خون شامل گروه خون، شماره کیسه خون، سن و جنس اهدا کننده ثبت شده و سپس از هر کیسه یک کورد جدا و با کیت آنتی Kell بررسی شد. نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS ۱۸ و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

تعداد ۱۱۵۵۷ کیسه خون در طول یک سال بررسی شد، ۹۸/۷٪ مربوط به مردان و ۱/۳٪ زنان بودند. کمترین سن اهدا ۱۷ سال و مسن‌ترین اهداکننده ۶۵ سال بود. در میان اهداکنندگان؛ ۱۹/۶٪ اهداکننده بار اول، ۲۷/۴٪ با سابقه و ۵۲/۹٪ اهداکننده مستمر بودند. در میان اهداکنندگان؛ ۹۶/۲٪ کیسه، آنتی‌ژن Kell منفی و ۴۳۹ (۳/۸٪) کیسه، آنتی‌ژن Kell مثبت بودند.

نتیجه‌گیری

در این مطالعه نشان داده شد که کمتر از ۴٪ افراد اهداکننده از لحاظ آنتی‌ژن Kell مثبت هستند و با توجه به عواقب یک واکنش همولیتیک در یک بیمار با تزریق خون مزمن، بهتر است که کیسه‌های خون برای این مصرف کنندگان غریب‌الشود و چون بیش از ۹۶٪ کیسه‌ها آنتی‌ژن منفی هستند، لذا می‌توان کیسه‌های آنتی‌ژن Kell مثبت را از چرخه تزریق خون حذف کرد.

کلمات کلیدی: تالاسمی، اهداکنندگان خون، فراوانی

تاریخ دریافت: ۹۳/۱۱/۱

تاریخ پذیرش: ۹۴/۶/۱۸

-
- ۱- مؤلف مسئول: فوق تخصص هماتولوژی و انکولولوژی کودکان - دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و درمانگاه تالاسمی - تهران - ایران - صندوق پستی: ۱۴۶۶۵-۱۱۵۷
 - ۲- پژوهش عمومی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و درمانگاه تالاسمی - تهران - ایران
 - ۳- کارشناس ارشد ایمونوهماتولوژی - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون - تهران - ایران
 - ۴- کارشناس بانک خون - مرکز تحقیقات انتقال خون - مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و درمانگاه تالاسمی - تهران - ایران

۴۵۶

یک بیماری همولیتیک در نوزاد این خانم شده بود. این آنتی‌بادی anti-Kell یا anti-K گروه با نام k یا 2 KEL سه سال بعد شناسایی شد(۱۴). ژن Kell بر روی کروموزوم ۷ قرار دارد(7q34) و خاصیت پلی‌مورفیسم بالایی دارد. سیستم Kell هم اکنون ۳۵ آنتی‌ژن دارد که از KEL1 تا KEL38 نام‌گذاری شده است. این سیستم شامل شش آلل دوتایی و یک آلل سه تایی است(۱۵).

آنتی‌ژن Kell روی گلیکوپروتئین غشاء گلبول قرمز (CD238) قرار داشته و در بین آنتی‌ژن‌های گروه خونی به نوعی منحصر به فرد است چون روی تیپ II گلیکوپروتئین غشای گلبول قرمز قرار دارد. آنتی‌ژن K پس از آنتی‌ژن Rh(D)، از قابلیت ایمونوژنیک بالایی برخوردار است و آنتی‌بادی‌های مرتبط با آن به عنوان آنتی‌بادی‌هایی با اهمیت بالینی تلقی می‌شوند. آنتی‌بادی‌های Kell عمدتاً از کلاس IgG هستند. این آنتی‌بادی‌ها منجر به ایجاد بیماری همولیتیک نوزاد یا جنین و هم‌چنین بروز واکنش‌های ناشی از تزریق خون می‌شوند(۱۶).

درمانگاه بیماران بزرگسال تالاسمی زیر نظر سازمان انتقال خون ایران، از سال ۱۳۷۴ افتتاح و در حال ارایه خدمت به بیماران گروه تالاسمی است. خون‌های این مرکز که برای تزریق خون بیماران استفاده می‌شود، روزانه از واحد انتقال خون پایگاه وصال آورده شده و کمتر از یک هفته از تولید آن‌ها گذشته است. از آنجایی که درمانگاه بیماران بزرگسال تالاسمی؛ بزرگترین مرکز بیماران بزرگسال تالاسمی در ایران است و با بیش از ۳۵۰۰ بیمار ارجاعی از شهرستان‌ها؛ یک مرکز ارجاع محسوب شده و بسیاری از بیماران با واکنش‌های خونی و به خصوص آلوایمیونیزاسیون به این مرکز مراجعه می‌نمایند، لذا امنیت در تزریق خون به ویژه برای این بیماران ارجاعی اهمیت ویژه‌ای دارد. با توجه به بالا بودن آمار anti-Kell در بیماران، از سال ۱۳۸۶ خون‌هایی که برای تزریق خون از پایگاه انتقال خون به درمانگاه تالاسمی اختصاص داده می‌شد از نظر آنتی‌ژن Kell مورد بررسی و در صورت منفی بودن مورد استفاده قرار می‌گرفت. مطالعه حاضر یک بررسی مقطعی یک ساله برروی کیسه‌های خون از نظر

بیماری تالاسمی شایع‌ترین کم خونی ارثی در کشور ما است. در این بیماری به دلیل اختلال ژنتیکی در ساختمان هموگلوبین و عدم تعادل زنجیرهای، همولیز زودرس و تخریب گلبول‌های قرمز را داریم. کم خونی شدید در این بیماران با تزریق خون منظم درمان می‌شود(۲، ۱). اما از آن جایی که این درمان باید مادام‌العمر باشد، لذا در تزریق خون در بیماران تالاسمی باید به عوارض طولانی مدت آن، توجه داشته باشیم. یکی از این عوارض، واکنش‌های همولیتیک تأخیری است(۴). حدود ۳۳ گروه خونی مختلف در سطح گلبول قرمز تعریف شده است و به هر حال هر کدام بالقوه یک آنتی‌ژن محسوب می‌شوند. در یک تزریق خون معمولی، در کراس مچ (آزمایش سازگاری خون) کیسه خون از نظر گروه‌های اصلی ABO و Rh (D) کترول و با بیمار آزمایش سازگاری می‌شود ولی سایر زیر گروه‌های خونی کترول نمی‌گردد(۴-۶)، اما در بیماران تالاسمی که به طور مداوم خون می‌گیرند؛ در تزریق هر واحد خون تعدادی از این آنتی‌ژن‌های گروه‌های خونی (که برای بیمار بیگانه تلقی می‌شود) وارد بدن بیمار شده و به مرور زمان آنتی‌بادی علیه این آنتی‌ژن‌های غیر خودی به وجود می‌آید (آنتی‌بادی‌های نامنظم) و همین باعث بروز واکنش‌های خونی (واکنش همولیتیک تاخیری یا آلوایمیونیزاسیون) می‌گردد(۷). مطالعه‌ها نشان می‌دهد که بیشترین آنتی‌بادی‌های تولید شده مربوط به زیر گروه‌های Rh و گروه خونی Kell است(۹-۱۴). مطالعه‌های موجود در درمانگاه بیماران بزرگسال تالاسمی هم مؤید این نظریه است. در مطالعه‌ای در این مرکز که روی ۴۴۱ بیمار انجام شد، شیوع آلوآنتی‌بادی‌ها ۱۱/۳٪ بود که در ۰/۲۸٪ و در ۰/۶٪ هم آنتی‌بادی‌های ترکیبی از زیر گروه‌های Rh و Kell بودند(۱۲).

آنتی‌ژن Kell که نام دقیق آن K یا KEL 1 است، در واقع آنتی‌ژن اصلی سیستم Kell بوده و اولین آنتی‌ژنی در سیستم گروه خونی بود که در سال ۱۹۶۴ توسط آزمایش آنتی‌گلبولین شناسایی شد. نام‌گذاری این سیستم گروه خونی در ارتباط با فردی به نام خانم Kelleher بود. در سرم خون وی آنتی‌بادی‌هایی یافت شد که باعث بروز

مثبت از نظر آنتیژن Kell برای بیماران تالاسمی استفاده نمی‌شود و این خون‌ها از چرخه مصرف در درمانگاه خارج می‌گردد. نتایج این اطلاعات جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار ۱۸ SPSS و آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

تعداد ۱۱۵۵۷ کیسه خون در طول یکسال بررسی شد. اهداکنندگان این خون‌ها شامل ۱۱۴۰۵ (۹۸/۷٪) نفر مرد و ۱۵۲ نفر (۱/۳٪) زن بودند. کمترین سن اهدا ۱۷ سال و مسن‌ترین اهداکننده ۶۵ سال بود(جدول ۱). در میان اهداکنندگان، ۲۲۶۸ نفر (۱۹/۶٪) اهداکننده بار اول بودند، ۳۱۷۲ نفر (۲۷/۴٪) قبلًا ساقبه اهدا داشتند و ۶۱۱۷ نفر (۵۲/۹٪) اهداکننده مستمر بودند(جدول ۲). شیوع گروههای خونی نیز در اهداکنندگان بررسی شد(جدول ۳). در بررسی فراوانی آنتیژن Kell (آنتیژن KELL) در زیر گروههای خونی کیسه‌های ارجاعی به درمانگاه بیماران تالاسمی، از مجموع ۱۱۵۵۷ کیسه؛ (۹۶/۲٪) آنتیژن Kell منفی و (۳/۸٪) آنتیژن Kell مثبت بودند(جدول ۴).

شیوع آنتیژن Kell بود. با توجه به حجم نمونه، این شیوع را شاید بتوان به شیوع این آنتیژن در جمعیت اهداکنندگان نیز تعمیم داد.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه؛ در یک بررسی مقطعی در سال ۱۳۹۲ کلیه کیسه خون‌هایی که برای تزریق خون به درمانگاه تالاسمی آورده می‌شد، ثبت و وجود آنتیژن Kell بر روی آن‌ها بررسی گردید. روش مطالعه بدین ترتیب بود که ابتدا مشخصات هر کیسه خون شامل گروه خون، شماره کیسه، سن و جنس اهداکننده ثبت می‌شد و سپس از هر کیسه یک کورد جدا و با کیت آنتی Kell بررسی می‌شد. هر نمونه کورد در سه نوبت با استفاده از محلول نرمالین سالین شستشو شده و پس از اتمام شستشو یک سوسپانسیون ۳٪ تا ۵٪ آماده و یک قطره از آن داخل لوله آزمایش ریخته و یک قطره از آنتی Kell به آن اضافه گردید و سپس عمل سانتریفوج انجام شد. نتیجه آزمایش بر روی لام و با میکروسکوپ مشاهده گردید. وجود آگلوتیناسیون یا لخته دال بر مثبت بودن کیسه خون و نمونه کورد آن از لحاظ آنتیژن Kell بود. در درمانگاه تالاسمی، کیسه‌های خون

جدول ۱: فراوانی گروههای سنی اهداکنندگان بر حسب جنس

درصد	فراوانی	جنسيت		گروه سنی
		مرد	زن	
۴/۷	۵۳۸	۵۲۴	۱۴	< ۲۰
۱۰/۸	۱۲۴۷	۱۲۱۶	۳۱	۲۱-۲۵
۱۶	۱۸۴۹	۱۸۲۹	۲۰	۲۶-۳۰
۱۴	۱۶۱۸	۱۶۰۵	۱۳	۳۱-۳۵
۱۶/۱	۱۸۵۹	۱۸۴۲	۱۷	۳۶-۴۰
۱۴/۷	۱۷۰۴	۱۶۸۷	۱۷	۴۱-۴۵
۱۱/۷	۱۳۵۳	۱۳۳۶	۱۷	۴۶-۵۰
۷/۱	۸۲۵	۸۱۱	۱۴	۵۱-۵۵
۴	۴۶۱	۴۵۳	۸	۵۶-۶۰
۰/۹	۱۰۳	۱۰۲	۱	۶۱-۶۵
۱۰۰	۱۱۵۵۷	(۹۸/۷) ۱۱۴۰۵	(۱/۳) ۱۵۲	جمع (درصد)

جدول ۲: فراوانی گروه‌های سنی اهداکنندگان بر حسب دفعات اهدا

اهداکنندگان			گروه‌های سنی
اهداکنندگان مثبت (درصد)	اهداکنندگان مکرر (درصد)	اولین اهدا (درصد)	
(۲/۹) ۱۷۸	(۶/۲) ۹۶	(۷/۲) ۶۴	< ۲۰
(۱۰) ۶۰۹	(۸/۱) ۲۵۷	(۱۶/۸) ۳۸۱	۲۱-۲۵
(۱۵/۲) ۹۳۲	(۱۴/۵) ۴۵۹	(۲۰/۲) ۴۵۸	۲۶-۳۰
(۱۳/۶) ۸۳۳	(۱۴/۱) ۴۴۶	(۱۴/۹) ۳۳۹	۳۱-۳۵
(۱۶/۲) ۹۹۲	(۱۷/۲) ۵۴۵	(۱۴/۲) ۳۲۲	۳۶-۴۰
(۱۶) ۹۷۹	(۱۵/۵) ۴۹۱	(۱۰/۳) ۲۳۴	۴۱-۴۵
(۱۲/۹) ۷۹۰	(۱۱/۹) ۳۷۸	(۸/۲) ۱۸۵	۴۶-۵۰
(۷/۸) ۴۷۵	(۷/۴) ۲۳۶	(۵) ۱۱۴	۵۱-۵۵
(۴/۲) ۲۵۸	(۴/۲) ۱۳۲	(۳/۱) ۷۱	۵۶-۶۰
(۱/۲) ۷۱	(۱) ۳۲	(۰) ۰	۶۱-۶۵
(۵۲/۹) ۶۱۱۷	(۲۷/۴) ۳۱۷۲	(۱۹/۶) ۲۲۶۸	جمع (درصد)

بحث

در این تحقیق، در بررسی فراوانی آنتی ژن Kell در زیر

گروه‌های خونی کیسه‌های اهداکنندگان، ۱۱۱۱۸ (٪۹۶/۲) کیسه، آنتی ژن Kell منفی و ۴۳۹ (٪۳/۸) کیسه، آنتی ژن Kell مثبت بودند. سیستم گروه خونی Kell بعد از Rh، یکی از مهم‌ترین زیر گروه‌های خونی محسوب می‌شود. این سیستم ۳۵ آنتی ژن و آلل‌های متفاوتی دارد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها K/k می‌باشد که به نام KEL1 یا K و KEL2 یا k نام‌گذاری می‌شود. K و k آلل‌های اتوژوم هم زمان (Co-dominant) هستند و تنها در یک نوکلئوتید با هم فرق دارند. در اگزون ۶ در جایگاه ۱۹۳ در آلل K متیونین و در آلل k تیروزین است. آلل K دارای خاصیت آنتی ژنسیتی بالایی است و در افرادی که این آنتی ژن را ندارند، قادر به تحریک تولید آنتی بادی است (۱۵).

فراوانی آنتی ژن‌های سیستم Kell در مناطق مختلف جغرافیایی و جوامع متفاوت است. تقریباً ۹٪ سفیدپوستان و ۲٪ سیاهپوستان از نظر K مثبت هستند (KK، Kk). سایرین از نظر K منفی می‌باشند (kk). شیوع آنتی ژن (KEL1) K در شمال اروپا حدود ۹٪ ذکر شده است و در جمیعت‌های آفریقایی حدود ۱/۵٪ می‌باشد. آنتی ژن k (KEL2) در مناطق مختلف جهان دارای فراوانی بالاتری

جدول ۳: فراوانی گروه‌های خونی اهداکنندگان

گروه خونی	فراوانی	درصد
A منفی	۴۱۳	۳/۶
A مثبت	۳۴۰۵	۲۹/۵
AB منفی	۴۰۷	۳/۵
AB مثبت	۷۸۲	۶/۸
B منفی	۱۶۰	۱/۴
B مثبت	۲۱۵۵	۱۸/۶
O منفی	۸۲۸	۷/۲
O مثبت	۳۴۰۶	۲۹/۵
Group Mismatch	۱	۰/۰
جمع	۱۱۵۵۷	۱۰۰

جدول ۴: فراوانی آنتی ژن Kell در زیر گروه‌های خونی اهداکنندگان

Kell	فراوانی	درصد
منفی	۱۱۱۱۸	۹۶/۲
مثبت	۴۳۹	۳/۸
جمع	۱۱۵۵۷	۱۰۰

جدول ۵: فراوانی آنتیژن‌های سیستم گروه خونی Kell در جوامع مختلف(۱۶)

پلی‌مورفیسم	تشخیص مولکولی	پایین	فرابنده نسبی	زیاد
Caucasian, Africans Caucasians	Thr193Met Arg281Trp	KEL1	K	KEL2 KEL4
Not polymorphic	Arg281Gin	KEL21	Kp ^a	Kp ^b
Africans	Leu597Pro	KEL6	Js ^a	Js ^b
Not polymorphic	Val302Ala	KEL17	K17	K11
Not polymorphic	Arg180Pro	KEL24	K24	K14
Not polymorphic	Arg248Gin	KEL25	VLAN	Not identified
Not polymorphic	Arg248Trp	KEL28	VONG	

تزریق مکرر خون و آزمایش‌های غربالگری آنتی‌بادی مثبت یا کراس‌مچ مثبت داشتند، از لحاظ تعیین نوع آنتی‌بادی انجام شد و از ۸۱ آنتی‌بادی تعیین شده در این ۱۵۰ بیمار، شیوع ۳۲٪ Anti-Kell گزارش شد(۱۹).

مطالعه‌ای بر روی ۶۵۱ اهداکننده در غرب آفریقا فراوانی آنتی‌زن K را ۷۷٪/۰.۰٪ گزارش نمود(۲۰). در مطالعه دیگری در هلند، شیوع KEL1 در ۴۰۷ اهداکننده، ۷۴٪/۰.۷٪ گزارش شده که البته واریانت‌های ژنتیکی این گروه را نیز استخراج کرده است(۲۱). در هند بررسی روی خون ۱۰۰ اهداکننده، فراوانی آنتی‌زن K را در ۱۰۰٪ آنها گزارش کرده و در واقع آنتی‌زن K یا فنوتیپ $K^{+}K^{-}$ را در گروه مورد مطالعه به دست نیاورده است(۲۲). اما مطالعه دیگری در دهلی در یک بررسی یک ساله بر روی ۳۰۷۳ اهداکننده، شیوع ۹۷٪/۰.۹۹٪ K و ۵٪/۰.۳٪ K به دست آمد(۲۳).

همان طور که ذکر شد؛ آنتی‌زن K از قابلیت آنتی‌ژنتیکی بالایی برخوردار است و آنتی‌بادی‌های مرتبط با آن به عنوان آنتی‌بادی‌های با اهمیت بالینی تلقی می‌شوند. آلوآنتی‌بادی‌های Kell عمده‌ای از نوع IgG بوده و می‌توانند از جفت رد شده و در جنین ایجاد بیماری همولیتیک نوزادی یا جنینی کنند، هم چنین باعث بروز واکنش‌های ناشی از تزریق خون به خصوص در بیماران با تزریق خون مزمن مثل بیماران تالاسمی شوند(۲۴). بر اساس آمارهای موجود در مطالعه‌های مختلف، دو سوم آلوآنتی‌بادی‌های تولید شده در بدن این بیماران مربوط به زیر گروه‌های Rh و Kell است(۹-۱۴).

از آن جایی که در این مطالعه نشان داده شد که کمتر از

است. علاوه بر آنتی‌ژن‌های KEL1 و KEL2، آنتی‌ژن‌های دیگر این سیستم با فراوانی کمتر و متفاوت در جمعیت‌ها و نژادهای مختلف مشاهده می‌شود. برای مثال Kp^b (KEL3) در ۲٪ از قفقازی‌ها گزارش شده است. Kp^a (KEL4) در تمام جمعیت‌ها شیوع بالایی دارد، آنتی‌زن Js^b (KEL7) عمده‌ای در جمعیت‌های اصیل آفریقایی با شیوع بالا و بر عکس آنتی‌زن Js^a (KEL6) با فراوانی کمتر یافت می‌شود(جدول ۵)(۱۶).

شاید اولین مطالعه انجام شده در ایران در رابطه با گروه‌های خونی؛ توسط دکتر فرهود و دکتر افتخاری در سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴) انجام شد که بر روی ۲۹۱۸۵۷ اهداکننده از ۲۴ استان بود. در رابطه با گروه خونی سیستم Kell نتایج (۶۶٪/۰.۹٪)، kk (۷۷٪/۰.۴٪)، Kk (۸۷٪/۰.۵٪) و KK (۸۷٪/۰.۰٪) را به دست آورده و در کل فراوانی KEL1 را در جمعیت تحت مطالعه حدود ۴۰۵٪/۰.۳٪ و فراوانی KEL2 را حدود ۵۹۵٪/۰.۹٪ ذکر کرد(۱۷).

در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۹ در نیجریه انجام گرفت، شیوع آنتی‌زن Kell در بین ۲۰۰ بیمار مراجعه‌کننده به بیمارستان بررسی شد. در این مطالعه شیوع آنتی‌زن Kell برابر ۲٪ و منفی بودن این آنتی‌زن در ۹۸٪ بیماران به دست آمد(۱۸). در مطالعه دیگری که در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ انجام شد، شیوع گروه خونی Kell در ۱۶۰۰ واحد خون اهالی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه فراوانی کلی آنتی‌زن K، ۶٪/۰.۶٪ و فراوانی فنوتیپ‌های Kell به شکل زیر به دست آمد: K⁺K⁻: ۲۵٪/۰.۰٪، K⁺K⁺: ۱۸٪/۰.۶٪ و K⁺K⁺ بود. همین مطالعه هم زمان در سرم ۱۵۰ بیماری که

که بیشتر از دو سوم آنها مربوط به زیر گروههای Rh و Kell هستند و با در نظر گرفتن عوارض شدید آن که گاهی مرگبار هم می‌تواند باشد، هم چنین این مطلب که یک بیمار تالاسمی باید تا آخر عمر تزریق خون داشته باشد و بروز آلواتنی‌بادی در بدن بیمار باعث می‌شود که یافتن خون مناسب و سازگار برای بیمار سخت شود؛ اساس کار، پیشگیری از بروز این آلواتنی‌بادی‌ها است. با غربالگری کیسه‌ها برای آنتی ژن Kell و حذف کیسه‌های آنتی ژن Kell مثبت، می‌توان تا حد زیادی از خطر بروز آلواتنی‌بادی‌ها کاست.

۴٪ افراد اهداکننده (که نشان‌دهنده نمونه‌ای از افراد جامعه ایرانی هستند) از لحاظ آنتی ژن Kell مثبت هستند و با توجه به عواقب یک واکنش همولیتیک در یک بیمار با تزریق خون مزمن، بهتر است که کیسه‌های خون برای این مصرف کنندگان خون غربال شده و با توجه به این که بیش از ۹۶٪ کیسه‌ها آنتی ژن منفی هستند، لذا کیسه‌های آنتی ژن Kell مثبت از چرخه تزریق خون برای این بیماران حذف گردد.

نتیجه گیری

با توجه به شیوع آلایمیونیزاسیون در بیماران تالاسمی

References :

- 1- Rund D, Rachmilewitz E. Pathophysiology of alpha- and beta-thalassemia: therapeutic implication. *Semin hematol* 2001; 38(4): 343-9
- 2- Olivieri N. Thalassemia: clinical management. *Baillieres Clin Haematol* 1998; 11(1): 147-62.
- 3- Wonke B. Clinical management of beta-thalassemia major. *Semin Hematol* 2001; 38(4): 350-9.
- 4- Azarkeivan A, Ahmadi MH, Hajibeigy B, Gharebaghian A, Shabeh Pour Z, Maghsoodlu M. Evaluation of transfusion reactions in thalassemic patients referred to Tehran adult thalassemia Clinic. *The Scientific Journal of Zanjan University of Medical Sciences* 2008; 16(62): 57-65. [Article in Farsi]
- 5- Prati D. Benefits and complications of regular blood transfusion in patients with beta-thalassaemia major. *Vox Sang* 2000; 79(3): 129-37
- 6- Davenport RD. Pathophysiology of hemolytic transfusion reactions. *Semin Hematol* 2005; 42(3): 165-8.
- 7- Pineda AA, Vamvakas EC, Gorden LD, Winters JL, Moore SB. Trends in the incidence of delayed hemolytic and delayed serologic transfusion reactions. *Transfusion* 1999; 39(10): 1097-103.
- 8- Goodnough LT. Risks of blood transfusion. *Anesthesiol Clin North America* 2005; 23(2): 241-52.
- 9- Dhawan HK, Kumawat V, Marwaha N, Sharma RR, Sachdev S, Bansal D, et al. Alloimmunization and autoimmunization in transfusion dependent thalassemia major patients: Study on 319 patients. *Asian J Transfus Sci* 2014; 8(2): 84-8.
- 10- Hussein E, Desooky N, Rihan A, Kamal A. Predictors of red cell alloimmunization in multitransfused Egyptian patients with β-thalassemia. *Arch Pathol Lab Med* 2014; 138(5): 684-8.
- 11- Azarkeivan A, Ahmadi MH, Gharebaghian A, Zolfaghari S, Nasizadeh S, et al. Antibody screening & identification by gel method in chronic transfusion patients (thalassemics). *Sci J Iran Blood Transfus Organ* 2008; 5(2): 233-42. [Article in Farsi]
- 12- Azarkeivan A, Ahmadi MH, Zolfaghari S, Shaiegan M, Ferdowsi S, Rezaei N, et al. RBC alloimmunization and double alloantibodies in thalassemic patients. *Hematology* 2015; 20(4): 223-7.
- 13- Azarkeivan A, Ansari S, Ahmadi MH, Hajibeigy B, Maghsudlu M, Nasizadeh S, et al. Blood transfusion and alloimmunization in patients with thalassemia: multicenter study. *Pediatr Hematol Oncol* 2011; 28(6): 479-85.
- 14- Westhoff CM, Reid ME. Review: The Kell, Duffy, and Kidd blood group systems. *Immunohematology* 2004; 20(1): 37-49.
- 15- Lee S, Zambas ED, Marsh WL, Redman CM. Molecular cloning and primary structure of Kell blood group protein. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1991; 88(14): 6353-7.
- 16- Geoff Daniels, Imelda Bromilow. Essential guide to blood groups. USA: Blackwell Publishing; 2007. p. 45-8.
- 17- Farhud DD, Eftekhar A. Blood groups distribution in Iran. *Iranian Journal of Public Health* 1994; 23(1-4): 1-10.
- 18- Ugboma HA, Nwauche CA. Kell blood group antigen in Port Harcourt, Nigeria-a pilot study. *Port Harcourt Medical Journal* 2009; 4(2): 52403-5.
- 19- Makarovska-Bojadzieva T, Blagoevska M, Kolevski P, Kostovska S. Optimal blood grouping and antibody screening for safe transfusion. *Prilozi* 2009; 30(1): 119-28.
- 20- Siransy Bogui L, Dembele B, Sekongo Y, Abisse S, Konaté S, Sombo M. Phenotypic Profile of Rh and Kell Blood Group Systems among Blood Donors in Côte d'Ivoire, West Africa. *J Blood Transfus* 2014; 2014: 309817.
- 21- Ji Y, Veldhuisen B, Ligthart P, Haer-Wigman L, Jongerius J, Boujnan M, et al. Novel alleles at the Kell blood group locus that lead to Kell variant phenotype in the Dutch population. *Transfusion* 2014; 55(2): 413-21.

- 22- Kahar MA, Patel RD. Phenotype frequencies of blood group systems (Rh, Kell, Kidd, Duffy, MNS, P,Lewis, and Lutheran) in blood donors of south Gujarat, India. Asian J Transfus Sci 2014; 8(1): 51-5.
- 23- Makroo RN, Bhatia A, Gupta R, Phillip J. Prevalence of Rh, Duffy, Kell, Kidd & MNSs blood group antigens in the Indian blood donor population. Indian J Med Res 2013; 137(3): 521-6.
- 24- Zarnani A, Mohammadzadeh Kazorgah A, Ghaffari Novin M, Arefi S, Modarresi M, Shokri F, et al . A case report of recurrent hydrops fetalis due to maternal alloimmunization with Kell antigen. Sci J Iran Blood Transfus Organ 2005; 2(3): 59-64. [Article in Farsi]

Original Article

Frequency of Kell antigen in donor blood bags used in Adult Thalassemia Center

Azarkeivan A.^{1,2}, Hadavand Khani M.^{1,2}, Moghadam M.¹, Shabehpour Z.^{1,2}, Alizadeh S.^{1,2}, Zareie M.^{1,2}

¹Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, Tehran, Iran

²Adult Thalassemia Clinic, Tehran, Iran

Abstract

Background and Objectives

Alloimmunization is one of the side effects of regular blood transfusion in thalassemic patients. We studied the frequency of Kell antigen in donor blood bags used in Adult Thalassemia Clinic in Tehran.

Materials and Methods

Our aim was to screen Kell antigen on the blood bags which came for use in Adult Thalassemia Clinic. First, we recorded the bag number with which we could access the characteristics of the blood donors such as sex, age, number of donation, and so on. Then, for Kell study, we used anti Kell kit on each cord detached from the blood bags. The results were collected and analysed by SPSS18.

Results

In our one year cross sectional study, we checked Kell antigen for 11557 blood bags; 98.7% were for male and 1.3% for female. The minimum age of our donors was 17 years old and maximum 65. Out of the total number of blood donors, 19.6 % were first time, 27.4% had the history of prior donation, and 52.9% were repeated donors. In our kell study for K or KEL1 antigen, we had 96.2% Kell negative bags and 3.8% were Kell positive.

Conclusions

We had the rate of less than 4% positivity of Kell antigen on our donors showing more than 96% Kell negativity. However, for the reduction of the risk of alloimmunization in chronically transfused patients, it is better to check all bags for Kell antigen and prevent the use of Kell positive bags.

Key words: Thalassemia, Blood Donors, frequency

Received: 21 Jan 2015

Accepted: 9 Sep 2015

Correspondence: Azarkeivan A., MD. Pediatrics Hematologist-Oncologist. Associate Professor of Research Center of Iranian Blood Transfusion Organization.
P.O.Box: 14665-1157, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 88074135; Fax: (+9821) 22087853
E-mail: azazarkeivan@yahoo.com