

خون

فصلنامه علمی پژوهشی
دوره ۱۳ شماره ۳ پاییز ۹۵ (۲۲۴-۲۳۲)

مقاله پژوهشی

miR-146a: یک سرکوبگر احتمالی تومور در مالتیپل میلوما

شیما کاظم زاده^۱، علیرضا فارسی نژاد^۱، جاوید صبور تکانلو^۱، سعید کاویانی^۲، امیر آتشی^۳،
مسعود سلیمانی^۴، سعید آبرون^۵

چکیده سache و هدف

میکروRNAها با تنظیم بیان ژن در سطح پس از رونویسی، نقش کلیدی را در کنترل پاسخ‌های ایمنی، التهاب، رشد و مرگ سلولی ایفا می‌نمایند. بسیاری از میکروRNAها به عنوان انکوژن، سرکوبگر تومور و تعدیل‌کننده رشد سلول‌های بنیادی سرطانی عمل می‌نمایند. miR-146a، از میکروRNAهایی است که نقش مهمی در بروز سرطان‌ها ایفا نموده و می‌تواند به عنوان محرك رشد و یا سرکوبگر تومور عمل کند. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تغییرات بیان miR-146a در رده‌های سلولی میلومایی (L363، LP1، RPMI 8226 و KMM1) در مقایسه با لکوسیت‌های طبیعی انجام گرفت.

مواد و روش‌ها

در مطالعه تجربی حاضر، چهار رده سلولی میلومایی و لکوسیت‌های طبیعی جدا شده از خون محیطی فرد سالم در شرایطی معین کشت داده شد. پس از استخراج RNA از سلول‌ها، بیان miR-146a به صورت کمی با انجام RT-PCR اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها

برطبق یافته‌ها، بیان miR-146a در رده‌های میلومایی نسبت به لکوسیت‌های طبیعی به طور معناداری کاهش یافته است. آنالیز داده‌ها نشان داد که در مقایسه با لکوسیت‌های طبیعی، بیان miR-146a در رده سلولی L363 به طور میانگین $0/2 \pm 0/32$ برابر، در رده‌های LP1 به طور میانگین $0/07 \pm 0/03$ برابر و در رده‌های RPMI 8226 و KMM1 به ترتیب و به طور میانگین $0/02 \pm 0/0035$ و $0/001 \pm 0/0022$ برابر کاهش یافته است ($p < 0/01$).

نتیجه گیری

با توجه به یافته‌ها، به نظر می‌رسد که miR-146a می‌تواند به عنوان یک سرکوبگر تومور در لکوسیت‌ها عمل نموده و کاهش بیان این میکرو RNA در سلول‌های میلومایی به احتمال زیاد در پیدایش و یا پیشرفت مالتیپل میلوما مؤثر می‌باشد.

کلمات کلیدی: مالتیپل میلوما، میکرو RNA، miR-146a، انسانی

تاریخ دریافت: ۱۴/۱۰/۱۴
تاریخ پذیرش: ۹۵/۳/۱۲

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون - دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ایران
۲- PhD هماتولوژی و بانک خون - استادیار گروه هماتولوژی و علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان - کرمان - ایران
۳- مؤلف مسئول: PhD هماتولوژی و بانک خون - دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ایران - صندوق پستی: ۱۴۱۱۵-۳۳۱
۴- PhD هماتولوژی و بانک خون - استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرورد - شهرورد - ایران
۵- PhD هماتولوژی و بانک خون - دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ایران

مقدمه

بر نقش میکرو RNA ها در فرآیندهای مهم بیولوژیکی از جمله پاسخهای ایمنی ذاتی و اکتسابی، التهاب، رشد و مرگ سلولی تاکید دارند(۱۶، ۱۵، ۴). علاوه بر این، بسیاری از میکرو RNA ها به عنوان انکوژن، سرکوبگر تومور و حتی تعدیل کننده رشد سلول های بنیادی سرطانی و متاستاز عمل می نمایند(۱۷).

miR-146a از جمله میکرو RNA هایی است که نقش مهمی در بروز بیماری های التهابی و سرطان های گوناگون ایفا می کند. miR-146 نخستین بار به عنوان یک تنظیم گر سیستم ایمنی در پاسخ به عفونت های میکروبی شناسایی گردید. بررسی های بیشتر نشان داد که miR-146a/b در مسیر واپسی به NF-kB قرار داشته و توسط TLR القا می گردد. این میکرو RNA با هدف قرار دادن دو پروتئین ضروری در مسیر انتقال پیام پیش التهابی به نام های TRAF6 (TNF receptor-associated factor 6) و IRAK1 (IL-1 receptor-associated kinase 1) می نماید(۱۸، ۱۳). مطالعه های گسترده ای در زمینه نقش miR-146a در پاتوژن سرطان های گوناگون صورت گرفته که جمع بندی نتایج این بررسی ها نشان دهنده نقش دوگانه miR-146a در سرطان ها است. به عبارت دیگر، بسته به ماهیت سلول های بدخیم و مسیر های انتقال پیام فعال شده RNA miR-146a در آن ها دخیل است، میکرو RNA مذکور نقش انکوژنی و یا مهار کنندگی تومور را ایفا می نماید(۲۰، ۱۹).

با توجه به اهمیت میکرو RNA ها در بیولوژی سرطان، مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تغییرات بیان miR-146a به عنوان یکی از عوامل ژنتیکی کلیدی در شروع و پیشرفت بدخیمی، انجام گرفت. به همین منظور میزان بیان miR-146a در رده های سلولی مرتبط با مالتیپل میلوما (L363، L146a، KMM1 و RPMI 8226)، LP1 و LP2 کشته سلولی و با لوکوسیت های طبیعی خون مقایسه گردید.

مواد و روش ها

کشت سلول:

در مطالعه تجربی حاضر، چهار رده سلولی LP1، L363،

مالتیپل میلوما، نوعی بدخیمی است که با تکثیر کلونال پلاسماسل ها در مغز استخوان و افزایش تولید ایمنو گلوبولین های مونوکلونال مشخص می گردد(۱). ناهنجاری های سیتوژنتیکی و مولکولی مختلف سبب بروز مالتیپل میلوما می شوند(۲). پس از لنفوما، مالتیپل میلوما دومین بدخیمی خونی شایع در جهان است(۳). تلاش های بسیاری در جهت افزایش بقای بیماران مبتلا به مالتیپل میلوما صورت گرفته است. پیشرفت های اخیر در علم بیولوژی سلولی و مولکولی با توسعه روش های درمانی نوین در سرطان ها همراه بوده است. در این روش ها اختلالات ژنتیکی و اپی ژنتیکی در مسیر های پیامدهایی، به ویژه مسیر های مؤثر در پاتوژن بدخیمی، به عنوان هدف های درمانی مورد استفاده قرار می گیرند. شناسایی میکرو RNA ها و تعیین نقش آنها در تنظیم بیان ژن، زمینه ای مناسب در درک هر چه بیشتر بیولوژی سلول های سرطانی و تعیین درجه بدخیمی آنها فراهم آورده است(۴). الگوهای بیان میکرو RNA ها در چندین بدخیمی خونی هم چون لوسومی مزمون لنفوئیدی (CLL) و لوسومی حاد میلوئیدی (AML) تا حد زیادی مشخص شده است(۵-۸). به علاوه همبستگی چندین میکرو RNA با زیر گروه های ژنتیکی لوسومی های حاد و CLL تعیین گردیده است(۹-۱۱). این در حالی است که اطلاعات به دست آمده در این زمینه در مورد مالتیپل میلوما محدود می باشد (۱۲، ۱۳). مطالعه های اخیر مؤید نقش کلیدی میکرو RNA ها در مالتیپل میلوما است، به گونه ای که نه تنها در پیشرفت بدخیمی، بلکه در شروع آن، که به دنبال متیلاسیون میکرو RNA های مهار کننده تومور است، مؤثر می باشند(۱۴).

میکرو RNA ها گروهی از RNA های تک رشته ای کوتاه (۲۰-۲۳ نوکلئوتیدی) هستند که بیان ژن را کنترل می نمایند. این RNA های غیر کد کننده کوچک با شرکت در (RNA-induced silencing complex) RISC کمپلکس سبب اتصال کمپلکس مذکور به نواحی مکمل در ۳' mRNA های هدف شده و با تخریب و یا مهار هدف، بیان ژن را در سطح پس از رونویسی post-

RNAse و RNase (DNase) حل گردید. جهت ارزیابی کمی و تعیین غلظت RNA تخلیص شده، جذب نوری RNA در طول موج ۲۶۰ نانومتر و با استفاده از اسپکتروفتوometر (Thermo Scientific NanoDrop TM ND-2000c) خوانده شد. به منظور تعیین درجه خلوص RNA تخلیص شده، جذب نوری ۲۸۰/۲۳۰ و ۲۶۰/۲۸۰ نانومتر نیز سنجیده شد. در مرحله بعد، جهت ارزیابی کیفیت RNA تخلیص شده، مقدار ۱ میکرولیتر از RNA تخلیص شده بر روی ژل آگارز ٪۲ الکتروفورز شد.

cDNA ساخت:

ساخت cDNA با استفاده از کیت شرکت کیاژن (QuantiTect® Reverse Transcription kit, QIAGEN) و آغازگرهای Stem-loop اختصاصی برای miR-146a و SNORD-47 (به عنوان کنترل داخلی) و با انجام واکنش رونویسی معکوس (RT-PCR) انجام گرفت. توالی آغازگرهای loop اختصاصی برای miR-146a به صورت:

GTCGTATGCAGAGCAGGGTCCGAGGTATTCGC
ACTGCATACGACAACCCAT

و برای SNORD-47 به صورت:

GTCGTATGCAGAGCAGGGTCCGAGGTATTCGC
ACTGCATACGACAACCTC
کیت مربوطه، مخلوط واکنش تهیه گردید و سپس واکنش رونویسی معکوس با برنامه دمایی زیر انجام گرفت:
۱۵ دقیقه در ۲۵ درجه سانتی گراد، ۱۵ دقیقه در ۳۷ درجه سانتی گراد، ۶۰ دقیقه در ۴۲ درجه سانتی گراد و ۵ دقیقه در ۷۰ درجه سانتی گراد. آغازگرهای استفاده شده در Real Time PCR از مرکز تحقیقات و فناوری بنیانه تهیه شد.

Real Time PCR:

به منظور ارزیابی کمی بیان miR-146a در نمونه‌های آزمایش و کنترل، روش Real Time PCR با توجه به دستورالعمل کیت مربوطه انجام گرفت. بدین منظور، مخلوطی از SYBR® Green RT-PCR Master Mix (آمپلیکون، دانمارک)، آغازگرهای جلوبرنده اختصاصی

KMM1 و RPMI 8226 به عنوان گروه آزمایش و لکوسیت‌های جدا شده از خون فرد سالم به عنوان گروه شاهد مورد استفاده قرار گرفت. از آن جا که رده‌های سلولی میلومایی دارای ترانس لوکاسیون‌ها و موتاسیون‌های متعددی هستند، در این مطالعه، چهار رده سلولی میلومایی متفاوت (L363، LP1، L363) و (KMM1، RPMI 8226، CO₂) مورد بررسی قرار گرفت تا امکان تعمیم نتایج به دست آمده وجود داشته باشد. تمامی رده‌های سلولی فوق‌الذکر در محیط کشت ۱۶۴۰ RPMI (آمریکا، جیکو) حاوی ۱۰٪ FBS (آمریکا، جیکو) و ۱٪ آنتی‌بیوتیک پنی‌سیلین-استرپتومایسین (آمریکا، جیکو)، در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد با ۹۵٪ رطوبت و ۵٪ CO₂ کشت داده شدند. زمانی که سلول‌ها به پاساژ دوم رسیدند، جهت استخراج RNA مورد استفاده قرار گرفتند.

جاداسازی لکوسیت‌ها از خون محیطی فرد سالم: برای این منظور مقدار ۳ میلی‌لیتر خون حاوی ضد انعقاد EDTA با ۳ میلی‌لیتر PBS رقیق شد، سپس خون رقیق شده به آرامی بر روی ۳ میلی‌لیتر فایکول قرار گرفت و با سرعت ۴۰۰ g به مدت ۳۰ دقیقه سانتریفیوژ شد. سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی = PBMCs (Peripheral Blood Mononuclear Cells) که در حد فاصل فایکول و خون رقیق شده تجمع پیدا کرده بودند، به آرامی جمع آوری گردید. به منظور حذف فایکول، PBMC جدا شده سه مرتبه با PBS شسته شده و رسوب سلولی در ۱۰۰ میکرولیتر PBS به صورت سوسپانسیون در آمد. تعداد PBMC جadasازی شده با استفاده از لام نئوبار تعیین گردید.

استخراج Total RNA:

به منظور تخلیص RNA سلولی، از کیت - RNXTM PLUS (ایران، سیناژن) که بر پایه اختلاف فاز فنل-کلروفرم عمل می‌کند، استفاده شد. بر طبق دستورالعمل کیت مربوطه، RNA از چهار رده سلولی مورد آزمایش استخراج شده و رسوب RNA در ۳۰-۵۰ میکرولیتر آب (و یا آب مقطر فاقد آنزیم Diethylpyrrocarbonate) DEPC

PCR با برنامه دمایی رویرو انجام گرفت: ۱۵ دقیقه در ۹۵ درجه سانتی گراد و سپس ۴۰ سیکل شامل ۳۰ ثانیه در ۹۵ درجه سانتی گراد و ۶۰ ثانیه در ۶۰ درجه سانتی گراد(جدول ۱). به منظور آنالیز داده های به دست آمده از نرم افزار SPSS و آزمون Paired-Samples t test استفاده شد.

یافته ها

ارزیابی بیان miR-146a در رده های سلولی میلومایی و لکوسیت های طبیعی:


در مطالعه حاضر، تخلیص RNA از نمونه های میلومایی (سلول های چهار رده L363 ، LP1 ، KMM1 و RPMI) و cDNA نمونه کنترل (لکوسیت های طبیعی خون)، ساخت miR-146a از RNA های تخلیص شده و بررسی کمی بیان miR-146a با روش RT-PCR در شرایطی یکسان صورت گرفت.

جدول ۱: توالی آغازگرهای Real time PCR

دما اتصال (°C)	توالی آغازگر	
۶۰	F- 5'TCCGTGAGAACTGAATTCC-3'	miR-146a
۶۰	F-5'ATCACTGTAAAACCG TTCCA-3'	SNORD-47
۶۰	R-5'GAGCAGGGTCCGAGGT-3'	Common Reverse


برای miR-146a (و یا SNORD-47) و آغازگر معکوس مشترک، رنگ ROX ، cDNA و آب فاقد آنزیم RNase روی یخ تهیه شده و پس از اسپین کوتاه، به دستگاه StepOne™ Real-Time PCR منتقل یافتند. واکنش

نمودار تکثیر




چرخه

نمودار تکثیر




چرخه

نمودار ۱ : نمودار بالا مربوط به منحنی تکثیر miR-146a در لکوسیت های طبیعی خون است و نمودار پایین، منحنی تکثیر miR-146a در رده های سلولی میلومایی را نشان می دهد.



نمودار ۲: نمودار سمت راست منحنی ذوب miR-146a در رده‌های سلولی میلومای (Tm: 79.17) و نمودار سمت چپ منحنی ذوب miR-146a در لکوسیت‌های طبیعی خون (Tm: 78.54) را نشان می‌دهد.

با فرض برابری راندمان تکثیر (Efficiency) بین ژن مورد نظر و ژن مرجع، مقایسه انجام می‌شود. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بیان miR-146a در چهار رده سلولی میلومایی نسبت به لکوسیت‌های طبیعی خون به طور قابل توجهی کاهش یافته است (نمودار ۳). آنالیز داده‌های RT-PCR نشان دهنده کاهش بیان معنادار miR-146a در رده سلولی L363 نسبت به لکوسیت‌های طبیعی خون است ($p = 0.03$). در رده سلولی مذکور، کاهش بیان به طور میانگین 0.32 ± 0.02 برابر miR-146a گزارش شد. در رده سلولی LP1 نیز کاهش بیان miR-146a مشاهده شد. در رده سلولی LP1 نیز کاهش بیان معنادار miR-146a در رده سلولی RPMI مشاهده شد ($p = 0.002$). کاهش بیان معنادار miR-146a سلولی RPMI و KMM1 نسبت به لکوسیت‌های طبیعی خون به ترتیب و به طور میانگین 0.35 ± 0.0035 و 0.22 ± 0.0022 برابر مشاهده شد ($p = 0.001$).



نمودار ۳: ارزیابی کمی بیان miR-146a در رده‌های سلولی میلومایی Real Time PCR و لکوسیت‌های نرمال با

منحنی تکثیر miR-146a در لکوسیت‌های طبیعی خون و سلول‌های میلومایی و منحنی ذوب miR-146a در این سلول‌ها در نمودار نشان داده شده است (نمودارهای ۱ و ۲).

جهت آنالیز داده‌های به دست آمده و سنجش نسبی بیان miR-146a، از مدل $\Delta\Delta CT$ -2 استفاده شد. در این روش

بحث

یافته‌های مطالعه حاضر کاهش بیان معنادار miR-146a را در سلول‌های رده میلومایی نسبت به لکوسیت‌های

سرکوبگری تومور برای میکرو RNA های دیگری از جمله miR-145، miR-125b، miR-186، let-7b-5p، miR-221، 181a/b، miR-382، miR-15a، miR-16، miR-152، miR-29b، miR-137/197 و miR-10b-5p در مالتیپل میلوما گزارش شده است(۲۳). از طرفی، با نگاهی به مطالعه های انجام شده می توان به آسانی دریافت که میکرو RNA ها با شرکت در فرآیندهای مهم بیولوژیکی از جمله پاسخ های ایمنی ذاتی و اکتسابی، التهاب، سرنوشت سلولی، تکثیر، مرگ و مسیرهای انتقال پیام، نقشی کلیدی را در تکامل و عملکرد سلول های ایمنی ایفا می نمایند(۱۶، ۱۵، ۴). یکی از میکرو RNA های مهم در سلول های ایمنی، miR-146a است که تغییر در الگوی بیانی این میکرو RNA در بیماری های التهابی و سرطان های گوناگون به چشم می خورد. بر اساس مطالعه های بولدین و همکارانش در سال ۲۰۱۱، با تکامل و فعال شدن سلول های ایمنی، بیان miR-146a در این سلول ها به شدت افزایش می یابد، به همین دلیل حذف هدفمند miR-146a، نتایج ایمنی مختلفی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، miR-146a در کترول تکثیر و تمایز سلول های ایمنی دخیل می باشد، به گونه ای که موش های پیر فاقد miR-146a تولید مفرطی از سلول های میلتوئیدی را داشته و در ارگان های لفافی ثانویه این موش ها، تومور های متعددی قابل ردیابی است. نتایج فوق مؤید نقش کلیدی miR-146a به عنوان یک سرکوبگر تومور در سیستم ایمنی و هم چنین مهارکننده مولکولی (molecular brake) در التهابات، تکثیر سلول های میلومایی و ترانسفورماتیون انکوژنی است(۲۰). در کنار پتانسیل مهارکننده گی تومور، گروهی از مطالعه ها به نقش انکوژنی miR-146a در بدخیمی های خونی و تومور های توپر اشاره دارند. برای مثال، بررسی های استراسزینوسکی و همکاران در سال ۲۰۱۱ نشان داد که افزایش بیان miR-146a در ALL کودکان، AML، سرطان های سینه، پانکراس و پروستات دیده می شود(۲۴). به منظور روشن تر شدن نقش miR-146a در تقویت پتانسیل تومور زایی، گروهی از محققان به بررسی مسیرهای انتقال پیام پایین دست و بالا دست miR-146a پرداختند. بر طبق یافته های مطالعه های

طبیعی خون نشان می دهد. مطالعه ها حاکی از آن است که miR-146a نقشی مهم و کلیدی را در پاتوژن سرطان ها ایفا می کند و از یک سو با تقویت پتانسیل تومور زایی به عنوان یک آنکوژن عمل کرده و از سوی دیگر با اثر بر قدرت تکثیر، تمایز و تهاجم سلول ها، مانع از رشد تومور می گردد. نوع و ماهیت سلول های بدخیم و هم چنین مسیرهای انتقال پیام فعال شده که miR-146a در آن ها دخیل است، تعیین کننده تاثیر مثبت و یا منفی میکرو RNA مذکور بر رشد سلول های سرطانی است(۲۰). با تکیه بر نتایج مطالعه حاضر، به نظر می رسد که miR-146a به عنوان یک سرکوبگر تومور در لکوستی ها عمل می کند. به عبارت miR-146a، سلول های میلومایی از طریق کاهش بیان miR-146a بر فعالیت سرکوبگر توموری میکرو RNA مذکور غلبه کرده و موجب پیشرفت بدخیمی می گردد. مسأله مورد سؤال این است که کاهش بیان miR-146a در پلاسماسل ها یک رویداد اولیه بوده و سبب شروع میلوما می گردد و یا این که یک رویداد ثانویه است و در پیشرفت بدخیمی دخالت دارد. این موضوع لزوم بررسی های تکمیلی در زمینه نقش miR-146a در مالتیپل میلوما و مسیرهای انتقال پیام پایین دست آن را خاطر نشان می نماید.

شیوع بالای مالتیپل میلوما در جهان و درصد بالای مرگ و میر ناشی از آن که به دلیل غیر قابل درمان بودن بدخیمی رخ می دهد و هم چنین طولانی و پر هزینه بودن دوره درمان، لزوم تشخیص بیماری در مراحل اولیه و تعیین به موقع پیش آگهی بیماری را خاطر نشان می نماید(۲۱). از طرفی، پیشرفت های اخیر در علم بیولوژی سلولی و مولکولی سبب توسعه روش های درمانی نوین در سرطان ها گردیده است. در این روش ها، اختلالات ژنتیکی و اپی ژنتیکی در مسیرهای پیام دهنی، به ویژه مسیرهای مؤثر در پاتوژن بدخیمی، به عنوان هدف های درمانی مورد استفاده قرار می گیرند. درمان های بر پایه اپی ژنتیک به ویژه هدف قرار دادن میکرو RNA ها، یک رویکرد درمانی نوین در مالتیپل میلوما به شمار می آید(۴). از این رو مطالعه های گسترده ای در زمینه شناسایی و تعیین عملکرد میکرو RNA های مؤثر در مالتیپل میلوما صورت گرفته است(۲۲). همانند نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، نقش

های اثر گذار در شروع و پیشرفت بسیاری از بدخیمی‌ها شناخته می‌شود، در مطالعه حاضر میزان بیان این میکرو RNA در رده‌های سلولی مرتبط با مالتیپل میلوما اندازه‌گیری و با لکوستیت‌های طبیعی خون مقایسه گردید. آنالیز یافته‌های مطالعه حاضر حاکی از آن است که miR-146a می‌تواند به عنوان یک سرکوبگر تومور در لکوستیت‌ها عمل نموده و کاهش بیان این میکرو RNA در سلول‌های میلومایی، به احتمال زیاد در آغاز و یا پیشرفت مالتیپل میلوما مؤثر می‌باشد. هر چند به نظر می‌رسد عوامل متعددی از جمله ماهیت سلول‌های بدخیم، مسیرهای انتقال پیام فعال شده و دیگر عوامل مؤثر بر تغییرات بیان ژن هم چون تغییرات اپی‌ژنتیکی، بر تعیین نوع اثر گذاری این میکرو RNA در روند بدخیمی و هم چنین نقش آن در سرطان‌ها مؤثر باشد. این امر لزوم انجام بررسی‌های تکمیلی در این زمینه را خاطر نشان می‌نماید.

تشکر و قدردانی

این پژوهش در قالب بخشی از پایان‌نامه دانشجویی و با مساعدت‌های مالی دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس انجام گرفت است. از آقایان دکتر مسعود سلیمانی، امیر آتشی، نادر وظیفه شیران و فخرالدین صبا جهت مساعدت در تامین مواد و رده‌های سلولی نهایت تشکر به عمل آورده می‌شود.

انجام شده، القای بیان miR-146a در سلول با مهار رونویسی از دو مولکول عملگر مهم در مسیر NF-κB به نامهای IRAK1 و TRAF6، سبب کترول منفی مسیر NF-κB می‌گردد. غیر فعال شدن مسیر انتقال پیام مذکور با مهار تکثیر سلولی و القای آپوپتوز در سلول‌ها همراه است. به عبارت دیگر، miR-146a قادر است تا با مهار کردن مسیر NF-κB در سلول‌های سرطانی، به عنوان یک مهارکننده رشد تومور عمل نماید(۲۵، ۲۶). از سویی، جمع‌بندی یافته‌های مطالعه‌های انجام شده به نقش مسیر TGFβ/SMAD4 به عنوان سرکوبگر رشد تومور در بسیاری از سرطان‌ها اشاره دارد. به طوری که مشاهده شده که با غیر فعال شدن SMAD4، به واسطه تاثیر میکرو RNA های مشخص بر آن و یا در اثر موتاسیون‌های صورت گرفته در ژن SMAD4، مسیر TGFβ مهار می‌گردد که این امر، پیشرفت بدخیمی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به نقش تنظیمی miR-146a بر بیان ژن SMAD4، احتمال می‌رود که miR-146a با کاهش سطح پروتئینی SMAD4 و مهار مسیر TGFβ به عنوان یک محرك رشد تومور در سرطان‌ها عمل نماید(۲۷، ۲۸). در مجموع، روشن شدن این موضوع که miR-146a با تاثیر بر کدام مسیرهای انتقال پیام، از رشد و تکثیر سلول‌های میلومایی ممانعت نموده و سبب افزایش آپوپتوز در این سلول‌ها می‌گردد، مستلزم بررسی‌های بیشتر در این زمینه می‌باشد.

نتیجه‌گیری

از آن جا که miR-146a به عنوان یکی از میکرو

References:

- de Mel S, Lim SH, Tung ML, Chng WJ. Implications of heterogeneity in multiple myeloma. *Biomed Res Int* 2014; 2014: 232546.
- Gutiérrez NC, Sarasquete ME, Misiewicz-Krzeminska I, Delgado M, De Las Rivas J, Ticona F, et al. Deregulation of microRNA expression in the different genetic subtypes of multiple myeloma and correlation with gene expression profiling. *Leukemia* 2010; 24(3): 629-37.
- Ocio E, Richardson P, Rajkumar S, Palumbo A, Mateos M, Orłowski R, et al. New drugs and novel mechanisms of action in multiple myeloma in 2013: a report from the International Myeloma Working Group (IMWG). *Leukemia* 2014; 28(3): 525-42.
- Calin GA, Croce CM. MicroRNA signatures in human cancers. *Nat Rev Cancer* 2006; 6(11): 857-66.
- Calin GA, Liu CG, Sevignani C, Ferracin M, Felli N, Dumitru CD, et al. MicroRNA profiling reveals distinct signatures in B cell chronic lymphocytic leukemias. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2004; 101(32): 11755-60.
- Cimmino A, Calin GA, Fabbri M, Iorio MV, Ferracin M, Shimizu M, et al. miR-15 and miR-16 induce apoptosis by targeting BCL2. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2005; 102(39): 13944-9.
- Jongen-Lavrencic M, Sun SM, Dijkstra MK, Valk PJ, Löwenberg B. MicroRNA expression profiling in relation to the genetic heterogeneity of acute myeloid leukemia. *Blood* 2008; 111(10): 5078-85.
- Li Z, Lu J, Sun M, Mi S, Zhang H, Luo RT, et al. Distinct microRNA expression profiles in acute myeloid leukemia with common translocations. *Proc*

- Natl Acad Sci U S A 2008; 105(40): 15535-40.
- 9- Garzon R, Garofalo M, Martelli MP, Briesewitz R, Wang L, Fernandez-Cymering C, *et al.* Distinctive microRNA signature of acute myeloid leukemia bearing cytoplasmic mutated nucleophosmin. Proc Natl Acad Sci U S A 2008; 105(10): 3945-50.
 - 10- Visone R, Rassenti LZ, Veronese A, Taccioli C, Costinean S, Aguda BD, *et al.* Karyotype-specific microRNA signature in chronic lymphocytic leukemia. Blood 2009; 114(18): 3872-9.
 - 11- Marcucci G, Radmacher MD, Maharry K, Mrózek K, Ruppert AS, Paschka P, *et al.* MicroRNA expression in cytogenetically normal acute myeloid leukemia. N Engl J Med 2008; 358(18): 1919-28.
 - 12- Roccaro AM, Sacco A, Thompson B, Leleu X, Azab AK, Azab F, *et al.* MicroRNAs 15a and 16 regulate tumor proliferation in multiple myeloma. Blood 2009; 113(26): 6669-80.
 - 13- Suzuki Y, Kim HW, Ashraf M, Haider HK. Diazoxide potentiates mesenchymal stem cell survival via NF-κB-dependent miR-146a expression by targeting Fas. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2010; 299(4): H1077-82.
 - 14- Yuan Y, Kasar S, Underbayev C, Prakash S, Raveche E. MicroRNAs in Acute Myeloid Leukemia and Other Blood Disorders. Leuk Res Treatment 2012; 2012: 603830.
 - 15- Esquela-Kerscher A, Slack FJ. Oncomirs-microRNAs with a role in cancer. Nat Rev Cancer 2006; 6(4): 259-69.
 - 16- Ebert MS, Sharp PA. Roles for microRNAs in conferring robustness to biological processes. Cell 2012; 149(3): 515-24.
 - 17- Cho WC. MicroRNAs: potential biomarkers for cancer diagnosis, prognosis and targets for therapy. Int J Biochem Cell Biol 2010; 42(8): 1273-81.
 - 18- Omrane I, Kourda N, Stambouli N, Privat M, Medimegh I, Arfaoui A, *et al.* MicroRNAs 146a and 147b biomarkers for colorectal tumor's localization. Biomed Res Int 2014; 2014: 584852.
 - 19- Hasani SS, Hashemi M, Eskandari-Nasab E, Naderi M, Omrani M, Sheybani-Nasab M. A functional polymorphism in the miR-146a gene is associated with the risk of childhood acute lymphoblastic leukemia: a preliminary report. Tumour Biol 2014; 35(1): 219-25.
 - 20- Boldin MP, Taganov KD, Rao DS, Yang L, Zhao JL, Kalwani M, *et al.* miR-146a is a significant brake on autoimmunity, myeloproliferation, and cancer in mice. J Exp Med 2011; 208(6): 1189-201.
 - 21- Kumar SK, Rajkumar SV, Dispenzieri A, Lacy MQ, Hayman SR, Buadi FK, *et al.* Improved survival in multiple myeloma and the impact of novel therapies. Blood 2008; 111(5): 2516-20.
 - 22- Huang Y, Shen XJ, Zou Q, Wang SP, Tang SM, Zhang GZ. Biological functions of microRNAs: a review. J Physiol Biochem 2011; 67(1): 129-39.
 - 23- Sun CY, She XM, Qin Y, Chu ZB, Chen L, Ai LS, *et al.* miR-15a and miR-16 affect the angiogenesis of multiple myeloma by targeting VEGF. Carcinogenesis 2013; 34(2): 426-35.
 - 24- Starczynowski DT, Morin R, McPherson A, Lam J, Chari R, Wegrzyn J, *et al.* Genome-wide identification of human microRNAs located in leukemia-associated genomic alterations. Blood 2011; 117(2): 595-607.
 - 25- Liu R, Liu C, Chen D, Yang WH, Liu X, Liu CG, *et al.* Foxp3 controls an miR-146/NF-κB negative feedback loop that inhibits apoptosis in breast cancer cells. Cancer Res 2015; 75(8): 1703-13.
 - 26- Hurst DR, Edmonds MD, Scott GK, Benz CC, Vaidya KS, Welch DR. Breast cancer metastasis suppressor 1 up-regulates miR-146, which suppresses breast cancer metastasis. Cancer Res 2009; 69(4): 1279-83.
 - 27- Xiao B, Zhu ED, Li N, Lu DS, Li W, Li BS, *et al.* Increased miR-146a in gastric cancer directly targets SMAD4 and is involved in modulating cell proliferation and apoptosis. Oncol Rep 2012; 27(2): 559-66.
 - 28- Zhong H, Wang HR, Yang S, Zhong JH, Wang T, Wang C, *et al.* Targeting Smad4 links microRNA-146a to the TGF-β pathway during retinoid acid induction in acute promyelocytic leukemia cell line. Int J Hematol 2010; 92(1): 129-35.

Original Article

miR-146a: A possible tumor suppressor in multiple myeloma

Kazemzadeh S.¹, Farsinejad A.², Sabour Takanlu J.¹, Kaviani S.¹, Atashi A.³, Soleimani M.¹, Abroun S.¹

¹Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

²Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

³School of Medicine, Shahrood University of Medical Sciences, Shahrood, Iran

Abstract

Background and Objectives

MicroRNAs play a crucial role in controlling the innate and adaptive immune responses, inflammation, cell growth, and apoptosis by regulating gene expression at post-transcriptional level. In addition, many microRNAs act as oncogenes, tumor suppressors, and the mediators of cancer stem cells. MiR-146a is one of the important microRNAs in inflammatory diseases and tumors which has a dual effect on cancers and acts as a tumor promoter or a tumor suppressor. The present study aimed to evaluate the expression of miR-146a in multiple myeloma cell lines (L363, LP1, RPMI 8226 and KMM1) in comparison with normal leukocytes.

Materials and Methods

In this experimental study, four myeloma cell lines and peripheral blood leukocytes isolated from healthy individuals were cultured under specific conditions. After RNA extraction, miR-146a expression was measured by quantitative Real Time PCR.

Results

The research results showed that the expression of miR-146a in multiple myeloma cell lines was significantly decreased compared with normal leukocytes. Data analysis also revealed that the expression of miR-146a was decreased in average of 0.32 ± 0.2 folds in L363 cell line and for LP1, RPMI 8226, and KMM1 cell lines in average of 0.03 ± 0.07 , 0.0035 ± 0.02 , 0.0022 ± 0.001 folds, respectively ($p < 0.01$).

Conclusions

The researchers' results suggest that miR-146a can act as a tumor suppressor in leukocytes, and the decreased expression of this microRNA in myeloma cells is likely to be effective at the onset and progression of multiple myeloma.

Key words: Multiple Myeloma, MicroRNAs, miR-146a, human

Received: 4 Jan 2016

Accepted: 1 Jun 2016

Correspondence: Kaviani S., PhD of Hematology. Associate Professor of Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University.

P.O.Box: 14115-331, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 82883832; Fax: (+9821) 82884507.

E-mail: kavianis@modares.ac.ir