



ارزیابی اثر پرایمینگ و اندازه بذر بر عملکرد زیست‌توده، شاخص کارایی مصرف آب و برخی ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های پیاز خوراکی (*Allium cepa* L.)

موسی ایزدخواه شیشوان^{۱*}، مهدی تاج بخش شیشوان^۲

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

چکیده

به‌منظور بررسی اثر پرایمینگ و اندازه بذر بر عملکرد زیست‌توده، کارایی مصرف آب و برخی ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های پیاز خوراکی، این پژوهش در دو سال زراعی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل پرایمینگ در چهار سطح (هیدروپرایمینگ با آب مقطر، اسموپرایمینگ با نترات پتاسیم، پرایمینگ با استفاده از محلول فولامین ۲ درصد و شاهد (پرایمینگ نشده)، اندازه بذر در سه سطح (ریز، متوسط و درشت) و اکوتیپ در دو سطح قرمز آذرشهر و زرقان بود. ویژگی‌های عملکرد زیست‌توده، کارایی مصرف آب سوخ و زیست‌توده، محتوای نسبی آب برگ، میزان آب مصرفی، شاخص برداشت، هدایت روزنه‌ای در مرحله سوخ‌دهی و پر شدن سوخ، میزان رشد، درجه باردهی، انرژی دریافتی و مقدار انرژی تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. اثر پرایمینگ و اندازه بذر از نظر تمام ویژگی مورد بررسی از لحاظ آماری تفاوت معنی‌دار نشان داد. نتایج نشان داد که پرایمینگ بذر موجب بهبود عملکرد زیست‌توده و ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک گیاه گردید، به‌طوری‌که بیشترین میزان عملکرد زیست‌توده (۱۰۵/۹۸ تن در هکتار)، کارایی مصرف آب سوخ (۴/۹۸ کیلوگرم در متر مکعب)، کارایی مصرف آب زیست‌توده (۱۳/۳۰ کیلوگرم در متر مکعب)، شاخص برداشت (۸۲ درصد) و محتوای نسبی آب برگ (۸۶ درصد) به پرایمینگ با ماده فولامین تعلق داشت و کمترین آن‌ها از تیمار شاهد به‌دست آمد. بیشترین عملکرد زیست‌توده (۱۰۰/۳۳ تن در هکتار)، کارایی مصرف آب سوخ (۴/۸۸ کیلوگرم در متر مکعب)، کارایی مصرف آب زیست‌توده (۱۳/۳۰ کیلوگرم در متر مکعب)، شاخص برداشت (۸۰ درصد) و محتوای نسبی آب برگ (۸۵ درصد) از بذور درشت و کمترین آن‌ها از بذر ریز به‌دست آمد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد پیش‌تیمار بذر با استفاده از ماده فولامین و بذور درشت در مقایسه با سایر روش‌های پیش‌تیمار و اندازه بذر، باعث بهبود ویژگی‌های پیاز خوراکی گردید، لذا استفاده از پیش‌تیمار با ماده فولامین و اندازه درشت بذر جهت کاشت پیاز در شرایط مشابه این آزمایش قابل توصیه است.

واژه‌های کلیدی: اسموپرایمینگ، درجه باردهی، فولامین، میزان رشد

مقدمه

به‌دلیل ریز بودن بذر پیاز، مشکلاتی در جوانه‌زنی و استقرار مناسب گیاهچه در مزرعه به‌دلیل ریز بودن بذر پیاز به‌وجود می‌آید. از طرفی با توجه به این‌که جوانه‌زنی اولین مرحله نمو در گیاه می‌باشد و یکی از مراحل مهم و حساس در چرخه زندگی گیاهان و یک فرآیند کلیدی در سبز شدن گیاهچه می‌باشد (De Villiers et al., 1994). بنابراین استقرار زودتر گیاهچه‌ها به‌دنبال سبز شدن سریع بذور از عوامل موثر برای عملکرد موفق می‌باشد (Peltonen-Sainio et al., 2006). در بوم‌نظام‌های طبیعی جوانه‌زنی نامتقارن یک توده بذری که غالباً در بانک بذری خاک قرار دارد یک مزیت اکولوژیک در راستای حفظ بقاء گیاه تولیدکننده بذر تلقی می‌شود. اما در بوم‌نظام‌های زراعی بر خلاف بوم‌نظام‌های طبیعی جوانه‌زنی یکنواخت، سریع هدف اصلی کشاورز محسوب می‌شود. بنابراین ایجاد سبز یکنواخت و تراکم مورد نظر که در پی جوانه‌زنی مطلوب به‌دست می‌آیند از پیش‌شرط‌های اصلی حصول عملکرد کمی و کیفی بهینه می‌باشند (Tajbakhsh and Ghiyas, 2008).

پیاز خوراکی (*Allium cepa* L.)، به‌دلیل دارا بودن کربوهیدرات، پروتئین، کلسیم، فسفر، آهن، روی و ویتامین‌های گوناگون اهمیت به‌سزایی در تغذیه انسان دارد، علاوه بر ارزش غذایی، مطالعات علمی فراوان اثر دارویی قابل ملاحظه این گیاه را اثبات نموده‌اند. در درمان بیماری‌های عروق کرونری قلب نیز مؤثر می‌باشد (Martinz et al., 2007). پیاز در دنیا به سه روش: کشت نشاء، کشت پیازچه‌های کوچک و کشت مستقیم بذر در مزرعه، کاشته می‌شود (Izadkhan et al., 2010a). ارزان‌ترین روش استفاده از کشت مستقیم بذر می‌باشد که در بیشتر مناطق دنیا و در مناطقی که طول فصل رشد به اندازه کافی طولانی است و یا محصول زود رس مورد نیاز نمی‌باشد از آن استفاده می‌شود (Izadkhan et al., 2010b). در کشت مستقیم بذر

۱- دانش‌آموخته دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

۲- استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

(Email: ms.izadkhan@gmail.com)

*- نویسنده مسئول:

DOI: 10.22067/gsc.v18i1.63311

Kaydan and (2010). نتایج تحقیقات کایدان و یانگمور (Yagmur, 2008) نشان داد بذره‌های درشت‌تر از نظر درصد جوانه‌زنی، رشد گیاهچه، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، نسبت ریشه‌چه به ساقه‌چه و وزن خشک ریشه‌چه نسبت به بذور متوسط و ریز برتری داشت. اگر چه افزایش اندازه بذر باعث به‌وجود آمدن برخی اثرات منفی (مانند کاهش فاصله پراکنش طبیعی و افزایش رجحان غذایی بذر خواران بزرگ) می‌شود، اما اثرات مثبت آن در بحرانی‌ترین مرحله حیات گیاه بسیار قابل توجه است و می‌تواند موفقیت نسبی گیاه در مراحل بعدی چرخه حیات تاثیر به‌سزایی داشته باشد (Arunachalam et al., 2003). نتایج مطالعات مازور و فرانس (Mazur and Ferance, 1994) نشان داد گیاهی که از بذر بزرگ‌تر به‌وجود می‌آید سریع‌تر رشد کرده، تجمع ماده خشک قسمت‌های هوایی بیشتر بوده و عملکرد بیشتری در مقایسه با بذره‌های کوچک تولید می‌کنند. در پیاز خوراکی بین اندازه بذر، درصد جوانه‌زنی، شاخص ظهور گیاهچه در مزرعه، استقرار اولیه گیاهچه و همچنین عملکردهای کل و اقتصادی همبستگی مثبت وجود دارد (Gamiel et al., 1990). هدف از این تحقیق، ارزیابی اثر پرایمینگ بذر پیاز با آب، محلول اسمزی، فولامین و اندازه بذر بر روند رشد و عملکرد تر و خشک سوخ، ژنوتیپ پیاز در شرایط مزرعه و انتخاب پیش‌تیمار و اندازه بذر مناسب بذر بود.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه سه روش پرایمینگ (هیدروپرایمینگ با آب مقطر، پرایمینگ با نیتراپتاسیم ۲ درصد، پرایمینگ با اسید آمینه فولامین ۲ درصد و شاهد) و سه اندازه بذر (ریز با قطر ۲/۶، متوسط با قطر ۲/۸ و درشت با قطر ۳ میلی‌متر) و پیاز رقم قرمزآذرشهر و اکوتیپ زرقان در یک آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی (۱۳۹۱-۱۳۹۲) در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با طول جغرافیایی ۴۶ درجه و ۴۵ دقیقه شرقی، عرض جغرافیایی ۳۸ درجه و ۴۵ دقیقه شمالی مورد بررسی قرار گرفتند. محل آزمایش دارای اقلیم نیمه‌خشک (براساس روش آمبرژه)، ارتفاع از سطح دریا ۱۳۴۹/۳ متر، حداکثر دما ۳۹ درجه سانتی‌گراد، حداقل دما ۲۲/۵- درجه سانتی‌گراد و دارای اقلیم با متوسط حدود ۳۲۱/۵ میلی‌متر نزولات آسمانی بود. طبق آزمایش‌های انجام شده توسط بخش تحقیقات خاک و آب مرکز، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای طرح در عمق صفر الی ۳۰ سانتی‌متر، به شرح جدول ۱ گزارش شده است.

بذره‌های مورد نیاز از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج تهیه گردید. بذره‌های مورد بررسی از طبقه گواهی شده و تولید سال ۱۳۹۰ بودند. برای جداسازی بذرها از الک‌های استاندارد آزمایشگاهی مستطیلی شکل، سوراخ بیضی با نمره ۲/۲ میلی‌متر برای

طی دو دهه گذشته مطالعات قابل توجهی بر روی تاثیر تیمارهای پیش از کاشت مختلف بر روی بذره‌های مختلف محصولات زراعی، سبزی‌ها و گیاهان دارویی صورت گرفته است و نتایج حاصل از این تحقیقات ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود و ارتقای جوانه‌زنی و بنیه بذر و استقرار اولیه گیاهچه در مزرعه در اکثر گیاهان مورد مطالعه بوده است. از جمله این فن‌ها، استفاده از پیش‌تیمار بذر می‌باشد که پیش‌تیمار بذور سبب تسریع فرآیندهای جوانه‌زنی می‌شود. در پرایمینگ بذر مراحل اولیه جوانه‌زنی که سبب تحریک فعالیت جنینی می‌شود را طی می‌کند (Corbineau and Come, 2006)، ولی به دلیل پایین بودن میزان آب جذب شده خروج ریشه‌چه صورت نمی‌گیرد (Kaydan and Yagmur, 2008). در نهایت قبل از ظهور ریشه‌چه بذرها دوباره خشک شده و به رطوبت اولیه برگردانده می‌شوند (Corbineau and Come, 2006).

گیاهان حاصل از پیش‌تیمار در مقایسه با گیاهان شاهد در طی زمان کوتاه‌تری سیستم ریشه‌ای خود را گسترش می‌دهند و با جذب مطلوب‌تر آب و مواد غذایی و تولید بخش‌های سبز فتوسنتزکننده به مرحله اتوتروفی می‌رسند. تحقق چنین شرایطی به لحاظ زیستی و اکولوژیکی موقعیت ویژه‌ای به گیاهان حاصل از بذره‌های پیش‌تیمار شده می‌دهد (Wang et al., 2003). به طوری که این وضعیت امکان بهره‌برداری مناسب‌تر از نهاده‌های محیطی مثل آب، نور و غیره را به گیاه می‌دهد. همین‌طور در اثر این شرایط ممکن است توانایی ذاتی گیاه جهت برتری در رقابت با سایر گیاهان به لحاظ ویژگی‌های اکولوژیکی حاکم بر این روابط ارتقا یابد (Weaich et al., 1992). بگو میلا و همکاران (Boqumila et al., 2005) نشان دادند که پیش‌تیمار بذر با استفاده از آب اثر معنی‌داری بر جوانه‌زنی بذر گوجه‌فرنگی (*Solanum lycopersicum*) داشت. نتایج تحقیقات سیلوارانی و یومارانی (Selvarani and Umarani, 2011) نیز نشان داد، پرایمینگ بذر پیاز با استفاده از مواد اسموتیک باعث بهبود ویژگی‌های جوانه‌زنی، افزایش درصد گیاهچه‌های طبیعی، کاهش درصد گیاهچه‌های غیرطبیعی، کاهش متوسط زمان جوانه‌زنی، بهبود سرعت جوانه‌زنی و افزایش ظرفیت جوانه‌زنی در مقایسه با شاهد (بذور پرایم نشده) گردید.

یکی دیگر از فاکتورهای موثر بر جوانه‌زنی، اندازه بذر می‌باشد. اندازه بذر از خصوصیات کیفی بذر است که تحت تاثیر عوامل ژنتیکی، محیطی، موقعیت گیاهان مادر در مزرعه، موقعیت بذرها روی گیاه مادر یا روی محور گل آذین و تغذیه گیاه مادر قرار می‌گیرد (Tajbakhsh and Ghiyas, 2008). تاثیر اندازه بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه نتایج متفاوتی را نشان داده است. بین اندازه بذر و رشد اولیه گیاهچه‌ها ارتباط مثبتی وجود دارد (Haromoto and Gallandt, 2005). بذور کوچک‌تر نسبت به بذور بزرگ‌تر نه تنها سریع‌تر جوانه می‌زنند بلکه گیاهچه‌های آن‌ها نیز سریع‌تر سبز می‌شوند (Mut

نگهداری شدند، سپس بذرها بعد از طی این مدت‌ها، ۲۴ ساعت در جریان هوای آزاد قرار داده شدند تا رطوبت سطحی آن‌ها خشک گردد (Izadkhah Shishvan *et al.*, 2017). در ادامه بذرها پرایم شده به همراه تیمار بدون پرایمینگ (شاهد) در تاریخ ۵ فروردین سال‌های ۹۱ و ۹۲ در کرت‌های آزمایش کشت شدند. هر کرت آزمایشی ۶ متر مربع (۲×۳ متر) و دارای ۱۰ ردیف کشت بود، در هر کرت تراکم کشت پیازها ۵۰ بوته در مترمربع، فاصله پیازها بر روی ردیف ۱۰ سانتی‌متر و فاصله بین ردیف‌های کشت ۲۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شد و عمق کاشت بذرها حدود ۱/۵ سانتی‌متر بود.

بذرها ریز، با نمره ۲/۶ میلی‌متر برای بذور متوسط و با نمره سه میلی‌متر برای بذرها درشت استفاده شد و بذرها به سه سطح ریز، متوسط و درشت تفکیک شدند و دامنه تغییرات اندازه بذر تعیین گردید. در مرحله اول، بذرها هر یک از اکوتیپ‌ها به مدت هشت ساعت در دمای اتاق تحت تیمارهای پرایمینگ با محلول‌های نیترات پتاسیم (۲ درصد)، اسید آمینه فولامین (۲ درصد) قرار گرفتند (Izadkhah Shishvan, *et al.* 2017) و برای انجام پیش تیمار هیدروپرایمینگ بذور به مدت ۴ ساعت در آب مقطر خیسانده و بعد ۳ روز در دسیکاتور با رطوبت نسبی ۱۰۰ درصد (رطوبت نسبی آن توسط اسید سولفوریک تنظیم می‌شد)، در دمای اتاق 20 ± 2 درجه سانتی‌گراد

جدول ۱- برخی از ویژگی‌های خاک محل آزمایش
Table 1- Some characteristics of soil site experiment

pH	EC (dS.m ⁻¹)	پتاس قابل جذب K (ava.) p.p.m	فسفر قابل جذب P (ava.) p.p.m	نیترژن کل Total N %	کربن آلی O.C %	شن Sand %	سیلت Silt %	رسی Clay %	بافت Texture
7.9	1.54	240	10.2	0.5	0.42	21	37	42	Sandy loam

اندازه‌گیری شد و سپس به منظور تعیین وزن در حالت اشباع، به مدت ۲۴ ساعت در شدت نور کم و در دمای اتاق در داخل آب مقطر قرار داده شدند. در پایان به منظور تعیین وزن خشک، برگ‌ها به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۷۵ درجه سانتی‌گراد قرار داده شدند. محتوای آب برگ‌ها با استفاده از معادله (۱) محاسبه شد (Izadkhah *et al.*, 2010_a).

$$RWC = \frac{fW - dW}{tW - dW} \times 100 \quad (2)$$

fW: وزن تر گیاه، dW: وزن خشک گیاه و tW: وزن گیاه در حالت اشباع (آماس)

کارایی مصرف آب سوخ، از طریق نسبت عملکرد کل (کیلوگرم) بر مقدار آب مصرفی (متر مکعب) و مقدار کارایی مصرف آب برای زیست توده کل، از نسبت زیست توده کل تولید شده (کیلوگرم) بر مقدار آب مصرفی (متر مکعب) تعیین شد (Abdzad Gohari *et al.* 2011). هدایت روزنه‌ای با استفاده از دستگاه پرومتر^۱ (DELTA-T DEVICES LTD, ENGLAND) در مرحله سوخ‌دهی و همچنین در مرحله بزرگ شدن سوخ در حالت اتصال به گیاه (برگ گیاه بین گیره دستگاه قرار گرفته بود) در یک روز صاف، ساعت ۱۱ اندازه‌گیری شد و پس از ۳۰ ثانیه میزان هدایت روزنه‌ای قرائت شد (Bastam *et al.* 2013). برای اندازه‌گیری میزان انرژی دریافتی توسط گیاه از طول ساعات آفتابی استفاده گردید به این منظور مجموع ساعات آفتابی روز از زمان شروع تشکیل سوخ تا زمان رسیدگی فیزیولوژیکی یادداشت و به عنوان میزان انرژی دریافتی توسط گیاه در نظر گرفته

برای اندازه‌گیری حجم آب ورودی به کرت‌ها در هر مرحله آبیاری از کنتور آب استفاده گردید. بدین صورت که کنتور آب به لوله‌های پلاستیکی متصل و در داخل کرت مورد نظر قرار گرفت و آب ورودی به داخل هر کرت کنترل شد. مقدار آب لازم برای هر کرت در هر بار آبیاری بر حسب حجمی از معادله (۱) محاسبه شد (Khjwinagad, 2004):

$$Vw = [(Fc - Sm)(Bd \times D \times A)] \quad (1)$$

که در این رابطه، Fc: درصد رطوبت وزنی خاک در ظرفیت زراعی، Sm: درصد وزنی رطوبت خاک هنگام نمونه برداری، Bd: جرم مخصوص ظاهری خاک (گرم بر سانتی‌متر مکعب)، D: عمق توسعه ریشه (سانتی‌متر)، A: مساحت هر کرت. برداشت سوخ در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی، که در حدود ۷۰-۸۰ درصد بوته‌ها از ناحیه گردن (ساقه دروغی) نرم و پلاسیده شده و در نتیجه پهنک‌ها افتاده و ریزش و مرگ آن‌ها آغاز شد، انجام گرفت. حدود ۲۰ روز قبل از برداشت جهت متوقف شدن رشد، کاهش رطوبت پیازها و سهولت در امر برداشت، آبیاری قطع شد. پیازها به مدت ۷ الی ۱۰ روز در مقابل آفتاب نگهداری شد تا خشک شوند.

در طی دوره رشد کارایی مصرف آب سوخ، کارایی مصرف آب زیست توده، مقدار آب مصرفی، هدایت روزنه‌ای، میزان انرژی دریافتی، میزان انرژی تولیدی، میزان رشد و محتوای رطوبت نسبی برگ پیاز اندازه‌گیری شدند. جهت اندازه‌گیری محتوای آب نسبی برگ، در اوایل صبح و اواسط دوره پر شدن سوخ، تعداد ۵ برگ به صورت تصادفی انتخاب و قطع شد و بلافاصله در درون کیسه‌های نایلونی قرار داده شد و به سرعت به آزمایشگاه منتقل گردید. ابتدا وزن تر آن‌ها

1- Prometer-AP4

(۴) تعداد روز از کاست تا برداشت/۱۰۰ = میزان رشد به‌منظور تجزیه مرکب داده‌ها ابتدا آزمون بارتلت جهت اطمینان از متجانس بودن خطای آزمایشات انجام شد. محاسبات F و مقایسات میانگین با فرض تصادفی بودن سال و ثابت بودن تیمارها انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SAS، رسم نمودارها از نرم‌افزار Excel و مقایسه میانگین‌ها از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد.

نتایج و بحث

بر اساس آزمون بارتلت، چون مقدار آماره χ^2 محاسبه شده از جدول کمتر بود در نتیجه فرض صفر رد نشد و نشان داد که اختلاف بین واریانس‌ها معنی‌دار نیست و واریانس‌ها یکنواخت هستند. با توجه به این که دمای هوا در سال زراعی ۱۳۹۱ در ماه‌های فروردین و اردیبهشت که زمان استقرار گیاهچه‌های پیاز در زمین اصلی بود بسیار نامناسب‌تر از سال زراعی ۱۳۹۲ بود (جدول ۱). مجموع شرایط محیطی (دما، بارندگی و مجموع ساعات آفتابی) در سال دوم آزمایش (۱۳۹۲) نسبت به سال اول (۱۳۹۱) که برای رشد گیاه پیاز در شرایط این آزمایش، مناسب‌تر بود و گیاهچه‌های پیاز رویش مناسبی قبل از سوختگی داشتند در نتیجه اثر سال در همه صفات مورد بررسی در این آزمایش در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود (جدول ۲). برای جلوگیری از تکرار، این موضوع در ارائه نتایج مربوط به صفات مورد بررسی قید نخواهد شد.

شد (Maskooki *et al.*, 1995). برای اندازه‌گیری میزان انرژی تولیدی سوخ از معادله (۳) استفاده شد (Bhattacharjee *et al.*, 2013):

(۳) $(\text{چربی} \times 9) + (\text{کربوهیدرات کل} \times 4) + (\text{پروتئین خام}) = \text{اندازه‌گیری میزان انرژی تولیدی سوخ}$
برای تعیین پروتئین خام از روش کج‌لدال، چربی سوخ با روش سوکسله استفاده شد (Kebede and Muniye, 2017) و میزان هیدرات کربن از اختلاف بین ماده خشک، میزان خاکستر، پروتئین و چربی سوخ بر حسب درصد محاسبه شد (Asaduzzaman, *et al.*, 2012).

جهت تعیین عملکرد زیست‌توده در هر کرت پس از حذف دو ردیف کشت از طرفین، پنج گیاه به‌طور تصادفی انتخاب گردید. سپس غلاف، برگ‌ها و سوخ‌ها در داخل آون و در دمای ۷۵ درجه سلسیوس به مدت ۴۸ ساعت گذاشته شد. بعد از خشک شدن، نمونه‌ها به‌وسیله ترازوی دقیق یک‌صدم توزین گردید. از مجموع وزن غلاف خشک، وزن برگ خشک و وزن سوخ خشک عملکرد زیست‌توده بر حسب گرم به‌دست آمد و در نهایت بنا بر تراکم موجود به واحد کیلوگرم در هکتار تعمیم داده شد. شاخص برداشت از تقسیم وزن سوخ بر وزن کل بیوماس محاسبه شد (Kanton *et al.*, 2002). درجه باردهی از مجموع عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت به‌دست آمد (Koocheki and Khalghni, 1996). برای محاسبه میزان رشد پیاز از معادله (۴) استفاده شد (Sarmadnia and Koocheki, 1995).

جدول ۱- اطلاعات هواشناسی محل اجرای آزمایش در طول دوره رشد پیاز خوراکی (سال زراعی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲)

Table 1- Meteorological information at experimental site in two growing season 2012- 2013

Month	ماه	حداقل دما		حداکثر دما		میزان بارندگی		حداقل رطوبت		حداکثر رطوبت		مجموع ساعات آفتابی	
		Temperature Min. (°C)	Temperature Min. (°C)	Temperature Max. (°C)	Temperature Max. (°C)	Total precipitation (mm)	Total precipitation (mm)	نسبی هوا RH Min. (%)	نسبی هوا RH Min. (%)	نسبی هوا RH Max. (%)	نسبی هوا RH Max. (%)	Total sunny hour	Total sunny hour
Mar.	فروردین	4.1	9	16.5	18.5	35.1	38.1	25	31	71	81	205.9	252.9
Apr.	اردیبهشت	6.1	11	19.9	23.6	10.1	34.9	24	30	73	74	251.9	265.3
May.	خرداد	15.6	14.7	28.7	28.3	14.7	23.9	20	21	59	67	319.1	327.7
Jun.	تیر	19	19.3	31.7	32.7	14.3	4.7	22	18	63	54	332.1	379.7
Agu.	مرداد	22.5	19.1	32.7	35.3	5.6	0	15	20	44	56	328.7	356.5
Sep.	شهریور	16	17.2	30.7	31.4	2.1	0	21	15	61	58	332.5	340.2
Oct.	مهر	8.8	11.8	22.7	25.7	5.2	5.7	22	21	59	59	276.5	279.7
Nov.	آبان	4.5	6.5	14.8	16.8	15.3	33.6	43	42	79	80	174.6	182.5
Mean	میانگین	12.07	13.58	24.71	26.64	-	-	25	24	65	68	277.66	2980.6
Total	مجموع	-	-	-	-	92.8	155	-	-	-	-	2221.3	2384.5

هیچ کدام از اثرات متقابل (برهم‌کنش) در رابطه با این صفت معنی‌دار نگردید (جدول ۲). مقایسه میانگین نتایج دو ساله تیمارها نشان داد بیش‌ترین زیست‌توده کل گیاه از بذر درشت و کم‌ترین آن از بذر ریز به‌دست آمد (جدول ۳). این یافته با یافته‌های تیوبایسر (Tuba

عملکرد زیست‌توده

نتایج تجزیه واریانس مرکب دو ساله آزمایش نشان داد فاکتورهای سال، پرایمینگ، اندازه بذر و ارقام در سطح احتمال یک درصد تأثیر معنی‌دار بر زیست‌توده کل گیاه داشتند با این حال

تجزیه مرکب داده‌های آزمایش نشان داد که تاثیر فاکتورهای سال، اندازه بذر و پیش تیمار در سطح احتمال یک درصد و ژنوتیپ در سطح احتمال پنج درصد بر صفات کارایی مصرف آب سوخ و بیوماس معنی دار است و همچنین اثرات متقابل اندازه بذر × پرایمینگ × ژنوتیپ در سطح احتمالی یک درصد بر این صفات معنی دار بود (جدول ۲). مقایسه اثر متقابل اندازه بذر × پرایمینگ × ژنوتیپ نشان داد روش‌های مختلف پرایمینگ در هر سه اندازه بذر ژنوتیپ مورد مطالعه در مقایسه با تیمار شاهد تأثیری معنی دار در بهبود کارایی مصرف آب سوخ و بیوماس داشتند به طوری که بیشترین مقدار کارایی مصرف آب سوخ و بیوماس در بذور درشت و پرایم با ماده فولامین در ژنوتیپ قرمز آذرشهر و کمترین آن‌ها از بذور ریز و تیمار شاهد از ژنوتیپ زرقان به دست آمد (جدول ۵). به نظر می‌رسد افزایش کارایی مصرف آب در گیاهان حاصل از بذور پرایمینگ شده نسبت به شاهد ناشی از افزایش هدایت روزنه‌ای و باز و بسته شدن روزنه‌ها، افزایش رشد ریشه‌ها باشد که جذب آب و مواد غذایی را افزایش داده که منجر به افزایش عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه می‌شود. نتایج تحقیقات نشان داد که پیش تیمار بذر ارقام گندم با کینتین علاوه بر بهبود رشد و عملکرد، ظرفیت فتوسنتزی و کارایی مصرف آب را افزایش داد (Iqbal and Ashraf, 2005). اختلاف ژنوتیپ‌ها از نظر کارایی مصرف آب به توانایی آن‌ها از نظر جذب رطوبت خاک و گسترش سیستم ریشه و توانایی آن‌ها در اختصاص بیشتر ماده خشک به عملکرد اقتصادی مربوط می‌شود (Angus and Van Herwarden, 2001). گزارش‌های متعددی تنوع ژنتیکی را در بین ارقام گندم (*Triticum*) از نظر کارایی مصرف آب مورد تأکید قرار داده است (Kringwi et al., 2004; Iqbal and Ashraf, 2005). این گزارش‌ها در موافقت با نتایج حاصل از این بررسی است.

محتوای نسبی آب برگ

تجزیه مرکب داده‌های آزمایش نشان داد که تاثیر فاکتورهای سال، پیش تیمار، اندازه بذر و ژنوتیپ بر محتوای رطوبت نسبی برگ پیاز در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود و همچنین اثرات متقابل اندازه بذر × پرایمینگ در سطح احتمالی یک درصد بر این صفت معنی دار شد (جدول ۲). مقایسه اثر متقابل اندازه بذر × پرایمینگ نشان داد روش‌های مختلف پرایمینگ در هر سه اندازه بذر در مقایسه با تیمار شاهد تأثیری معنی دار بر محتوای رطوبت نسبی برگ داشتند. به طوری که بیشترین محتوای رطوبت نسبی برگ در بذور درشت و تیمار پرایمینگ با اسید آمینه فولامین به مقدار ۹۸ درصد و کمترین آن از بذور ریز و تیمار شاهد به مقدار ۶۴ درصد به دست آمد (جدول ۴).

(Bicer, 2009) برای گیاهان نخود (*Cicer arietinum*) و عدس (*Lens esculinaris*) مطابقت دارد. بر اساس نتایج این محقق زیست توده حاصل از بذورهای درشت شش درصد بیشتر از بذورهای ریز بود. همچنین نتایج مقایسه میانگین دو ساله داده‌ها نشان داد بیشترین زیست توده گیاه از تیمار پرایمینگ با ماده فولامین و کمترین آن از تیمار شاهد به دست آمد (جدول ۳). این نتیجه با نتایج آزمایش‌های سایر محققان که افزایش عملکرد بیولوژیک گیاهان حاصل از بذورهای پرایم شده نخود با آب و مانیتول ۴ درصد را گزارش کردند، مطابقت دارد (Kaur et al., 2005)، پژوهشگران، نشان دادند هیدروپرایمینگ موجب افزایش عملکرد بیولوژیک بذورهای نخود می‌گردد (Foti et al., 2002)، اسموپرایمینگ نیز موجب افزایش عملکرد بیولوژیک بذورهای کانولا (*Brassica napus*) گردید (Basra et al., 2003). پرایمینگ منجر به افزایش مدت فتوسنتز و میزان سطح فتوسنتزکننده، میزان تثبیت دی‌اکسید کربن و آسمیلات و نهایتاً افزایش بیوماس تولیدی خواهد شد (Chivasa et al., 2000). همچنین نتایج مقایسه میانگین دو ساله داده‌ها نشان داد بیشترین زیست توده از رقم قرمز آذرشهر و کمترین آن از اکوتیپ زرقان حاصل شد (جدول ۳). معنی دار شدن اثر ژنوتیپ حاکی از متفاوت بودن توان ژنتیکی ژنوتیپ‌ها در بروز عملکرد زیست توده می‌باشد (Moosavezadh, 2006).

میزان آب مصرفی

نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده‌های آزمایش نشان داد که فاکتورهای سال، اندازه بذر، پرایمینگ و ژنوتیپ در سطح احتمال یک درصد تأثیری معنی دار بر میزان آب مصرفی پیاز داشتند و همچنین اثرات متقابل اندازه بذر × پرایمینگ در سطح احتمال یک درصد بر این صفت معنی دار بود (جدول ۲). مقایسه میانگین اثر متقابل اندازه بذر × پرایمینگ نشان داد روش‌های مختلف پرایمینگ در هر سه اندازه بذر در مقایسه با تیمار شاهد تأثیری معنی دار بر میزان آب مصرفی پیاز داشتند. به طوری که بیشترین میزان آب مصرفی به گیاهان حاصل آن از بذور ریز و تیمار شاهد و کمترین آن به گیاهان حاصل از بذور درشت و تیمار پرایمینگ با ماده فولامین تعلق داشت (جدول ۴). به طور میانگین حجم آب مصرفی در پرایمینگ با ماده فولامین حدود ۱۱/۶ درصد نسبت به تیمار شاهد و در بذور درشت حدود ۱۲/۴ درصد نسبت به بذور ریز کاهش یافته است. نتایج تحقیق دوگان و همکاران (Dogan et al., 2011) نشان داد که میزان آب مصرفی تاثیر معنی داری بر کارایی مصرف آب دارد به طوری که افزایش حجم آبیاری از کارایی مصرف آب کاسته شد و بالاترین کارایی مصرف آب در پایین‌ترین سطح آبیاری به دست آمد که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.

کارایی مصرف آب سوخ و بیوماس

جدول ۲- تجزیه واریانس مرکب صفات گیاهی مورد مطالعه در تیمارهای آزمایشی
Table 2- Combined analysis of variance plant characteristics in experiment treatments

منابع تغییرات S.O.V	درجه آزادی d.f	عملکرد Biomass yield	کارایی مصرف آب Biomass water use efficiency	مصرف آب Water consumption	محتوای نسبی آب Relative water content	شاخص برداشت Harvest index	هدایت روزنه‌ای در مرحله سوخ‌دهی Stomatal conductance in bulbing stage	هدایت روزنه‌ای در مرحله پرشدن Stomatal conductance bulbication stage	میزان رشد Growth ratio	درجه باردهی Productivity y score	انرژی دریافتی Received energy	انرژی تولیدی Production energy
سال Year (Y)	1	272.501**	110.232**	372.501**	9.6540**	210.232**	60.955**	252.501**	275.175**	474.767**	89.737**	2212.736**
تکرار (سال) R\Year	4	3.1010	5.2880	5.1050	3.08644	6.2880	7.502	3.1010	82.385	148.002	193.828	417.747
انباره پلر Seed size (SS)	2	99.825**	8.1825*	69.825**	9.1825*	55.6159**	63.595**	89.325**	3.994**	877.277**	524.656**	4665.433**
سال × انباره پلر Y×SS	2	4.345ns	5.0186ns	6.345ns	6.0186ns	3.15995ns	28.492 ns	4.045ns	3.994ns	34.398ns	24.357ns	1.73883ns
پرایمینگ Priming (P)	3	88.6816**	7.1570**	93.0927**	9.1570**	83.0927**	56.944**	88.6516**	136.967**	398.798**	901.013**	2989.298**
سال × پرایمینگ Y×P	3	4.162ns	1.1895ns	6.162ns	3.1895ns	4.1599ns	3.754ns	3.662ns	37.300ns	36.351ns	24.3483ns	62.2447ns
اکوتیپ Ecotype (E)	1	88.4863**	9.0828*	98.4863**	8.0828*	11.08128*	4.315*	44.4863**	49.690ns	406.348**	20.0432ns	1004.419**
سال × اکوتیپ E×Y	1	1.0603ns	2.0803ns	3.0603ns	3.0803ns	5.08025ns	0.806ns	1.0603ns	19.932ns	19.809ns	1910.322ns	27.982ns
انباره پلر × پرایمینگ P × S	6	5.0664ns	3.0748ns	66.066**	15.0748**	56.7816**	0.0227ns	1.0664ns	39.883ns	48.775ns	24.187ns	169.861*
انباره پلر × اکوتیپ E × SS	2	1.14387ns	4.1562ns	3.14387ns	6.1562ns	3.21717ns	1.027ns	4.14377ns	52.541ns	32.937ns	22.8074ns	40.1304ns
پرایمینگ × اکوتیپ E × P	3	1.75730ns	2.196ns	3.75730ns	4.196ns	4.4306ns	2.119ns	3.7583ns	43.460ns	18.990ns	26.661ns	10.3418ns
انباره پلر × پرایمینگ × اکوتیپ E × P × SS	6	3.18218ns	8.1298ns	3.18218ns	6.1298ns	3.80065ns	1.81ns	0.18218ns	88.362*	100.71*	22.934ns	179.585*
انباره پلر × پرایمینگ × اکوتیپ × سال Y × E × P × SS	6	2.3118ns	1.3803ns	2.3118ns	4.3803ns	4.60307ns	1.4922ns	1.31187ns	67.1954ns	47.0406ns	24.4842ns	54.334ns
خطای آزمایشی Error	92	7.5796	5.9317	6.5096	8.0569	5.9317	70.7942	6.5769	68.300	41.1915	25.3747	64.9871
CV (%)	-	13.7	9.6	11.7	7.6	12.9	17.4	13.7	16.9	11.6	12.2	9.82

ns: Non-Significant, * and **: Significant at 5% and 1% of probability levels, respectively

ns: غیر معنی‌دار، * و **: معنی‌دار در سطح احتمال پنج و یک درصد

جدول ۲- مقایسه میانگین صفات گیاهی مورد مطالعه در اندازه بذر، پیش تیمار و رقم در دو سال زراعی ۹۱ و ۹۲
Table 3- Mean comparison of different plant characteristics of seed size, pre-treatment and cultivar in 2012 and 2013 cropping seasons

تیمار Treatment	عملکرد زیست توده Biomass yield (ton.ha ⁻¹)	هدایت روزنه‌ای در مرحله سوخ دهی Stomatal conductance in bulbing stage (mol.m ⁻² .sec ⁻¹)	هدایت روزنه‌ای در مرحله پوشش سوخ Stomatal conductance in bulbification stage (mol.m ⁻² .sec ⁻¹)	درجه باردهی Productivity score	آب مصرفی Water consumption (m ³ .ha ⁻¹)	محتوای نسبی آب Relative water content (%)	شاخص برداشت Harvest index (%)	میزان رشد Growth ratio
فصل زراعی								
Cropping season								
2011-2012	77.57b	0.231b	0.206b	253.9b	17354.4a	74b	73	0.553a
2012-2013	86.13a	0.263a	0.237a	294.1a	17158.6b	89a	76	0.542b
اندازه بذر								
Seed size								
ریز	55.09c	0.204c	0.187c	204.1c	19722.45a	75b	72	0.489c
Small								
متوسط	90.3b	0.243b	0.217b	210.1b	17969.40b	76b	76	0.532b
Medium								
درشت	100.33a	0.284a	0.256a	407.48a	15903.20c	85a	80	0.589a
Large								
پرایمینگ								
Priming								
شاهد	54.75c	0.204d	0.178d	205.12d	19545.20a	74	75	0.491c
Control								
هیدروپرایمینگ	88.8bc	0.247c	0.196c	225.15c	17713.8b	73c	77	0.534b
Hydropriming								
نیترات پتاسیم	97.84b	0.268b	0.227b	255.25b	17575.3c	79b	79	0.550b
KNO3								
فولامین	105.98a	0.329a	0.289a	409.56a	15891.9d	86a	82	0.596a
Folamin								
اکوتیپ								
Ecotype								
قرمز آذربایجان	100.40a	0.337a	0.296a	311.5a	18545.7a	91a	81	0.534b
Red Azarshahr								
زرغان	85.59b	0.289b	0.254b	236.5b	16945.6b	71b	74	0.591a
Zarghan								

Mean in each column and treatment with the same letter are not significantly different at 5% of probability level-using Duncan's Multiple Range Test
میانگین‌های هر ستون و تیمار دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد دارای تفاوت آماری معنی‌داری نمی‌باشد.

جدول ۴- مقایسه میانگین مرکب اثر متقابل اندازه بذر و پرایمینگ بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک پیاز خوراکی در تیمارهای آزمایشی
Table 4- Mean comparison interaction effect of seed size × priming on some physiological characteristics of onion in experiment treatments

Seed size	Priming	آب مصرفی Water consumption (m ³ .ha ⁻¹)	محتوای نسبی آب Relative water content (%)	شاخص برداشت Harvest index (%)	میزان رشد Growth ratio
ریز Small	شاهد Control	18619.43a	64d	69i	0.540f
	هیدروپرایمینگ Hydropriming	18535.52bc	74cd	72gh	0.543cdef
	نیتراپتاسیم KNO ₃	18046.88ab	77bcd	76cdef	0.544cdef
	فولامین Folamin	17036.25abc	78bcd	79bc	0.545cde
متوسط Medium	شاهد Control	18480ab	68d	71.02efg	0.542def
	هیدروپرایمینگ Hydropriming	17902.5ab	72cd	74cdef	0.535ef
	نیتراپتاسیم KNO ₃	17613.75abc	76bcd	78cd	0.550cde
	فولامین Folamin	16891.88abc	80bc	79.8bc	0.566a
درشت Large	شاهد Control	18335.63ab	73cd	72fgh	0.558abc
	هیدروپرایمینگ Hydropriming	17613.75abc	81bc	76c	0.561def
	نیتراپتاسیم KNO ₃	17180.63bcd	90bcd	80b	0.556abcd
	فولامین Folamin	15747.5ef	98a	89a	0.598a

میانگین‌های، هر ستون و تیمار دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد دارای تفاوت آماری معنی‌داری نمی‌باشد.

Mean in each column and treatment with the same letter are not significantly different at 5% of probability level-using Duncan's Multiple Range Test

پرایم گردید. پرایمینگ بذور درشت با ماده فولامین بیشترین محتوای نسبی آب برگ را به خود اختصاص دادند و تیمار بدون پرایم کمترین مقدار محتوای نسبی آب برگ را داشت. محتوای نسبی آب برگ بذور ریز تحت تاثیر تیمارهای پرایمینگ قرار نگرفت. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات بخرد و همکاران (Bekhrad et al., 2016) در گیاه کنجد (*Sesamum indicum*) مطابقت دارد و گزارش نمودند محتوای نسبی آب برگ گیاهان حاصل از بذور پرایم شده بیشتر از بذور بدون پرایم (شاهد) بود. به نظر می‌رسد تیمارهای پرایمینگ بذور با افزایش محتوای نسبی آب برگ سبب حفظ و بهبود رشد گیاه می‌گردند. اختلاف در میزان محتوای نسبی آب گیاه ممکن است نشان‌دهنده تاثیر متفاوت تیمارها برای جذب آب از خاک و یا توانایی کنترل هدرروی آب از طریق روزنه‌ها و یا اختلاف در توانایی گیاه برای تجمع و تنظیم اسمزی برای حفظ تورژانس بافت و افزایش فعالیت‌های فیزیولوژیکی باشد (Singh and Usha, 2003). بین اکوتیپ‌های پیاز از نظر محتوای نسبی آب برگ، اختلاف معنی‌داری

در بذور ریز تیمارهای پرایمینگ تاثیری بر محتوای نسبی آب برگ نداشتند و همه تیمارها در یک گروه قرار گرفته‌اند. در بذور درشت و متوسط تیمار فولامین نسبت به بقیه تیمارهای پرایم برتر بوده است. به همین دلیل اثر متقابل معنی‌دار شده است. بر اساس نتایج این پژوهش پرایمینگ بذور با محلول‌های شیمیایی موجب بهبود محتوای رطوبت نسبی برگ در مقایسه با شاهد گردید و همچنین افزایش اندازه بذر باعث افزایش محتوای رطوبت نسبی برگ گردید که نشانگر نگهداری بیشتر آب در برگ گیاهان حاصل از بذور درشت و پرایمینگ با ماده فولامین می‌باشد. سینگ و اوشا (Singh and Usha, 2003) بیان کردند که در گندم، گیاهان حاصل از بذور پرایمینگ شده محتوای رطوبتی بالاتری را در مقایسه با بذور تیمار نشده در شرایط نرمال و تنش نشان دادند که با نتایج حاصل از این پژوهش مطابقت دارد. محتوای نسبی آب برگ معرف بسیار خوبی از وضعیت آبی گیاه است. با اعمال روش‌های پرایمینگ بذور با تیمارهای مختلف سبب افزایش محتوای نسبی آب برگ نسبت به بذورهای بدون

و همچنین واعظ و همکاران (Vaez et al., 2016) گزارش نمودند در گیاه گندم اختلاف معنی دار بین ارقام گندم از نظر شاخص برداشت وجود دارد به طوری که بیشترین شاخص برداشت برابر ۳۸/۸ درصد از رقم دنا و کمترین آن برابر ۳۵/۶ درصد از رقم پارسا به دست آمد که با نتایج این پژوهش هم خوانی دارد. شاخص برداشت بیان کننده نسبت مواد فتوسنتزی بین عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیک است. این شاخص یکی از معیارهای مورد استفاده در برآورد کارایی توزیع یا انتقال مواد ساخته شده به محصول اقتصادی در گیاه می باشد، این گونه می توان تفسیر کرد که ظرفیت بیشتر مقصد فیزیولوژیک^۱ در ارقام پر محصول می تواند باعث تحریک سرعت فتوسنتز بالاتر برگ گردد (Rahmati, 2005). علاوه بر عوامل ژنتیکی، محیطی نظیر آب، کود، تاریخ کاشت، تراکم و غیره می توانند شاخص برداشت را تحت تأثیر قرار دهند (Bahari et al., 2005).

هدایت روزنه ای

نتایج داده های حاصل از تجزیه مرکب دو سال آزمایش نشان داد فاکتورهای سال، اندازه بذر، پیش تیمار و اکوتیپ در سطح احتمال یک درصد تأثیر معنی داری بر صفات هدایت روزنه ای در مرحله سوخ دهی و پر شدن سوخ داشتند. همچنین هیچ کدام از اثرات متقابل تأثیر معنی داری بر این صفات نداشتند (جدول ۲). مقایسه میانگین نتایج دو ساله تیمارها نشان داد بیشترین هدایت روزنه ای در مرحله سوخ دهی و پر شدن سوخ از بذر درشت و کمترین آن ها از بذر ریز به دست آمد (جدول ۳). همچنین نتایج مقایسه میانگین دو ساله داده ها نشان داد بیشترین هدایت روزنه ای در مرحله سوخ دهی و پر شدن سوخ از تیمار پرایمینگ با ماده فولامین و کمترین آنها از تیمار شاهد به دست آمد (جدول ۳). نتایج تحقیقات شکاری و همکاران (Shekari et al., 2010) نشان داد اختلاف معنی دار از نظر هدایت روزنه ای بین بذور پرایم شده گیاه لوبیا (*Phaseolus vulgaris*) و تیمار شاهد وجود دارد به نحوی که، در بین تیمارها، بیشترین هدایت روزنه ای مربوط به گیاهان حاصل از بذور پرایم شده و کمترین هدایت روزنه ای هم مربوط به تیمار شاهد بود که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد. همچنین نتایج مقایسه میانگین دو ساله داده ها نشان داد بیشترین میزان هدایت روزنه ای در مرحله سوخ دهی و پر شدن از اکوتیپ قرمز آذرشهر و کمترین آن ها از رقم اکوتیپ حاصل شد (جدول ۳). نتایج تحقیق حاضر با نتایج آزمایشات دیگری مبنی بر تفاوت معنی دار بین ارقام گندم در هدایت روزنه ای در شرایط تنش و غیر تنش (شاهد) مشابهت دارد (Siosemardehi et al., 2004). نتایج این پژوهش نشان داد در تیمارهای آزمایش میزان هدایت روزنه ای در مرحله سوخ دهی نسبت به مرحله پر شدن سوخ بیشتر بود، این امر احتمالاً به دلیل گرم شدن هوا در مرحله پر شدن سوخ و افزایش تقاضای تبخیری اتمسفر و در

وجود داشت (جدول ۲). مقایسه میانگین ها نشان داد بیشترین محتوای نسبی آب برگ از اکوتیپ قرمز آذرشهر و کمترین آن از اکوتیپ زرقان به دست آمد که کاهشی معادل ۱۰/۳۰ درصد را نشان داد (جدول ۳). نتایج تحقیق حاضر با نتایج آزمایشات دیگری مبنی بر تفاوت معنی دار بین ارقام گندم در میزان محتوای نسبی آب گیاه، در شرایط تنش و غیر تنش (شاهد) مشابهت دارد (Siosemardehi et al., 2004). بنابراین محتوای نسبی آب برگ صفتی است که علاوه بر عوامل محیطی، تحت تاثیر ژنوتیپ هم قرار می گیرد. به نظر می رسد که اکوتیپ قرمز آذرشهر نسبت به اکوتیپ زرقان توانایی بالاتری در حفظ پتانسیل آبی سلول ها و محتوای نسبی آب برگ داشته باشد.

شاخص برداشت

نتایج داده های حاصل از تجزیه مرکب دو سال آزمایش نشان داد فاکتورهای سال، پرایمینگ و اندازه بذر در سطح یک درصد و ژنوتیپ در سطح احتمال پنج درصد تأثیر معنی داری بر شاخص برداشت داشتند و همچنین تأثیر متقابل اندازه بذر × پرایمینگ در سطح احتمال یک درصد بر این صفت معنی دار بود. سایر اثرات متقابل موجود در منابع تغییر این پژوهش تأثیر معنی داری بر روی شاخص برداشت نداشتند (جدول ۲). مقایسه میانگین اثر متقابل اندازه بذر × پرایمینگ نشان داد روش های مختلف پرایمینگ در هر سه اندازه بذر در مقایسه با تیمار شاهد تأثیری معنی دار بر شاخص برداشت داشتند. به طوری که بیشترین شاخص برداشت به گیاهان حاصل آن از بذور درشت و تیمار پرایمینگ با ماده فولامین و کمترین آن به گیاهان حاصل از بذور ریز و تیمار شاهد تعلق داشت (جدول ۴). در آزمایشات فاروق و همکاران (Farooq et al., 2006)، پرایمینگ، شاخص برداشت را افزایش داد. سلیمی و همکاران (Salimi et al., 2010) نیز تأثیر مثبت هیدروپرایم بذره ای نخود را بر شاخص برداشت تأیید کرده اند. از آنجا که پرایمینگ بذور موجب تسریع مراحل فنولوژی گیاه می شود، ممکن است انتظار رود که سوخ مدت زمان بیشتری برای ذخیره مواد پرورده در اختیار داشته باشد و چون وزن هر سوخ در درجه به وسیله طول دوره پر شدن سوخ تعیین می شود در نتیجه پیش تیمار بذور موجب افزایش شاخص برداشت می شود. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین ژنوتیپ ها از نظر شاخص برداشت اختلاف معنی دار وجود دارد به طوری که بیشترین آن از ژنوتیپ قرمز آذرشهر و کمترین آن از ژنوتیپ زرقان به دست آمد که معادل ۸/۹ درصد کاهش داشت. نتایج تحقیقات ایزدخواه و همکاران (Izadkhah et al., 2010a) نشان داد در گیاه پیاز بین ارقام پیاز تفاوت معنی داری از نظر شاخص برداشت وجود دارد به طوری که بیشترین شاخص برداشت برابر ۷۰ درصد از رقم قرمز آذرشهر و کمترین آن برابر ۶۰ درصد از رقم قولی قصه زنجان به دست آمد که این با این نتایج این تحقیق مطابقت دارد

درجه باردهی

نتایج داده‌های حاصل از تجزیه مرکب دو سال آزمایش نشان داد فاکتورهای سال، اندازه بذر، پیش تیمار و ژنوتیپ در سطح احتمالی یک درصد تأثیر معنی‌داری بر درجه باردهی داشتند با این حال هیچ کدام از اثرات متقابل تأثیر معنی‌داری بر روی این صفت نداشتند (جدول ۲). بررسی اثر ساده تجزیه دو ساله آزمایش نشان داد که بیشترین درجه باردهی متعلق به بذور درشت است. بذر متوسط و ریز از نظر این صفت اختلافی با هم نداشته و از نظر آماری در یک گروه قرار گرفتند (جدول ۳). همچنین بیشترین مقدار درجه باردهی از تیمار پرایمینگ با ماده فولامین و کمترین آن از تیمار شاهد به دست آمد و تیمارهای هیدروپرایمینگ و پرایمینگ با نیترات پتاسیم از نظر این صفت اختلافی با هم نداشته و از نظر آماری در یک گروه قرار گرفتند (جدول ۳). همچنین نتایج مقایسه میانگین دو ساله داده‌ها نشان داد بیشترین درجه باردهی از ژنوتیپ قرمز آذرشهر حاصل شد (جدول ۳). بر اساس درجه باردهی ژنوتیپ قرمز آذرشهر برتر از زرقان بود. درجه باردهی به عنوان کلیدی جهت درک بهتر تولید محصولات زراعی مورد استفاده قرار می‌گیرد استفاده از آن برای ارزیابی مجموعه پیچیده ای از داده‌ها برای اکثر محصولات زراعی فراهم می‌نماید و اهمیت آن این است که تفسیر واکنش‌های پیچیده گیاه را به راحتی امکان‌پذیر می‌سازد (Koocheki and Khalghni, 1996). نتایج تحقیقات عبدالرحمنی (Abdolrahmane, 2014b) نشان داد که تأثیر پرایمینگ بر درجه باردهی گیاه جو (*Hordeum vulgare*) معنی‌دار بود به طوری که بیشترین میزان درجه باردهی در گیاهان حاصل از بذور پرایم شده و کمترین آن از تیمار شاهد به دست آمد که با نتایج پژوهش حاضر هم‌خوانی دارد.

میزان انرژی دریافتی گیاه

نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده‌های مربوط به میزان انرژی دریافتی توسط پیاز نشان از تأثیر معنی‌دار فاکتورهای سال، پرایمینگ، اندازه و ژنوتیپ در سطح احتمال یک درصد بر این صفت داشت. همچنین اثرات متقابل اندازه بذر × پرایمینگ و اندازه بذر × ژنوتیپ در سطح احتمال پنج درصد بر این صفت معنی‌دار بود (جدول ۲). مقایسه اثر متقابل اندازه بذر × پرایمینگ × ژنوتیپ نشان داد روش‌های مختلف پرایمینگ در هر سه اندازه بذر ژنوتیپ‌های مورد مطالعه در مقایسه با تیمار شاهد تأثیری معنی‌دار بر میزان انرژی دریافتی توسط پیاز داشتند به طوری که بیشترین میزان انرژی دریافتی در گیاهان حاصل از بذور ریز و تیمار شاهد برابر ۷۲۸/۷۰ ساعت از ژنوتیپ قرمز آذرشهر و کمترین آن برابر ۵۹۸/۰۷ ساعت از گیاهان حاصل از بذور درشت و تیمار پرایمینگ با ماده فولامین در ژنوتیپ زرقان به دست آمد (جدول ۵).

نتیجه سازگاری گیاه برای کاهش اندازه دهانه روزنه و به دنبال آن کاهش هدایت رونه‌ای می‌باشد دیگر پژوهشگران نظیر باکون (Bacon, 2004) نیز چنین استدلال‌هایی به کار گرفته‌اند. کاهش هدایت رونه‌ای میزان دسترسی سلول‌های فتوسنتزکننده را به دی‌اکسید کربن به عنوان فاکتور اصلی اجزای فتوسنتز کاهش می‌دهد که برآیند آن عدم تأمین متابولیت‌های مورد نیاز برای رشد و نمو سلول‌های گیاهی است (Saremi et al., 2014).

میزان رشد گیاه

نتایج داده‌های حاصل از تجزیه مرکب دو سال آزمایش نشان داد فاکتورهای سال، پرایمینگ و اندازه بذر در سطح یک درصد و ژنوتیپ در سطح احتمال پنج درصد تأثیر معنی‌داری بر میزان رشد گیاه داشتند و همچنین تأثیر متقابل اندازه بذر × پرایمینگ در سطح احتمال یک درصد بر این صفت معنی‌دار بود. سایر اثرات متقابل موجود در منابع تغییر این پژوهش تأثیر معنی‌داری بر روی میزان رشد گیاه نداشتند (جدول ۲). مقایسه میانگین اثر متقابل اندازه بذر × پرایمینگ نشان داد روش‌های مختلف پرایمینگ در هر سه اندازه بذر در مقایسه با تیمار شاهد تأثیری معنی‌دار بر میزان رشد گیاه داشتند. به طوری که بیشترین میزان رشد گیاه به گیاهان حاصل از بذور درشت و تیمار پرایمینگ با ماده فولامین به مقدار ۰/۵۹۸ و کمترین آن برابر ۰/۵۰۴ به گیاهان حاصل از بذور ریز و تیمار شاهد تعلق داشت (جدول ۴). نتایج تحقیقات اقبال و اشرف (Iqbal and Ashraf, 2005) نشان داد که پیش تیمار بذر گندم با کیتین موجب بهبود میزان رشد گیاه گردید که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد. همچنین نتایج مقایسه میانگین دو ساله داده‌ها نشان داد بیشترین میزان رشد گیاه برابر ۰/۵۸۴ از رقم قرمز آذرشهر و کمترین آن برابر ۰/۵۳۰ از رقم زرقان حاصل شد (جدول ۳). طبق نتایج تحقیقات متعدد، بذرهایی پرایمینگ شده در مقایسه با بذرهایی شاهد با سرعت بیش‌تری جوانه می‌زنند، جوانه‌زنی سریع و سبز شدن یکنواخت در مزرعه برای استقرار موفقیت‌آمیز گیاه زراعی در هر دو شرایط تنش و بدون تنش ضروری است، اما جوانه‌زنی کند و غیریکنواخت به تولید گیاهانی کمتر و کوچک‌تر منجر می‌شود که در برابر تنش‌های زنده و غیرزنده، آسیب‌پذیری بیشتری دارند؛ همچنین با افزایش طول دوره سبز شدن و طول دوره رشد، موجب استقرار پوشش گیاهی ضعیف در مزرعه و کاهش میزان رشد می‌گردد (Abdolrahmani et al., 2007a; Ashraf and Foolad, 2005). مطابق نظر هاولین و همکاران (Havlin et al., 1997) تحریک رشد اولیه گیاهچه به کمک روش‌های پرایمینگ بذر به همراه تأمین عناصر غذایی ضروری مورد نیاز برای رشد در اوایل فصل رشد، می‌تواند موجب سبز شدن سریع گیاهچه‌ها و ورود زودتر آن‌ها به مرحله اتوتروف و در نهایت دستیابی سریع‌تر به سطح سبز مطلوب و میزان رشد مناسب گردد.

جدول ۵- مقایسه میانگین مرکب اثر متقابل اندازه بذر، پرایمینگ و اکوتیپ بر صفات پیاز خوراکی
Table 5- Mean comparison interaction effect of seed size× Priming× cultivar on plant characteristics of onion

اندازه بذر Seed size	پرایمینگ Priming	اکوتیپ Ecotype	کارایی مصرف آب سوخ Bulb water use efficiency (kg.m ⁻³)	کارایی مصرف آب زیست توده Biomass water use efficiency (kg.m ⁻³)	انرژی دریافتی پیاز Plant received energy (h)	انرژی تولیدی سوخ Bulb production energy (kcal/100g)	
ریز Small	شاهد Control	آذرشهر Azarshahr	2.28 abc	4.99i	728.70a	42.28 abc	
		زرقان Zarghan	1.99def	4.09hi	679.04abcde	41.03hi	
	هیدروپرایمینگ Hydro priming	آذرشهر Azarshahr	2.99a	4.54hi	697.71abcd	42.49 abc	
		زرقان Zarghan	3.1abc	4.84cdefg	680.66abcde	42.69abc	
	نترات پتاسیم KNO ₃	آذرشهر Azarshr	3. 6cdef	4.97ghi	620.67bcde	40.36cdef	
		زرقان Zarghan	3.76ab	5.20defgh	694.16abcd	41.16ab	
	فولامین Folammin	آذرشهر Azarshahr	3.84abc	6.97cdefg	703.70abc	42.44abc	
		زرقان Zarghan	3.94ab	6.77bcdef	644.52abcde	41.54ab	
	متوسط Medium	شاهد Cont	آذرشهر Azarshahr	2.40cdef	6.74fghi	643.10abcde	43.40cdef
			زرقان Zarghan	2.5def	6.54efgh	709.49ab	43.5def
		هیدروپرایمینگ Hydro priming	آذرشهر Azarshahr	3.04ef	6.89efgh	684.85abcde	43.54ef
			زرقان Zarghan	3.13cdef	6.69cdefg	667.09abcde	43.13cdef
نترات پتاسیم KNO ₃		آذرشهر Azarshahr	3.71bcdef	6.62bcde	658.33abcde	44.11bcdef	
		زرقان Zarghan	3.94abc	6.72bc	609.71de	49.21abc	
فولامین Folammin		آذرشهر Azarshahr	3.99abc	6.99 b	607.82de	50.49abc	
		زرقان Zarghan	3.89bcdef	6.82b	724.78a	51.59bcdef	
درشت Large		شاهد Cont	آذرشهر Azarshahr	4.03f	7.19efgh	617.05cde	51.83f
			زرقان Zarghan	4.23cdef	7.39bc	624.02bcde	51.93cdef
		هیدروپرایمینگ Hydro priming	آذرشهر Azarshahr	4.47cdef	7.44bc	655.11abcde	51.47cdef
			زرقان Zarghan	4.57abc	7.94bcdef	695.17abcd	52.57abc
	نترات پتاسیم KNO ₃	آذرشهر Azarshahr	4.94bcdef	7.97bcd	643.17accde	52.54bcdef	
		زرقان Zargan	4.64bcde	8.07bcde	705.09abc	53.64bcde	
	فولامین Folammin	آذرشهر Azarshahr	4.92a	13.07a	661.75abcde	67.92a	
		زرقان Zarghan	4.72 bcd	11.97bcd	598.07e	53.82 bed	

میانگین‌های، هر ستون و تیمار دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد دارای تفاوت آماری معنی‌داری نمی‌باشد.
Mean in each column and treatment with the same letter are not Significantly different at 5% of probability level-using Duncan's Multiple Range Test.

تفاوت معنی‌دار بین ارقام پیاز در میزان انرژی تولیدی سوخ مشاب‌هت دارد (Bhattacharjee et al., 2013).

نتیجه‌گیری

نتایج بررسی نشان داد تاثیر روش‌های مختلف پرایمینگ بر عملکرد بیوماس، کارایی مصرف آب و خواص اکوفیزیولوژیک معنی‌دار بود به طوری که بیشترین مقدار عملکرد بیوماس، کارایی مصرف آب سوخ و بیوماس از پرایمینگ با ماده فولامین و کمترین آن‌ها از تیمار شاهد به دست آمد.

در مورد تاثیر اندازه‌های مختلف بذر بر عملکرد بیوماس، کارایی مصرف آب و خواص اکوفیزیولوژیک، ملاحظه شد که با افزایش اندازه بذر عملکرد بیوماس، کارایی مصرف آب سوخ و بیوماس افزایش یافت به طوری که بیشترین آن‌ها از بذر درشت و کمترین آن‌ها از بذر ریز به دست آمد.

نتایج این بررسی نشان داد در بین اکوتیپ‌های مورد مطالعه اکوتیپ قرمز آذرشهر به دلیل داشتن عملکرد بیوماس، کارایی مصرف آب، شاخص برداشت، محتوای رطوبت نسبی برگ و درجه باردهی بیشتر نسبت به اکوتیپ زرقان برتر بود که این ارجحیت بخشی به دلیل پتانسیل ژنتیکی این اکوتیپ و بخش دیگر در اثر پرایمینگ با اسید آمینه فولامین ۲ درصد می‌باشد. در مجموع از نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که پرایمینگ بذرهای درشت با استفاده از اسید آمینه فولامین ۲٪ نسبت به سایر روش‌های پرایمینگ و نسبت به سایر اندازه‌های بذر باعث بهبود عملکرد بیوماس، کارایی مصرف آب و خواص اکوفیزیولوژیکی پیاز می‌گردد.

نتایج این بررسی نشان داد میزان انرژی دریافتی گیاهان حاصل از بذر درشت و پرایمینگ شده با استفاده از ماده فولامین و اکوتیپ زرقان کمتر از میزان انرژی دریافتی گیاهان حاصل از بذر ریز و تیمار شاهد و اکوتیپ قرمز آذرشهر بود به عبارت دیگر گیاهان حاصل از بذر درشت و پرایمینگ شده با استفاده از ماده فولامین و اکوتیپ زرقان زودتر از گیاهان حاصل از بذر ریز و تیمار شاهد و اکوتیپ قرمز آذرشهر برداشت شدند. استفاده از میزان انرژی دریافتی برای تعیین زمان برداشت نیز توسط سایر محققین پیشنهاد شده است (Rahemi, 1994).

میزان انرژی تولیدی سوخ

نتایج داده‌های حاصل از تجزیه مرکب دو سال آزمایش نشان داد فاکتورهای سال، اندازه بذر، پرایمینگ در سطح احتمال یک درصد و ژنوتیپ در سطح احتمال پنج درصد تاثیر معنی‌داری بر میزان انرژی تولیدی توسط سوخ داشتند و همچنین اثرات متقابل اندازه بذر × پرایمینگ و اندازه بذر × ژنوتیپ در سطح احتمال پنج درصد بر این صفت معنی‌دار بود (جدول ۲). مقایسه اثر متقابل اندازه بذر × پرایمینگ × ژنوتیپ نشان داد روش‌های مختلف پرایمینگ در هر سه اندازه بذر ژنوتیپ‌های مورد مطالعه در مقایسه با تیمار شاهد تأثیری معنی‌دار بر میزان انرژی دریافتی داشتند به طوری که بیشترین میزان انرژی تولیدی سوخ در گیاهان حاصل از بذر درشت و پرایم با اسید آمینه فولامین برابر ۶۷/۹۲ کیلوکالری در صد گرم سوخ، اکوتیپ قرمز آذرشهر و کمترین آن برابر ۴۱/۰۳ کیلوکالری در صد گرم از گیاهان حاصل از بذر ریز و تیمار شاهد در اکوتیپ زرقان به دست آمد (جدول ۵). نتایج تحقیق حاضر با نتایج آزمایشات دیگری مبنی بر

References

1. Abdulrahmani B., Ghassemi, K., Ghassemi-Golezani K., Valizadeh M., and Asl, V. 2007_a. Seed priming and seedling establishment of barley (*Hordium vulgare* L.). Journal of Food, Agriculture and Environment 5: 179-184.
2. Abdulrahmane, B. 2014_b. Evaluation of hydropriming effects on the growth characteristics and yield of different wheat genotypes and variety under dryland condition. Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology 1 (4): 91-104. (in Persian with English abstract).
3. Abdzad Gohari, A., Amiri, E., and Majd Salimi, K. 2011. Yield evaluation and water use efficiency in peanut (*Arachis hypogaea* L.) under different levels of irrigation and nitrogen fertilizer. Journal of Water and Soil 25 (5): 994-1004. (in Persian with English abstract).
4. Angus, J. F., and Van Herwarden, A. F. 2001. Increasing water use and water use efficiency in dryland wheat. Agronomy Journal 93: 290-298.
5. Arunachalam, A., Khan, M. L., and Singh, N. D. 2003. Germination, growth and biomass accumulation as influenced by seed size in *Mesua ferrea* L. Turkish Journal of Botany 27: 343-348.
6. Asaduzzaman, M., Hasan, M. M., and Moniruzzaman, M. 2012. Quality seed production of onion (*Allium cepa* L.): an integrated approach of bulb size and plant spacing. Journal of Agricultural Research 50 (1): 119-128.
7. Ashraf, M., and Foolad, M. R. 2005. Pre-sowing seed treatment-A shotgun approach to improve germination, plant growth and crop yield under saline and non-saline conditions. Advances in Agronomy 88: 223-271.
8. Bacon, M. A. 2004. Water use efficiency in plant biology. Blackwell Science. P. 246.
9. Bahari, M. R., Pahlavani, N., Akbari, P., and Ehsanzadeh, A. 2005. Effects of low iron and copper fertilizer on growth and yield of chickpea under rainfed conditions Aligudarz-AZNA area. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 12: 190-200. (in Persian with English abstract).

10. Basra, M. A. S., Ehsanullah, E. A., Warraich, M. A., and Afzal, I. 2003. Effect of storage on growth and yield of primed canola *Brassica napus* seeds. *International Journal Agriculture and Biology* 5: 117-120.
11. Bastam, N., Baninasab, B., and Ghobadi, C. 2013. Improving salt tolerance by exogenous application of salicylic acid in seedlings of pistachio. *Plant Growth Regulation* 69: 275-284.
12. Bekhrad, H., Mahdavi, B., and Rahimi, A. 2016. Effect of seed priming on growth and some physiological characteristics of sesame (*Sesamum indicum* L.) under salinity stress condition caused by alkali salts. *Iranian Journal of Field Crops Research* 13 (4): 810-822.
13. Bhattacharjee, S., Sultana, A., Sazzad, M. H., Islam, M. A., Ahtashom, M., and Asaduzzaman, M. 2013. Analysis of the proximate composition and energy values of two varieties of onion (*Allium cepa* L.) bulbs of different origin: A comparative study. *International Journal of Nutrition and Food Sciences* 2 (5): 246-253.
14. Bogumila, B., Bert van, D., and Mieczyslaw, G. 2006. Effect of water supply methods and seed moisture content on germination of China aster (*Callistephus chinensis*) and tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill) seed. *European Journal of Agronomy* 24: 45-51.
15. Chivasa, W., Harris, D., Chiduz, C., Mashingaidze, A. B., and Nymundeza, P. 2000. Determination of optimum On-farm seed priming time for mize (*Zea mays* L.) and sorghum (*Sorghum bicolor* L.) for use to improve stand establishment in semi arid agriculture. *Tanzanian Journal of Agriculture Sciences* 3 (2): 103-112.
16. Corbineau, F., and Come, D., 2006. Priming: a technique for improving seed quality. *Seed Testing International* 132: 38-40.
17. De Villiers, A. J., Van Rooyrn, M. W., Theron, G. K., and Van Deventer, H. A. 1994. Germination of three namaqualand pioneer species, as influenced by salinity, temperature and light. *Seed Sciences Technology* 22: 427-433.
18. Dogan, E., Copur, O., Kahramanb, A., Kirnak, H., and Guldur, M. E. 2011. Supplemental irrigation effect on canola yield components under semiarid climatic conditions. *Agricultural Water Management* 98: 1403-1408.
19. Farooq, M. S., Basra, M. A., Tabassum, R., and Afzal, I. 2006. Enhancing the performance of direct seeded fine rice by seed priming. *Plant Production Science* 4: 446-456.
20. Foti, S., Cosentino, S. L., Patane, C., and Dagosta, G. M. 2002. Effect of osmoconditioning upon seed germination sorghum (*Sorghom bicolor* L.) Moench under low temperatures. *Seed Science and Technology* 30: 521-533.
21. Gamiel, S., Smittle, D. A., and Mills, H. A. 1990. Onion seed size, weight, and elemental content affect germination and bulb yield. *Horticultural Science* 25 (5): 522-523.
22. Haromoto, E. R., and Gallandt, E. R. 2005. Brassica cover cropping: II. Effects on growth and interference of green bean (*Phaseolus vulgaris*) and red root pigweed (*Amaranthus retroflexus*). *Weed Science* 53 (5):702-708.
23. Havlin, J. L., Lamond, R. E., and Whitney, D. A. 1997. Improving wheat and grain sorghum profits with starter phosphorus. *Better Crops Plant Food* 71: 17-19.
24. Iqbal, M., and Ashraf, M. 2005. Presowing seed treatment with cytokinins and its effect on growth, photosynthetic rate, ionic levels and yield of two wheat cultivars differing in salt tolerance. *Journal of Integrative Plant Biology* 47: 1315-1325.
25. Izadkhah, M., Tajbakhsh, M., Zardoshty, M. R., and Hasanzadeh Goratteph, A. 2010_a. Evaluation effects of different planting systems on water use efficiency, relative water content and some plant growth parameters in onion (*Allium cepa* L.). *Notulae Scientia Biologicae* 2 (1): 88-93.
26. Izadkhah, M., Tajbakhsh, M., and Amernia. R. 2010_b. Effects of different size and age of transplanting of seedling on marketable and biological yield, harvest index and some qualitative characters of long-day and intermediate-day Onion (*Allium cepa* L.) cultivars. *Journal of Horticulturae Science* 24 (2): 203-215. (in Persian with English abstract).
27. Izadkhah Shishvan, M., Tajbakhsh Shishvan, M., Pasbaneslam, B., and Jalilian, J. 2017. Response of bulb yield per plant, chlorophyll content and photosynthetic pigments concentration of onion (*Allium cepa* L.) genotypes to priming and seed size. *Iranian Journal of Field Crop Science* 4 (47): 633-644.
28. Kanton, R. A. L., Abbey, L., Hilla, R. G., Tabil, M. A., and Jan, N. D. 2002. Influence of trasplanting age on yield and yield components of onion (*Allium cepa* L.). Haworth press, page: 27-37.
29. Kaur, S., Gupta, A. K., and Kaur, N. 2005. Seed priming increases crop yield possibly by modulating Enzymes of sucrose metabolism in chickpea *Journal of Agronomy and Crop Science* 191: 81-87.
30. Kaydan, D., and Yagmur, M. 2008. Germination, seedling growth and relative water content of shoot in different seed sizes of triticale under osmotic stress of water and NaCl. *Journal of Biotechnology* 7: 2862-2868.
31. Kebede, D. Muniye, M. 2017. Proximate composition and physicochemical properties of different released and improved onion (*Allium cepa* L.) bulbs varieties. *Food Science and Quality Management* 67: 1-7.
32. Khjawinagad, G. 2004. Response of three group maturity of soybean (*Glycine max* L.) to different irrigation and plant population densities in second cropping. Ph.D. Thesis. University of Tabriz, Iran. (in Persian with English abstract).
33. Koochehi, A., and Khalghni, J. 1996. Underdntanding crop production. Ferdowsi university press.p 536. (in Persian).

34. Kringwi, F. M., Van Ginkel, M., Terthowan, R., Sears, R. G., Rajaram, S., and Paulsen, G. M. 2004. Evaluation of selection strategies for wheat adaptation across water regimes. *Euphytica* 135: 361-371.
35. Kumar, A., and Singh, D. P. 1998. Use of physiological indices as screening technique for drought tolerance in oil seed Brassica species. *Annals of Botany* 81: 413-420.
36. Martinz, M. C., Corzo, N., and Villiamiel, M. 2007. Biological properties of onion and garlic. *Trends in Food Science Technology* 18 (12): 609-625.
37. Maskooki, A. M., Malekzadegan, F. Zamani, H., and Safa, M. Determination of physicochemical characteristics and best harvesting time of fruits to meet processing purposes. *Journal of Food Science Technology* 6 (1): 33-43.
38. Mazur, M., and Ferance, P. 1994. The effect of size and shape of seeds on stand emergence in maize. *Trnava Slovakia* 40: 179-187.
39. Moosavezadh, S. A. 2006. Study genetic diversity Iranian onion landraces using morphological and molecular, ph.D. Thesis. University of Tabriz, Iran. (in Persian with English abstract).
40. Mut, Z., Akay, H., and Nevzat, A. 2010. Effects of seed size and drought stress on germination and seedling growth of some oat genotypes (*Avena sativa* L.) *African Journal of Agricultural Research* 5 (10): 1101-1107.
41. Peltonen-Sainio, P., Kontturi, M., and Peltonen, J. 2006. Phosphorus seed coating enhancement on early growth and yield components in oat. *Agronomy Journal* 98: 206-211.
42. Rahemi, M. 1994. Postharvest. An introduction to the physiology and handling of fruit and vegetables, Book, 260pp. pub. Shiraz University.
43. Rahmati, E. 2005. The effect of the change in density on yield and yield components of hybrid sunflo tank, a Master's thesis of Agriculture, Islamic Azad University of Karaj. (in Persian with English abstract).
44. Salimi, H., Abbasdokht, H., Asghari, H. R., Gholami, A., and Rezvani Moghadam, P. 2010. The effect of priming, Rhizobium and manure fertilizer on yield and yield components of chickpea (*Cicer arietinum* L.). *Testis of Master of Science. Sanati Shahrod University*. P: 120.
45. Saremi Rad, B., Esfandiari, E. A., Shokrpour, M., Sofalian, O., Avanes, A., and Mousavi S. B. 2014 Cadmium effects on some morphological and physiological parameters in wheat at seedling stage. *Journal of Plant Researches (Iranian Journal of Biology)* 27 (1): 1-11.
46. Sarmadnia, G., and Koocheki, A. 1995. Physiological aspects of dry land farming. Mashad Jahad university publication, pp.424. (in Persian).
47. Selvarani, K., and Umarani, R. 2011. Evaluation of seed priming methods to improve seed vigour of onion (*Allium cepa* L.) cv. aggregatum and carrot (*Daucus carota*). *Journal of Agricultural Technology* 7 (3): 857-867.
48. Shekari, F., Pakmehr, A., Rastgoo, M., Vazayefi, M., and Goreishi Nasab, M. J. 2010. Effect of salicylic acid seed priming on some physiological traits of cow pea (*Vigna unguiculata* L.) under water deficit at podding stage. *Journal of Crop Ecophysiology* 4 (13): 13-29.
49. Singh, B., and Usha, K. 2003. Salicylic acid induced physiological and biochemical changes in wheat seedlings under water stress. *Plant Growth Regulation* 39: 137-141.
50. Siosemardehi, A., Ahmadi, A., Poustini, K., and Ebrahimzadeh, H. 2004. Stomatal and nonstomatal limitations to photosynthesis and their relationship with drought resistance in wheat cultivars. *Iranian Journal of Agricultural Sciences* 34 (4): 93-106. (in Persian with English Abstract).
51. Tajbakhsh, M., and Ghiyas, M. 2008. Seed ecology. Urmia Jahad university publication. pp.389. (in Persian).
52. Tuba Bicer, B. 2009. The effect of seed size on yield and yield components of chickpea and lentil. *African Journal Biotechnology* 8 (8): 1482-1487.
53. Vaez, A., Khorgamy, A., and Sayyahfar, M. 2016. The effect of nitroxin biofertilizer and foliar applicatin of micronutrients time consumption on yield and yield components of new wheat cultivars under khorramabad climatic conditions. *Iranian Journal of Field Crops Research* 13 (4): 797-809.
54. Wang, H. Y., Chen, C. L., and Sung, J. M. 2003. Both warm water soaking and soild priming treatments enhance anti - oxidation of bitter gourd seeds germinated at sub optimal temperature. *Seed Science Technology* 31: 47-56.
55. Weaich, K., Bristow, K. L., and Cass, A. 1992. Preemergent shoot growth of maize under different drying conditions. *Soil Science Society of America Journal* 56: 1272-1278.



Evaluation the Effects of Priming and Seed size on Biomass yield, Water Use Efficiency and some Ecophysiological Characteristics of Onion (*Allium cepa* L.)

M. Izadkhah shishvan^{1*}, M. Tajbakhsh shishvan²

Received: 15-03-2017

Accepted: 20-05-2019

Introduction

Seed priming is widely used for enhancing seedling performance by improving the rate and uniformity of germination and decreasing seed sensitivity to external factors. Several types of seed priming are commonly used: Hydro-priming, halo-priming, osmo-priming, thermo-priming, solid matrix-priming and bio-priming. Seed size is another factor that can affect seed germination and seedling establishment. Seed size is an important physical indicator of seed quality that affects vegetative growth and is frequently related to yield, market grade factors and harvest efficiency. The effect of seed size on germination and following seedling emergence has been investigated by many researchers in various crop species/ cultivar. In the present study, impacts of different pre-sowing treatments and seed size on biomass yield, water use efficiency and some ecophysiological characteristics of onion ecotypes in an ecological agroecosystem were investigated.

Materials and Methods

In order to investigate the effects of different pre-sowing treatments and seed size on biomass yield, water use efficiency and some ecophysiological characteristics of onion ecotypes, a field experiment was conducted in 2012-2013 cropping season at Agricultural and Natural Resources Research Center of East Azarbaijan, Iran. This experiment was a factorial experiment based on a randomized complete block design with three replications. Experiment treatments included priming at four levels: hydropriming, osmopriming (in %2 KNO₃), priming with flamin amino acid (in 2%) and control (without priming). Seed samples of the two cultivars were sieved by slotted screens and placed into three groups of seed diameter size, including small, medium, and large and ecotype at two levels, including Red Azarshahr and Zarghan. Following characteristics such as biomass yield, bulb water use efficiency, biomass water use efficiency, water consumption, relative water content, stomatal conductance in bulbing and bulb filling stage, productivity score, harvest index, growth ratio, bulb production energy value, plant received energy value, bulb production energy value were measured.

Results and Discussion

Results of field experiment showed that seed priming improved the biomass yield and ecophysiological characteristics of onion of both ecotypes. The highest biomass yield (105.98 ton.ha⁻¹), bulb water use efficiency (4.98 kg.m³), biomass water use efficiency (13.30 kg.m³), harvest index (%82) and relative water content (%86) belonged to priming with flamin amino acid, respectively and the lowest were achieved from control plants. Mean comparison indicated that the higher values of biomass yield, bulb water use efficiency, biomass water use efficiency, harvest index and relative water content were obtained from large seed size 100.33 (ton.ha⁻¹), 4.88 and 13.30 kg.m³, 80 and 85 percent, respectively and the lower level were found for small seed size. Based on the results there were significant differences between ecotypes in all studied traits. Moreover, mean comparison showed that the highest amount of biomass yield, bulb water use efficiency, biomass water use efficiency, harvest index and relative water content were obtained from Red Azarshahr ecotype 100.40 (ton.ha⁻¹), 4.80 and 13.15 kg.m³, 81 and 91 percent, respectively and the lowest of it were found to Zarghan.

Conclusions

According to the results mentioned above, seed priming treatments improved biomass yield and ecophysiological characteristics as compared to the unprimed. Among different treatments, seed priming with folammin amino acid 2% was more effective than the potassium nitrite 2% and hydropriming. Large seed size significantly increased the biological yield and ecophysiological characteristics. Accordingly, the importance of seed priming and seed grading were obvious in this study, so seed priming with flamin amino acid 2% and large seed size should be used for onion planting in order to ensure high biomass yield, and to improve ecophysiological characteristics of onion. Therefore, priming with flamin amino acid 2% and large seed are recommended for onion cultivation under the same environmental conditions with the experiment.

Keywords: Folammin, Growth ratio, Osmopriming, Productivity score

1- Former Ph.D. Student, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University

2- Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University

(*- Corresponding Author Email: ms.izadkhah@gmail.com)