

غربالگری جدایه‌های هالوتولرانت مقاوم به فلزات سنگین و تولیدکننده پپتیدهای

غیرریبوزومی



فاطمه شهرستانی^۱، شمس‌الضحی ابوالمعالی^{۲*} و شکبیا درویش علیپور آستانه^۱

^۱ ایران، سمنان، دانشگاه سمنان، گروه زیست‌فناوری

^۲ ایران، سمنان، دانشگاه سمنان، گروه زیست‌شناسی

تاریخ پذیرش: ۹۶/۱۱/۱۶

تاریخ دریافت: ۹۶/۷/۱۴

چکیده

امروزه، بشر برای حل مشکلات صنایع دارویی، غذایی و شیمیایی، به سمت طبیعت و ترکیبات فعال زیستی روی آورده است. از جمله منابع این ترکیبات، متابولیت‌های ثانویه تولید شده توسط میکروارگانیسم‌هایی است که از مناطق بسیار سخت جداسازی شده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی سویه‌های هالوتولرانت جدا شده از دریاچه حاج‌علی‌قلی‌خان با قابلیت‌های تولید متابولیت‌های ثانویه است. میکروارگانیسم‌های نمک‌دوست و تحمل‌کننده نمک مقاوم به نیکل، کادمیم، مس و کبالت از دریاچه حاج‌علی‌قلی‌خان جدا شدند. توانایی ژنتیکی این جدایه‌ها برای تولید متابولیت‌های ثانویه، با استفاده از تکثیر ژنهای *nrpS* با آغازگرهای اختصاصی *NS1/NS2*، *A3/A7* ارزیابی گردید. از غربالگری میکروارگانیسم‌های دریاچه نمک به ترتیب ۱۳، ۱۹/۵، ۴۳/۷۵ و ۳/۷ درصد جدایه‌ها از محیط‌های کشت *MH*، *MGM*، *LNSWN* و *SWN* ۲۰/۶۲ درصد از جدایه‌ها از محیط بدون نمک نوترینت آگار به دست آمد. سنجش مقاومت به فلزات در جدایه‌های غربال شده از دریاچه نشان داد که بیشترین فراوانی جدایه‌ها در مقاومت به نیکل و حساسیت به فلز کادمیم است. نتایج تکثیر ژنهای *nrpS* در جدایه‌های هالوتولرانت مقاوم به فلزات با دو جفت آغازگرهای اختصاصی ۳ تا ۷ قطعه *DNA* را نشان داد. حضور ژن *nrpS* در بین میکروارگانیسم‌های نمک‌دوست نسبی و تحمل‌کننده نمک، ارتباط مستقیم بین مقاومت به فلزات سنگین و توانایی ژنتیکی تولید متابولیت‌های ثانویه را نشان می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: فلزات سنگین، کادمیم، نیکل، هالوتولرانت، *nrpS*

* نویسنده مسئول، تلفن: ۰۲۳۳۱۵۳۳۱۹۷، پست الکترونیکی: s_abolmaali@semnan.ac.ir

مقدمه

فلزات بر سلامت انسان است (۳ و ۵). علی‌رغم سمیت فلزات سنگین برای اعصاب، کبد، استخوان برخی از این فلزات تا سطوح معینی برای رشد میکروارگانیسم‌ها ضروری بوده و در مقادیر بالاتر از آن برای سلول سمی می‌باشند. کبالت، مس، نیکل و روی در تنظیم بیان ژن و فعالیت زیست‌مولکولها، آنزیمها یا کوفاکتورهای آنزیم، نقش حیاتی دارند (۱۹).

در چند دهه اخیر حذف فلزات سمی از فاضلاب‌های صنعتی به روش‌های فیزیکی و شیمیایی تصفیه آب، اکسیداسیون و

امروزه افزایش تولید پساب‌های کارخانجات و فاضلاب‌های شهری سبب رهاسازی ترکیبات آلی و معدنی، آلودگی آب و خاک شده است. از طرف دیگر فرآیندهای طبیعی مانند سیل، زلزله، آتشفشان نیز به این آلودگی افزوده است. با توسعه فناوریها، اخیراً فلزات سنگین مس، کبالت، نیکل، کادمیم، روی و سرب به عنوان مهم‌ترین آلاینده‌های پساب شناخته شده‌اند که با روند متعارف تصفیه فاضلاب قابل حذف نمی‌باشند (۲۱). انباشت فلزات سنگین در گیاهان حاصل از خاکهای آلوده، هشدار دهنده‌ترین اثرات مضر

سازگاری در زیستگاه‌های اکولوژیکی متنوع و مقابله با تنش‌های محیطی آماده می‌کند که این امر می‌تواند از جنبه‌های صنعتی مورد توجه قرار گیرد (۵). در این موارد، اساسی‌ترین فرآیندی که سلولها در مقابله با فلزات سنگین به کار می‌برند تا به زیست‌پالایی بینجامد، هم بند کردن این کاتیونها با گروههای عاملی در سطح سلول و نیز هم بند کردن با پروتئینهای خاصی در درون سلول می‌باشد. اما تنوع ترکیبات و فلزات سمی از یک سو و تنوع میکروارگانیسمها از سوی دیگر باعث می‌شود که به روشهای دیگری نیز برای مقابله با فلزات و ترکیبات سمی در سلول توجه شود (۸ و ۱۷).

پپتیدهای پلی کتايد و پپتیدهای غیرریبوزمی دو دسته مهم از متابولیت‌های ثانویه‌ای باکتریایی هستند که در تولید فراورده‌های بیولوژیک در میکروارگانیسم و تحمل شرایط سخت محیطی نقش مهمی ایفاء می‌کنند. این دسته از پپتیدها با ساختار متنوع که حاصل فعالیت‌های آنزیمهای دستجات ژنی *nrpS* هستند، توانایی ترکیب با فلزات سنگین را دارند (۹). آنزیمهای *nrpS* ترکیبات چند آنزیمی هستند که پروتئینهای اختصاصی با طیف گسترده فعالیت‌های زیستی را از پپتیدهایی با ساختارهای متفاوت و وزن مولکولی کم، به روشی مستقل از نوکلئیک اسید می‌سازند. در این سازوکار غیرریبوزومی ساخت پپتید، ترکیباتی مانند لیوپپتیدها، دپسی‌پپتیدها و پپتیدولاکتونها از پیش‌سازهای شامل: اسیدهای چرب، آمینواسیدهای غیرپروتئینوزئیک، هیدروکسی آمینواسیدها، آمینواسیدها با نیتروژن متیله شده، شبه آمینواسیدها و D-آمینواسیدها ترکیب بندی می‌گردند (۲۳). هدف از این مطالعه بررسی توانایی میکروارگانیسمهای مقاوم به فلزات سنگین نیکل، کبالت، کادمیم و مس غربال شده از دریاچه نمک حاج‌علی‌قلی‌خان برای تولید محصولات ژنهای *nrpS* بود. در این مطالعه میکروارگانیسمهای مقاوم به فلزات سنگین با توانایی تولید محصولات ژنهای *nrpS* معرفی شدند.

احیاء، رسوب شیمیایی، فیلتراسیون، روش الکتروشیمیایی، تبخیر، تبادل یونی و اسمز معکوس صورت گرفته است. نیاز به محلولهای قوی و حذف یونهای فلزی غیر قابل پیش‌بینی، برخی از معایب این روشها هستند. علاوه بر این، استفاده از محلولهای قوی برای پاکسازی فلزات سنگین، باعث آلودگی ثانویه محیط زیست می‌گردد (۱۳). زیست‌پالایی با کمک میکروارگانیسمها می‌تواند به طور مؤثری باعث کاهش فلزات سنگین در محیط زیست گردد (۱۵). توانایی میکروارگانیسمها برای حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی، به ویژه در محدوده کمتر از ۱ تا ۱۰۰ میلی‌گرم، روش زیست‌پالایی را از دیگر روشهای پالایش متمایز می‌نماید (۲). در دهه اخیر، تحقیقات زیادی بر روی معرفی میکروارگانیسمهای توانا با توجه به دو ویژگی زیست‌پالایی و زیست‌سازگاری انجام گرفته و با توجه به همین خصوصیت مطالعات بسیاری بر روی میانکنش میکروارگانیسمها با فلزات سمی در حال انجام است (۱۹). در سال ۲۰۱۴ محمدزاده و همکاران در یک مطالعه توصیفی، از خاک آلوده به لجن فاضلاب مزارع مجاور تصفیه‌خانه غرب اهواز نمونه برداری کرده و باکتریهای مقاوم به کادمیم و نیکل را جداسازی و میزان تجمع زیستی و جذب زیستی نیکل و کادمیم توسط این باکتریها را مورد مطالعه قرار دادند (۱۸). در این مطالعه باکتریهای جداسازی شده به جنسهای *Bacillus*، *Staphylococcus* و *Actinomycete* تعلق داشتند که از این میان *Actinomycete* بیشترین مقدار تجمع زیستی را برای هر دو فلز نشان داد. در غلظتهای کمتر، مقدار تجمع زیستی کادمیم و نیکل بیشتر از جذب زیستی و در سطوح آلودگی بالا مقدار جذب زیستی بیشتر بود. در هر دو روش زیست‌پالایی، باکتریها توانایی بیشتری برای پالایش کادمیم نسبت به نیکل نشان دادند (۱۸).

با توجه به اینکه میکروارگانیسمها تنوع زیادی در واکنشهای متابولیکی دارند مسیرهای متابولیت ثانویه و فراورده‌های تولید شده در میکروارگانیسمها، آنها را برای

مواد و روشها

نمونه برداری: نمونه برداری از نواحی مختلف جنوب غربی دریاچه نمک حاج علی قلی خان سمنان (موقعیت جغرافیایی N3550 تا N3600 و E5426 تا E5454) به صورت تصادفی انجام گرفت. نمونه‌ها شامل خاک، آب و نمک دریاچه بود که در محل نمونه برداری کدگذاری و در شرایط استریل به آزمایشگاه منتقل و برای کشت آماده شدند.

جداسازی میکروارگانیسمها: از نمونه‌های خاک و نمک، ۱ گرم به ۱۰ میلی لیتر سرم فیزیولوژی و از نمونه آب دریاچه ۱ میلی لیتر به ۹ میلی لیتر سرم فیزیولوژی اضافه شد. نمونه های خاک، آب و نمک، در سری رقت های شامل 10^{-1} ، 10^{-2} ، 10^{-3} هر یک به صورت جداگانه به مدت دو ساعت در ۲۰۰ دور در دقیقه گرماگذاری گردید. از مایع رویی آنها در محیط کشت نوترینت براث (مرک) با ۳، ۷، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد کلرید سدیم (مرک) و محیطهای کشت (SWN) Sea water Nutrient Agar (۱۰)، (MH) Moderate halophilic medium (۱۶)، (LNSWN) Low (nutrient Modified halophilic medium) (MGM) Medium Modified Growth (۲۴) به ترتیب با ۲، ۱۰، ۲۰ و ۲۳ درصد کلرید سدیم کشت انجام و در فواصل زمانی ۲۴ ساعت، ۷۲ ساعت و ۱۴ روز پس از انجام کشت اولیه، با روش کشت چهار مرحله‌ای، جداسازی و خالص شدند. جدایه‌های خالص شده در گلیسرول ۲۰ درصد و در فریزر -70°C درجه سلیسیوس نگهداری شدند.

شناسایی جدایه‌ها بر اساس ویژگیهای ریخت شناسی و بیوشیمیایی: بعد از خالص سازی میکروارگانیسمها، شناسایی هر یک از آنها بر روی محیط کشت جداسازی شده، بر اساس ویژگیهای ماکروسکوپی شامل اندازه کلنی، شکل ظاهری، رنگ، سطح، حاشیه و جنس کلنی انجام گرفت. در مرحله بعد شناسایی بر اساس ویژگیهای میکروسکوپی شامل شکل میکروارگانیسم (میله‌ای، کروی، مارپیچی)، اندازه، نحوه قرار گرفتن میکروارگانیسمها در

روی لام (مجتمع یا پراکنده و شکل اجتماع آنها)، نوع واکنش به رنگ آمیزی گرم، وجود اسپور، محل و شکل اسپور انجام شد. با آزمونهای حرکت، کاتالاز و اکسیداز، برخی از ویژگیهای بیوشیمیایی جدایه‌ها تعیین گردید. در بررسی فعالیت کاتالازی جدایه‌ها، از پراکسید هیدروژن ۳ درصد و کشت جامد تازه میکروارگانیسم و برای بررسی فعالیت اکسیدازی، از محلول ۱ درصد تترامتیل پارافنیلن دی آمین دی هیدروکلراید استفاده شد (۱۰).

غربالگری بر اساس میزان تحمل نمک کلرید سدیم: برای تعیین هالوفیل یا هالتولرانت بودن میکروارگانیسمها، هر یک از جدایه‌ها بر روی محیط با درصد کلرید سدیم کمتر یا بیشتر نسبت به محیط جداسازی خود، کشت شدند؛ بدین ترتیب که جدایه‌های حاصل از محیط MGM (۲۳ درصد کلرید سدیم) روی محیط SWN (۲ درصد کلرید سدیم) و برعکس و جدایه‌های حاصل از محیط MH (۱۰ درصد کلرید سدیم) روی هر دو محیط مذکور کشت گردیدند.

غربالگری بر اساس مقاومت به فلز با روشهای لکه گذاری در محیط جامد و میکروپلیت: میکروارگانیسمهای مقاوم به ۱۰ درصد تا ۲۳ درصد کلرید سدیم (۲۱ جدایه حاصل از جداسازی از محیط کشتهای MGM و MH) به منظور بررسی مقاومت به فلزات سنگین، $\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ، $\text{CdCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ، $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ، $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ انتخاب گردیدند.

برای سنجش مقاومت جدایه‌ها به فلزات با روش لکه گذاری، (۱) محیط کشت MH حاوی فلزات نیکل، مس، کبالت و کادمیم، با غلظتهای ۰/۵، ۱، ۲، ۳، ۵، ۷ و صفر میلی مولار تهیه شد. سپس با استفاده از رقتهای 10^{-3} و 10^{-6} ۱۰ نیم مک فارلند هر باکتری در محیط MH لکه گذاری به صورت نقطه‌ای انجام گرفت. پلیتها به مدت ۳۶ ساعت در دمای 37°C درجه سلیسیوس گرماگذاری شدند.

واکنش شامل ۱ نانوگرم DNA الگو، بافر IX، mM (۲-)، $MgCl_2$ (۱/۵)، dNTP (۰/۲۵) mM، و Taq Polymerase (جدول ۱) و ۱ واحد آنزیم در حجم نهایی ۲۵ میکرولیتر بود. واسرشتگی اولیه در دمای ۹۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵ دقیقه با کمک دستگاه ترموسایکلر مدل Labcycler (SensoQuesT) انجام شد. تکثیر در ۳۵ چرخه شامل: واسرشتگی در دمای ۹۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ ثانیه، جفت‌شدگی در دمای ۵۶-۴۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۰ ثانیه و طولی سازی در دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱ دقیقه انجام گرفت. مرحله طولی شدن نهایی نیز در دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۰ دقیقه انجام شد. در نهایت محصول واکنش زنجیره‌ای پلیمرز به روش الکتروفورز با استفاده از ژل آگارز ۰/۸ درصد بررسی گردید. شرایط واکنش زنجیره‌ای پلیمرز با کمک غلظت‌های متفاوت $MgCl_2$ شامل ۱/۵، ۱/۸ و ۲ میلی‌مولار و دماهای جفت‌شدگی ۴۷، ۵۱، ۵۳، ۵۵، ۵۷ درجه سانتی‌گراد در هر مورد بهینه‌سازی گردید.

جدول ۱- مشخصات پرایمر مورد استفاده

Primer ID	Genes	Sequence (5'-3')	Annealing (°c) temp (°C)	Ref
A3	nrpS	GCSTACSYSATSTACACSTCSGG	۶۰	(۴)
A7	nrpS	SASGTCVCCSGTSCGGTAS		
NS1	nrpS	CAACCCCTATGCCTTTTGAA	۵۲-۶۴	(۲۷)
NS2	nrpS	TAAACAACCCATGCTCCACA		

گردید. زمان رشد میکروارگانیسمها در محیط‌های LNSWN، SWN و NA ۱-۲ روز، در محیط MH بین ۲-۳ روز و در محیط MGM بین ۲ تا ۱۰ روز بود.

مشاهدات ماکروسکوپی جدایه‌های غربال شده نشان داد که کلنی‌ها رنگ‌های بی‌رنگ، شیری، مایل به قهوه‌ای و صورتی مایل به قرمز داشتند. پیگمان قرمز اغلب در جدایه‌های حاصل از محیط MGM مشاهده شده است و اندازه کلنی‌ها از بسیار کوچک (با قطر حدود ۱ میلی‌متر) تا بزرگ (قطر

در روش (۲) در هر چاهک از میکروپلیت، ۲۰۰ میکرولیتر محیط کشت MH حاوی غلظت‌های mM ۰/۵، ۱، ۳/۱۲، ۶/۲۵، ۱۲/۵، ۲۵، ۵۰ اضافه گردید. ۲۰ میکرولیتررتت OD از 10^{-1} نیم مک‌فارلند جدایه‌های حاصل از محیط کشت MGM و محیط کشت MH، به محیط مایع تلقیح شدند. در این روش، فلز و محیط کشت بدون میکروارگانیسم، به عنوان شاهد منفی و محیط کشت حاوی میکروارگانیسم بدون فلز به عنوان شاهد مثبت در نظر گرفته شدند. میکروپلیتها حاوی هر جدایه به مدت ۳۶ ساعت در دمای ۳۷ درجه سلیسیوس گرماگذاری شدند(۱).

استخراج DNA ژنومی و بررسی وجود ژن nrpS به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمرز: استخراج DNA از جدایه‌ها با استفاده از کیت DNP TM KIT از شرکت سیناژن طبق روش ارائه شده در کیت انجام شد. DNA استخراج شده با تیمار RNase A خالص گردید. بررسی وجود ژن nrpS به وسیله واکنش زنجیره‌ای پلیمرز و با کمک آغازگرهای اختصاصی (جدول ۱) انجام شد. اجزا

آنالیز داده‌ها: تجزیه و تحلیل آماری، نتایج این پژوهش با کمک نرم افزار SPSS22 انجام گرفته و میزان $p < 0/05$ به عنوان تفاوت آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج

جداسازی میکروارگانیسمها: از محیط کشت MGM، ۲۰ جدایه؛ MH، ۳۱ جدایه؛ SWN، ۷۰ جدایه؛ LNSWN، ۶ جدایه و NA بدون کلریدسديم ۳۳ جدایه خالص سازی


نشان دادند (اکسیداز قوی) و در ۱۰ درصد دیگر، رنگ کلنیا کمی مایل به بنفش دیده شد (اکسیداز ضعیف). در مورد سویه‌های جدا شده از محیط کشت MH، ۴۲ درصد میکروارگانیسمها در پاسخ به معرف اکسیداز تغییر رنگ ندادند (اکسیداز منفی)، ۶ درصد سویه‌ها دارای اکسیداز قوی و در ۵۲ درصد رنگ کلنی‌ها کمی مایل به بنفش شد (اکسیداز مثبت).

بررسی مقاومت به فلز جدایه‌ها: در سنجش مقاومت به فلز تمامی جدایه‌های محیط MGM که از نظر مورفولوژی و خصوصیت بیوشیمیایی یکسان نبودند، بررسی شدند. نتایج نشان داد که در روش میکروپلیت، بیشترین مقاومت را نسبت به فلز نیکل و بیشترین حساسیت را نسبت به فلز کادمیم نشان دادند. بیشترین غلظتی که میکروارگانیسمها در آن رشد کردند برای فلز نیکل ۶ mM و برای فلزات کبالت، کادمیم و مس به ترتیب ۳، ۰/۵ mM و ۰/۵ mM بود. همان‌طور که در تصویر ۱ مشاهده می‌شود، در این روش تعداد میکروارگانیسمهایی که در غلظت ۰/۵ mM فلز مس رشد کردند بیشتر از کادمیم بود (تصویر ۱).

حدود ۱ سانتیمتر) متغیر بود. شکل کلنیاها به صورت دایره ای با حاشیه منظم / غیرمنظم، ریزوئیدی / جوانه‌دار، سطوح کلنی برجسته صاف / چروکیده، سطوح فرورفته بود. قوام کلنی‌ها حالت‌های متفاوت جامد، سفت، لزج و کشسان داشت.

ویژگی‌های ریخت‌شناسی جدایه‌ها: براساس نتایج بررسی‌های میکروسکوپی حدود ۹۰ درصد جدایه‌ها باسیل گرم مثبت و ۱۰ درصد باقیمانده شامل باسیلهای گرم منفی، کوکسی‌های گرم مثبت، گرم منفی و *Actinomycete* بودند. حدود ۵ درصد جدایه‌ها دارای اسپور (مرکزی، انتهایی و نیم انتها) با اندازه بزرگتر از سلول و برخی نیز هم‌اندازه سلول بودند.

۲۰ درصد سویه‌های جدا شده از محیط کشت MGM، کاتالاز منفی و ۸۰ درصد کاتالاز مثبت بودند. همه میکروارگانیسم‌های جدا شده از محیط کشت MH کاتالاز مثبت بودند. ۱۰ درصد سویه‌های جدا شده از محیط کشت MGM، با افزودن محلول آزمون اکسیداز، تغییر رنگ نشان ندادند. ۸۰ درصد سویه‌ها تغییر رنگ شدید به بنفش را




تصویر ۱- نتایج بررسی مقاومت به فلزات نیکل، کبالت، مس و کادمیم به روش میکروپلیت. جدایه‌ها حداکثر ۶ mM فلز نیکل، ۳ mM فلز کبالت، ۰/۵ mM مس و کادمیم را تحمل کردند. برای وضوح بهتر تصویر شناسه جدایه‌ها فقط با شماره و بدون شاخص کلکسیون؛ DDBCC. نشان داده شده است.


مولار، ۵ درصد جدایه‌ها ۱ میلی‌مولار، ۵ درصد جدایه‌ها ۰/۵ میلی‌مولار از فلز نیکل و ۲۰ درصد جدایه‌ها هیچ غلظتی از فلز را تحمل نکردند. در بررسی مشابه نسبت به

بررسی مقاومت جدایه‌های هالتولرانت نسبت به فلز نیکل با روش لکه‌گذاری در محیط جامد نشان داد که ۱۰ درصد جدایه‌ها حداکثر ۳ میلی‌مولار، ۳۰ درصد جدایه‌ها ۲ میلی-

فلز نیکل، کبالت، مس و حساس به کادمیم و یک جدایه حساس به فلزات کبالت، مس و کادمیم و نسبتاً مقاوم به نیکل، در تصویر ۲ نشان داده شده است. جدایه شماره ۱۵۱ روی محیط کشت حاوی فلزات نیکل و کبالت تا حدود ۳ میلی‌مولار رشد ضعیفی داشت. این جدایه حداکثر روی ۲ میلی‌مولار مس رشد داشت اما قادر به رشد بر روی محیط کشت حاوی کادمیم نبود. جدایه شماره ۱۱ فقط بر روی محیط حاوی ۲ میلی‌مولار نیکل رشد کرد. رشدی از این جدایه بر روی محیط‌های دارای ۰/۵ و یا ۱ میلی‌مولار کبالت، مس، کادمیم مشاهده نشد.




فلز کبالت، ۲۵ درصد جدایه‌ها غلظت ۳ میلی‌مولار، ۵ درصد جدایه‌ها غلظت ۲ میلی‌مولار، ۲۵ درصد جدایه‌ها غلظت ۱ میلی‌مولار، ۱۰ درصد جدایه غلظت ۰/۵ میلی‌مولار، ۵ درصد جدایه‌ها نسبت به فلز کبالت حساس بودند. این در حالی است که این جدایه‌ها نسبت به فلز کادمیم در هیچ غلظتی رشد نداشتند ولی نسبت به فلز مس، ۲۵ درصد جدایه‌ها غلظت ۲ میلی‌مولار، ۲۵ درصد جدایه‌ها غلظت ۱ میلی‌مولار، ۲۰ درصد جدایه‌ها غلظت صفر را تحمل کردند و ۳۰ درصد سویه‌ها عدم رشد را نشان دادند. نتیجه این آزمایش برای یک جدایه مقاوم به



تصویر ۲- نتایج غربالگری جدایه‌ها به روش لکه گذاری، (الف) جدایه ۱۵۱ مقاوم نسبت به فلزات نیکل، کبالت و مس؛ (ب) جدایه ۱۱ نسبتاً مقاوم به نیکل و حساس به کبالت، مس و کادمیم.

تا ۱۵۰۰ جفت بازی را در جدایه‌های ۵، ۱۱، ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۸، ۱۴۴ و ۱۵۱ نشان داد. در اغلب جدایه‌ها قطعه DNA بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ جفت بازی ظاهر گردید (تصویر ۳).

نتایج بررسی وجود ژن *nrpS* با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمرز: تکثیر با کمک آغازگرهای NS1 و NS2 و دمای جفت شدگی ۵۰ درجه سانتی‌گراد و غلظت منبزمیم ۲ میلی‌مولار، وجود قطعات ژنی با اندازه بین ۴۰۰



تصویر ۳- نتایج تکثیر ژنهای *nrpS* (الف) با استفاده از جفت آغازگرهای A3/A7؛ (ب) با استفاده از جفت آغازگرهای NS1/NS2. مسیرها با شماره جدایه‌ها مشخص گردیده‌اند. مسیر M نردبان مولکولی ۵۰ bp.

در پژوهش حاضر، در غربالگری میکروارگانیسم‌های دریاچه حاج‌علی‌قلی‌خان به ترتیب (۲۰ جدایه) ۱۳ درصد، (۳۱ جدایه) ۱۹/۵ درصد، (۷۰ جدایه) ۴۳/۷۵ درصد و (۶ جدایه) ۳/۷ درصد جدایه‌ها از محیط‌های کشت MGM، LNSWN، SWN، MH و (۳۳ جدایه) ۲۰/۶۲ درصد از جدایه‌ها از محیط بدون نمک نوترینت آگار به دست آمد، در مجموع ۱۶۰ جدایه رشد کردند که با حذف جدایه‌های مشابه از نظر خصوصیت مورفولوژی و بیوشیمیایی در نهایت ۲۱ جدایه برای مراحل بعدی آزمایش انتخاب گردید. جدایه‌های مذکور از دو نوع میکروارگانیسم باکتری و قارچ بودند. بیشترین فراوانی مربوط به باکتریها است، که در گروه باسیلهای گرم مثبت قرار می‌گیرد. مشابه این نتیجه در بررسی میکروارگانیسم‌های دریاچه آران و بیدگل و دریاچه ارومیه نیز به دست آمده است. در بررسی تنوع زیستی میکروارگانیسم‌های نمک‌دوست و تحمل‌کننده نمک توسط آموزگار و همکاران، از ۲۱۷ جدایه، ۱۲۰ جدایه باسیل گرم مثبت، ۴۸ جدایه باسیل گرم منفی و بقیه کوکسی گرم مثبت بودند (۱۱ و ۱۶). در بررسی باکتریهای سخت‌زی تالاب گمیشان توسط شاهین‌پی و همکاران (۱۳۹۲)، نیز از بین ۲۲۴ باکتری جداسازی شده، باسیلهای گرم مثبت با ۱۳۱ جدایه بیشترین فراوانی را داشتند. باسیل گرم منفی با ۵۴ جدایه، اشکال خمیده گرم منفی با ۳۲ جدایه و کوکوسهای گرم مثبت با ۷ جدایه به ترتیب در رتبه‌های بعد قرار داشتند (۲۲).

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میکروارگانیسم‌های هالوتولرانت جداشده از محیط‌های ۱۰ و ۲۳ درصد نمک به دلیل توانایی تحمل محیط‌های سخت توانستند نسبت به فلزات سنگین مقاومت بیشتری نشان دهند. در صورتی که میکروارگانیسم‌های جداشده از محیط ۲ درصد نمک و یا کمتر چنین ویژگی را بروز ندادند. سنجش مقاومت به فلزات در جدایه‌های غربال شده از دریاچه نمک حاج‌علی‌قلی‌خان نشان داد که جدایه‌ها در مقاومت به نیکل و حساسیت به فلز کادمیم، بیشترین فراوانی را دارند.

براساس نتایج تیمارهای بهینه‌سازی شرایط واکنش زنجیره ای پلیمرز با استفاده از غلظتهای ۲ mM، ۱/۸ و ۱/۵ از $MgCl_2$ بیشترین تعداد قطعات DNA در شرایط $MgCl_2$ ۲mM مشاهده گردید. تیمار $MgCl_2$ ۲mM تغییر دمای جفت‌شدگی از ۴۷ درجه سانتی‌گراد تا ۵۳ درجه سانتی‌گراد تأثیری بر تعداد قطعات DNA به دست آمده نداشت.

بحث و نتیجه‌گیری

میکروارگانیسم‌های قابل کشت دریاچه نمک سمنان در مقایسه با جامعه میکربی سهم کمتری را شامل می‌شود. این پژوهش بر روی گروه‌های قابل کشت انجام شده و پیش از این نیز پژوهشی بر روی میکروارگانیسم‌های غیرقابل کشت این دریاچه انجام نگرفته است. ابعاد مورد مطالعه در پژوهش‌های بوم‌شناختی به بازده تعداد میکروارگانیسم‌های غربال شده از روش‌های کشت، اندازه‌های فیزیکی میکروارگانیسم‌ها، گستردگی فضاهای مورد بررسی و نیز تعداد نمونه برداری وابسته است. به همین دلیل در میکروبی شناسی در روش‌های مستقل از کشت، تنوع گونه‌های شناسایی شده مورد بحث است، و نسبت دادن آن به تنوع موجود و جامعه اصلی میکربی از نظر آماری صحیح نمی‌باشد (۲۶).

دریاچه نمک حاج‌علی‌قلی‌خان سمنان از نظر موقعیت جغرافیایی در جنوب شرقی شهر دامغان واقع شده است ۲۳۹۱ کیلومتر مربع مساحت و بین ۱۰۵۰ تا ۱۰۹۴ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. آنالیز نمونه‌های خاک آن وجود یونهای سدیم و کلر و آلودگیهای فلزی از قبیل کادمیم؛ نیکل و سرب را تأیید کرده است. بنابراین غربالگری مقاومت فلزی کادمیم و نیکل در این پژوهش انتخاب شدند. اگرچه به دلیل شرایط سخت در بوم این ناحیه تعداد باکتریها و تنوع آنها به ازای هر گرم خاک کاهش داشته است، بخش اعظم میکروارگانیسم‌های این ناحیه به جنس‌های مقاوم باکتریایی از جمله *Bacillus sp* و سپس *Actinomycete* شباهت دارند.

برای توانایی میکروارگانیسم در تولید ترکیبات ثانویه و احتمالاً "مقاومت نسبت به فلزات سنگین مورد مطالعه قرار گرفت. برای ارزیابی حضور ژن *nrpS* در بین میکروارگانیسم‌های نمک دوست نسبی و تحمل‌کننده نمک، غربال شده از دریاچه نمک حاج‌علی‌قلی‌خان، دو جفت آغازگر (۲۷) NS1/NS2 و A3F/A7R استفاده شد (۴). این آغازگرها هردو مربوط به نواحی حفاظت شده دمین A هستند (۱۲). انتخاب این دو جفت آغازگر با هدف شناسایی تعداد بیشتری از این ژنها در تعداد زیادتری از میکروارگانیسم‌های جدا شده از دریاچه نمک انجام گرفت. تنوع قطعات DNA حاصل از تکثیر ژنهای *nrpS* در پژوهش‌های انجام شده توسط ساکیدو و همکاران (۴) و ایرن‌قایش و همکاران (۶) نشان داده است که قطعات ۹۰۰ تا ۱۰۰۰، ۷۰۰ و ۸۰۰ جفت بازی با استفاده از آغازگرهای A3/A7، MTR/MTF2، از ژنوم *Cyanobacteria* و *Actinomycetes* تکثیر یافته‌اند. در این پژوهش که با استفاده از آغازگرهای اختصاصی NS1/NS2 برای بررسی حضور ژنهای *nrpS* انجام گرفت، نتایج نشان داد که جدایه‌هایی که می‌توانستند غلظت بالاتری از فلزات سمی را تحمل کنند، تعداد قطعات تکثیر یافته بیشتری داشتند.

در تأیید این نتایج، بررسی نوردن‌جل بر روی *Actinomycetes* نشان داد تعداد قطعات DNA ظاهر شده در واکنش تکثیر ژنهای *nrpS*، با تعداد ترکیبات ظاهر شده نسبت مستقیم دارد (۲۰). اما نوع متابولیت‌های ثانویه بسته به نوع باکتری و محل زیست آن متفاوت و متنوع است که نوع و عملکرد این ترکیبات ثانویه بایستی با آزمایشات شیمیایی و زیستی مختلف تعیین گردد. تعداد قطعات DNA حاصل از تکثیر ژنهای *nrpS* می‌تواند مؤید حضور آنزیم‌های مختلف در این گروه باشد که هر یک نقشی در تکمیل ساخت متابولیت ثانویه دارند، لذا تعداد بیشتر قطعات DNA نمایانگر تعداد بیشتر آنزیم و تعداد بیشتر آنزیم مؤید ساخت تعداد ترکیبات ثانویه بیشتر است (۲۰).

بعد از نیکل بیشترین مقاومت مربوط به فلز کبالت و سپس مس بود. اگر فراوانی رشد جدایه‌ها در غلظت‌های مختلف شاخص مناسبی برای تعیین حساسیت و مقاومت به فلز در میکروارگانیسم‌ها باشد، با مقایسه درصد فراوانی رشد جدایه‌ها در غلظت ۱ میلی مولار و بیشتر فلزات نیکل، کبالت، مس و کادمیم می‌توان نتیجه گرفت که میکروارگانیسم‌های جدا شده از محیط کشت MH بیشترین مقاومت را به فلزات نیکل و کبالت و بیشترین حساسیت را به فلزات کادمیم و مس نشان داده‌اند. مشابه نتایج فوق توسط گابالا و همکاران در سال ۲۰۰۳ به دست آمد. مطابق آزمایشات گابالا با استفاده از پنج فلز Cd, Cu, Zn, Ni و Co و در شیب غلظتی ۰/۵ تا ۱۰ میلی مولار بر روی ۲۲ گونه؛ بیشترین مقاومت نسبت به فلز نیکل، بیشترین سمیت نسبت به فلز کادمیم بود و تقریباً ۵۰ درصد گونه‌ها به کادمیم حساس بودند (۷).

در پژوهشی که توسط خدابخش و همکاران انجام شد، مقاومت باکتری نمک دوست *Salinivibrio costicola* جدا شده از دریاچه آران و بیدگل نسبت به فلزات سنگین نیکل، کبالت، مس، کادمیم، سرب، نقره و روی سنجیده شد (۱۴). باکتری *Salinivibrio costicola* بیشترین مقاومت را به ترتیب نسبت به فلزات نیکل (۱۱ mM)، کبالت (۸ mM)، سرب (۸ mM)، مس (۲ mM)، کادمیم (۰/۵ mM)، روی (۰/۱ mM) و نقره (۰/۰۵ mM) نشان داد. در مورد ترتیب مقاومت به فلزات نیکل، کبالت، مس و کادمیم نتایج، مشابه پژوهش حاضر است (۱۴).

با توصیف این نکته که پپتیدهای غیرریبوزومی، جزء متابولیت‌های ثانویه میکروارگانیسم‌ها به شمار می‌آیند و از نظر ساختار و عملکرد بسیار متنوع هستند (۲۵)، شواهد نشان می‌دهد که تولید متابولیت‌های ثانویه پاسخی به تنش‌های محیطی از جمله تنش فلزات سنگین می‌باشد (۹). در این پژوهش تنوع کمی و کیفی ژن *nrpS* مسئول رمزگذاری آنزیم سنتزکننده پپتیدهای غیرریبوزومی به عنوان شاخصی

مقاومت نسبت به فلزات سنگین مورد استفاده قرار گرفت. حضور ژن nrpS در بین میکروارگانیسمهای نمک دوست نسبی و تحمل‌کننده نمک، ارتباط مستقیم بین مقاومت به فلزات سنگین و توانایی ژنتیکی تولید متابولیت‌های ثانویه را نشان می‌دهد. به بیان جزئی‌تر، می‌توان از این میکروارگانیسمهای هالوتولرانت مقاوم به فلزات سنگین برای اهداف زیست‌پالایی بهره برد، در حالی که آنها به عنوان یک مزرعه تولید متابولیت‌های ثانویه هم کاربرد دارند.

تشکر و قدردانی

این پژوهش با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه سمنان انجام شد. از آقای دکتر علیرضا اصغری برای همکاری در بررسی جذب اتمی انجام شده در دانشکده شیمی پردیس علوم پایه، دانشگاه سمنان قدردانی می‌شود.

بررسیهای مولکولی و غربالگری مقاومت به فلزات سنگین در این پژوهش نشان داد که بین توانایی ژنتیکی تولید پپتیدهای غیرریبوزومی و مقاومت به فلزات سنگین ارتباط مستقیم وجود دارد.

نتایج این پژوهش نشان داد که میکروارگانیسمهای هالوتولرانت جدا شده از محیط‌های MH و MGM نسبت به فلزات سنگین در محیط مقاومت بیشتری داشتند. بنابراین می‌توان حضور فلزات سنگین، را نیز عامل القای ژنهای خاموش مربوط به ساخت متابولیت‌های ثانویه دانست. با توجه به اینکه پپتیدهای غیرریبوزومی، جزء متابولیت‌های ثانویه در میکروارگانیسمها به شمار می‌آیند و از نظر ساختار و عملکرد متنوع هستند. در این پژوهش تنوع ژن nrpS مسئول رمزگذاری آنزیم سنتزکننده پپتیدهای غیرریبوزومی، به عنوان شاخص برای توانایی میکروارگانیسمها در تولید ترکیبات ثانویه و احتمالاً

منابع

- 1- Abolmaali S, Mitterbauer R, Spadiut O, Peruci M, Weindorfer H, Lucyshyn D, Ellersdorfer G, Lemmens M, Moll W-D, Adam G (2008) Engineered bakers yeast as a sensitive bioassay indicator organism for the trichothecene toxin deoxynivalenol. *Journal of Microbiological Methods* 72:306-312.
- 2- Ahluwalia SS, Goyal D (2007) Microbial and plant derived biomass for removal of heavy metals from wastewater. *Bioresource technology* 98:2243-2257.
- 3- Alinezhadian A, Mohammadi J, Karimi A, Nikookhah F (2014) Effect of municipal effluent irrigation on accumulation of indicator bacteria and some of heavy metal in soil and plant. *Journal of molecular and cellular research (Iranian journal of biology)* 26:508-523.
- 4- Ayuso-Sacido A, Genilloud O (2005) New PCR primers for the screening of NRPS and PKS-I systems in actinomycetes: detection and distribution of these biosynthetic gene sequences in major taxonomic groups. *Microbial ecology* 49:10-24.
- 5- Dixit R, Malaviya D, Pandiyan K, Singh UB, Sahu A, Shukla R, Singh BP, Rai JP, Sharma PK, Lade H (2015) Bioremediation of heavy metals from soil and aquatic environment: an overview of principles and criteria of fundamental processes. *Sustainability* 7:2189-2212.
- 6- Ehrenreich IM, Waterbury JB, Webb EA (2005) Distribution and diversity of natural product genes in marine and freshwater cyanobacterial cultures and genomes. *Applied and environmental microbiology* 71:7401-7413.
- 7- Gaballa A, Amer A, Hussein H, Moawad H, Sabry H (2003) Heavy metals resistance pattern of moderately halophytic bacteria. *Arab Journal of Biotechnology* 6:267-278.
- 8- Garbisu C, Alkorta I (2001) Phytoextraction: a cost-effective plant-based technology for the removal of metals from the environment. *Bioresource technology* 77:229-236.
- 9- Haferburg G, Groth I, Möllmann U, Kothe E, Sattler I (2009) Arousing sleeping genes: shifts in secondary metabolism of metal tolerant actinobacteria under conditions of heavy metal stress. *Biometals* 22:225-234.
- 10- Jookar KF, Owlia P, Amoozegar M, Yakhchali B (2014) Culturable prokaryotic diversity of urmia salt lake. *Modern genetics journal (MGJ)* 9:313-328.

- 11- Kafilzadeh F, Chittaei M (2014) Investigation of Growth Rate, Resistance, and Zinc Elimination Ability of Resistant Bacteria Isolated from Water and Sediment of Karun River. *Journal of Health* 5:103-114.
- 12- Kafilzadeh F, Javid H, Kargar M (2007) Isolation of halophilic and halotolerant microorganisms from the Bakhtegan lake and the effect of physicochemical factors on their frequency. *Water and Wastewater* 18:81-87.
- 13- Kapoor A, Viraraghavan T (1995) Fungal biosorption—an alternative treatment option for heavy metal bearing wastewaters: a review. *Bioresource Technology* 53:195-206.
- 14- Khodabakhsh F, Nazeri S, Amoozegar MA, Khodakaramian GR (2011) Isolation of a moderately halophilic bacterium resistant to some toxic metals from Aran & Bidgol Salt Lake and its phylogenetic characterization by 16S rDNA gene. *Feyz Journals of Kashan University of Medical Sciences* 15:50-57.
- 15- Khosravan A, Amini J, Sarsalary S, Rohanian E (2009) Comparison of biosorption of heavy metal zinc by four different microbial biomass (Activated sludge) in industrial waste water in order to biological refinement *JMW* 2:23-30.
- 16- Mehrshad M, Amoozegar M, Yakhchali B, Shahzade-Fazeli S (2012) Biodiversity of moderately halophilic and halotolerant bacteria in the western coastal line of Urmia Lake. *Biol. J. Microorg* 1:49-70.
- 17- Mejáre M, Bülow L (2001) Metal-binding proteins and peptides in bioremediation and phytoremediation of heavy metals. *TRENDS in Biotechnology* 19:67-73.
- 18- Mohammadzadeh KR, Chorom M, Motamedi H, Mohabat A (2014) Biosorption and bioaccumulation of Cd and Ni in competitive solution by three bacteria isolated from polluted soils to sewage sludge. *Journal of microbial world* 7:241-251.
- 19- Mosa KA, Saadoun I, Kumar K, Helmy M, Dhankher OP (2016 Mar 15) Potential Biotechnological Strategies for the Cleanup of Heavy Metals and Metalloids. *Frontiers in plant science* 7.
- 20- Nordenfjäll E (2014) Isolation of antibiotic producing microorganisms by screening for antibiotic resistance. In: NL, NJ) > Dept. of Microbiology. NK002 Biotechnology - Bachelor's Programme 180 HEC.
- 21- Rajendran P, Muthukrishnan J, Gunasekaran P (2003) Microbes in heavy metal remediation. *Indian journal of experimental biology* 41:935-944.
- 22- Shahinpei A, Amoozegar MA, Akhavan SA (2013) Isolation and identification of poly-extremophilic alkalophilic, halophilic and halotolerant bacteria from alkaline thalassohaline gomishan wetland. *Journal of taxonomy and biosystematics* 5:79-100.
- 23- Strieker M, Tanović A, Marahiel MA (2010) Nonribosomal peptide synthetases: structures and dynamics. *Current opinion in structural biology* 20:234-240.
- 24- Vreeland RH (2012) *Advances in Understanding the Biology of Halophilic Microorganisms*. Springer.
- 25- Williams GJ (2013) Engineering polyketide synthases and nonribosomal peptide synthetases. *Current opinion in structural biology* 23:603-612.
- 26- Zarparvar P, Amoozegar MA, Fallahian MR (2014) Diversity of culturable Moderate halophilic and Halotolerant Bacteria in Incheh Boroun hyper saline wetland in Iran. *Journal of Cellular and Molecular Researches* 27:44-56.
- 27- Zhang W, Li Z, Miao X, Zhang F (2009) The screening of antimicrobial bacteria with diverse novel nonribosomal peptide synthetase (NRPS) genes from South China Sea sponges. *Marine biotechnology* 11:346-355.

Screening heavy metal resistant halotolerant strains producing non-ribosomal peptides

Shahrestani F.¹, Abolmaali Sh.Z.², Darvish Alipour Astaneh Sh.¹

¹ Dept. of Biology, Semnan University, Semnan, I.R.of Iran

² Dept of Biotechnology, Semnan University, Semnan, I.R.of Iran

Abstract

Today, secondary metabolites from microorganisms have been used to improve food, pharmaceutical and chemical industries. Extremophile microorganisms are one of the resources for the secondary metabolites. The heavy metal resistant halotolerants were isolated from Haj AliGholi Khan Salt Lake. The potential of the isolates for producing secondary metabolites were molecularly investigated by amplification of *nrpS* genes with specific primers A3/A7 and NS1/NS2. In the screening of Haj AliGholi Khan Lake microorganisms; 13% of isolates from MGM, 19.5% from MH, 43.75% from SWN, 3.7% from LNSWN and 20.62% from normal Nutrient agar were obtained. The halotolerants were highly resistant against Ni and highly susceptible to Cd. Three to 7 PCR products were identified from optimized PCR reaction of *nrpS* genes of heavy metal resistant halotolerant with specific primers. Existence of *nrpS* genes among halotolerant and semi-halophile microorganisms from Haj AliGholi Khan Salt Lake revealed a direct relation between heavy metal resistance and genetic potential for producing secondary metabolites.

Key words: Cadmium, Halotolerant, Heavy metal, Nickel, *nrpS*