

A Methodological Review of Development and Assessment of Behavioral Models of Depression in Rats

Fahime Zavvari^{1,2}, Fariba Karimzadeh^{3*}

¹Shefa Neuroscience Research Center, Khatam Alanbia Hospital, Tehran, Iran

²Department of Physiology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

³Cellular and Molecular Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Article Info:

Received: 24 Dec 2015

Accepted: 1 Feb 2016

ABSTRACT

Introduction: Depression is a chronic, multifactorial, and potentially life-threatening mental disorder that affects up to 20% of the worldwide population. Over several decades, numerous animal models have been established to study the underlying pathophysiology of depression and to test novel antidepressant treatment strategies. The criteria for identifying animal models of depression based on two principles: the side effects of antidepressants and responses to stress. Here, we summarized depression animal models, including learned helplessness, chronic mild stress, social defeat paradigms, and early life stress. Also, we reviewed the behavioral tests for screening antidepressants, such as forced swimming test, tail suspension test, sucrose preference test, open field test, elevated plus maze test, novelty-induced hypophagia, intracranial self-stimulation, and dark/light box test. **Conclusion:** The complexity of the depression and its etiologic as well as pathophysiological similarities with anxiety disorders challenge the developing of a comprehensive animal model that accurately reflect different aspects of depression. However, these animal models could so far help in a better understanding of the pathophysiology of depression.

Key words:

1. Depression
2. Animals
3. Rats

* Corresponding Author: Fariba Karimzadeh

E-mail: Fariba_karimzade@yahoo.com

مروری بر روش‌های ایجاد و ارزیابی مدل‌های رفتاری افسردگی در موش‌های صحرایی

فهیمه زواری^{۱،۲}، فریبا کریم‌زاده^{۳*}

^۱ مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیاء، تهران، ایران

^۲ گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

^۳ مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

اطلاعات مقاله:

تاریخ پذیرش: ۱۲ بهمن ۱۳۹۴

تاریخ دریافت: ۳ دی ۱۳۹۴

چکیده

مقدمه: افسردگی یک اختلال روانی مزمن، چند عاملی و به طور بالقوه تهدید کننده زندگی است که بیش از ۲۰ درصد جمعیت دنیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بیش از چندین دهه مدل‌های حیوانی متعددی برای مطالعه اصولی پاتوفیزیولوژی افسردگی و برای آزمایش راهبردهای درمانی جدید ضد افسردگی ایجاد شده است. معیار برای شناسایی مدل‌های حیوانی افسردگی مبتنی بر دو اصل است: عوارض جانبی ضد افسردگی و پاسخ‌ها به استرس. در اینجا ما مدل‌های حیوانی افسردگی، از جمله درماندگی آموخته شده، استرس مزمن ملایم، نمونه‌های شکست اجتماعی و استرس اوایل زندگی را خلاصه کردیم. همچنین ما آزمون‌های رفتاری برای غربالگری ضد افسردگی از قبیل آزمون شناختی اجرایی، آزمون آویزان کردن از دم، آزمون ترجیح سوکروز، آزمون زمینه باز، آزمون پلاس ماز مرتفع، هایپوفازی ناشی از تازگی، خود تحریکی داخل مغزی و آزمون جعبه روشن و تاریک را بررسی می‌کنیم. **نتیجه‌گیری:** پیچیدگی افسردگی و سبب‌شناسی آن و نیز تشابهات پاتوفیزیولوژی با اختلالات اضطراب، ایجاد یک مدل حیوانی جامع که به درستی جنبه‌های متفاوت افسردگی را منعکس می‌کند به چالش می‌کشد. با این حال این مدل‌های حیوانی تاکنون توانسته‌اند در درک بهتر پاتوفیزیولوژی افسردگی کمک کنند.

کلید واژه‌ها:

۱. افسردگی
۲. حیوانات
۳. موش‌های صحرایی

* نویسنده مسئول: فریبا کریم‌زاده

آدرس الکترونیکی: Fariba_karimzade@yahoo.com

افسردگی یک اختلال شایع روانی پیچیده، چندعاملي، هتروژن و اغلب مزمن است که تقریباً ۱۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان از آن رنج می‌برند^(۱). این بیماری با ایجاد مشکلات عاطفی، رفتاری و جسمی موجب مختل شدن زندگی فرد بیمار می‌گردد. طبق گزارش انتیتو ملی سلامت روانی آمریکا، افرادی که دچار اختلال افسردگی هستند، علایم و نشانه‌های یکسانی ندارند. از علایم شایع افسردگی می‌توان به بی‌حوالگی، ناتوانی از لذت بردن، احساس نامیدی، گوشه‌گیری اجتماعی و احساس بی‌ارزش بودن، اختلال در تمکر و ناتوانی در تصمیم گیری اشاره کرد. همچنین اختلالات خواب (بی‌خوابی، خواب زیاد یا ناراحت)، اختلالات خوردن (بی‌اشتهای یا پرخوری)، یبوست، از دست دادن میل جنسی، دردهای مختلف مانند سردرد و درد قفسه سینه (بدون شواهدی از بیماری جسمی)، یکباره به گریه افتادن بدون توضیح مشخص، احساس گناه شدید به خاطر وقایع بی‌اهمیت یا خیالی، تحریک‌پذیری، بی‌قراری و در نهایت در صورت عدم درمان، اقدام به خودکشی از دیگر عوارض ابتلا به افسردگی می‌باشد^(۲).

معمولًاً دلیل ابتلا به افسردگی، ترکیبی از عوامل ژنتیکی، جسمی، محیطی و روانی می‌باشد. علاوه بر اختلالات ژنی و عادات ارشی، بعضی از عوامل زیست‌شناختی مانند بیماری‌های جسمی، اختلالات هورمونی، اختلالات ناقلين عصبی^(۳) و مصرف بعضی داروها می‌توانند در بروز افسردگی نقش داشته باشند. در این میان تعداد وقایع استرس‌زا و ناراحت‌کننده زندگی فردی و اجتماعی نیز نقش بهسازیابی در بروز افسردگی دارد. داشتن زندگی چالش برانگیز و نگرانی‌ها و فشارهای روحی و روانی مداوم، سلامت ذهنی و روانی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در نهایت او را افسرده می‌کنند^(۴).

علی‌رغم تحقیقات گسترده انجام شده، فرایندهای نوروپیولوژیکی که منجر به افسردگی می‌شوند هنوز به خوبی شناخته نشده‌اند. در طی سالیان، جهت روش شدن پاتوفیزیولوژی زمینه‌ساز افسردگی و آزمودن راهبردهای^(۵) درمانی ضد افسردگی جدید، مدل‌های جانوری زیادی ایجاد شده‌اند که در این میان می‌توان مدل‌های ژنتیکی، اپتوژنیکی، مدل‌های مبتنی بر اصلاح نژاد انتخابی، مدل‌های فارماکولوژیکی و ایجاد مدل افسردگی با قطع پیاز بویایی^(۶) و یا اختلال در ریتم سیرکادین را نام برد. همچنین مدل‌های جانوری مبتنی بر قرار گرفتن در معرض استرس از پرکاربردترین مدل‌های مورد استفاده در تحقیقات افسردگی هستند^(۷). در این مقاله به بررسی روش‌های ایجاد افسردگی مبتنی بر استرس پرداخته و سپس چگونگی ارزیابی افسردگی در مدل‌های حیوانی را مرور می‌کیم.

استرس شکست اجتماعی

از نقطه نظر بیولوژیکی به نظر می‌رسد که محیط اجتماعی یک منبع قابل ملاحظه استرس است. یافته‌های محققان نشان

می‌دهند وقایع استرس‌زای زندگی همانند: قرار گرفتن در محیط جدید و یا از دست دادن مقام و موقعیت اجتماعی، با افزایش احتمال ابتلاء به افسردگی همراه می‌باشد. مبتنی بر این عقیده، مدل‌های جانوری جدید با استفاده از ایجاد آشفتگی اجتماعی به عنوان عامل استرس‌زا ایجاد شد^(۸).

الگوی مقیم -متجاوز^(۹) که مخصوص جوندگان می‌باشد، معمول‌ترین مدل استرس شکست اجتماعی^(۱۰) است و از کشمکش اجتماعی بین اعضای یک گونه استفاده می‌کند تا در حیوان استرس روانی ایجاد کند. در این مجموعه آزمایشی ابتدا حیوانات آزمایشگاهی (که معمولاً از موش‌های صحرایی استفاده می‌شود) به مدت یک هفته به صورت انفرادی، دوتایی یا گروهی در یک قفس نگهداری می‌شوند تا قلمروشان مشخص شود. سپس یک موش نر (موش متجاوز) در قفس موش دیگری (موش مقیم) گذاشته می‌شود و به حیوانات اجازه داده می‌شود برای مدت از پیش تعیین شده‌ای با یکدیگر بجنگند و در این میان به ناچار یکی از آن‌ها به شدت دچار ضرب و جرح می‌شود. موش پیروز به عنوان غالب و موش شکست خورده به عنوان تابع در نظر گرفته می‌شود.

برای ایجاد مدل استرس حاد به حیوانات اجازه داده می‌شود تنها در یک وهله بجنگند. اما اگر به آن‌ها فرصت داده شود که در موارد متعدد متواالی در طی روزها یا هفته‌ها با هم بجنگند مدل استرس مزمن ایجاد می‌شود. در بعضی مدل‌ها، موش متجاوز به قفسی منتقل می‌شود که در آن فقط یک موش نر مقیم است، در حالی که در موارد دیگر به قفسی منتقل می‌شود که در آن علاوه بر موش مقیم نر، موش ماده‌ای نیز ساکن است. در همه مجموعه‌ها موش متجاوز به سرعت مورد حمله قرار گرفته و تحت انقیاد موش مقیم در می‌آید. موش تابع ممکن است به فرم تهدید در معرض استرس مزمن قرار گیرد. در این مدل، از قفسی با دو محفظه جداگانه که توسط درب کشویی سوراخ دار از جنس پلی اتیلن از هم جدا شده‌اند، استفاده می‌شود. با باز کردن درب کشویی به موش‌ها فرصت داده می‌شود یکبار با هم بجنگند و بعد، مدت‌ها موش تابع در محفظه کناری موش غالب نگه داشته می‌شود. به این ترتیب موش تابع برای مدت طولانی در معرض سیگنال‌های روانی استرس‌زا که توسط موش غالب ساطع می‌شود مانند: بو، صدا و دیدن موش غالب قرار می‌گیرد، بدون اینکه صدمه‌فیزیکی را تجربه کند^(۱۱).

در این مدل آزمایشگاهی نمی‌توان از موش‌های ماده استفاده کرد زیرا موش‌های ماده برای حفظ قلمرو در الگوی شکست اجتماعی مقیم -متجاوز با یکدیگر نمی‌جنگند^(۱۲). البته مطالعات اخیر توضیح داده‌اند که در صورتی از موش‌های ماده در مدل شکست اجتماعی می‌توان استفاده کرد که موش ماده مقیم پیر یا در دوران شیردهی باشد^(۱۳). لازم به ذکر می‌باشد که در این مدل، زمان القاء استرس مهم است. دیده شده موش‌هایی که در فاز فعل زندگی هستند هنگامی که در معرض استرس اجتماعی قرار می‌گیرند علاوه پاتوفیزیولوژیکی بیشتری

^۱ Neurotransmitters

^۲ Strategies

^۳ Olfactory bulbectomy

شناخت

(۱۳). درماندگی آموخته یکی از اولین مدل‌هایی است که توسط مارتین سلیگمن و همکاران برای القای افسردگی در حیوانات به کار گرفته شد و بدین وسیله روشی برای مطالعه اثر استرس غیرقابل کنترل مهیا کردند (۱۴).

طرح آزمایشی کلاسیک این مدل شامل سه گروه می‌باشد که دو گروه آن کنترل است. گروه اول کنترل، تحت استرس با شوک الکتریکی قرار می‌گیرند که قابل کنترل با فرار کردن یا فشار دادن اهرمی است که جریان الکتریکی را قطع می‌کند. گروه دوم همان شوک را مشابه گروه اول دریافت می‌کند با این تفاوت که شوک آن‌ها غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل کنترل است. گروه سوم (گروه دوم کنترل) با استرسی مواجهه شوند. در نهایت می‌توان گروه موش‌های مواجهه با استرس غیرقابل کنترل را با موش‌های بدون استرس و موش‌های مواجه با استرس قابل کنترل مقایسه کرد. به طور کلی می‌توان گفت موش‌هایی که مدتی تحت استرس غیرقابل کنترل قرار می‌گیرند تلاشی برای فرار یا ممانعت از استرس نمی‌کنند. در این مدل، اختلال افسردگی که در پی قرار گرفتن در معرض استرس ایجاد می‌شود به واسطه خود استرس زمینه‌بندی باشد بلکه غیرقابل کنترل بودن استرس وارد شده عامل تعیین کننده می‌باشد (۱۵).

مدل‌های مبتنی بر استرس اوایل زندگی

این مدل بر مبنای مشاهداتی است که نشان می‌دهند تجربیات و حوادث ناگوار در دوران بحرانی تکامل (اوایل زندگی) سبب افزایش استعداد ابتلا به برخی بیماری‌ها در طول زندگی است. در دهه‌های اخیر مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان داده‌اند که فاکتورهای محیطی در دوران قبل از تولد (جنینی) و یا بعد از تولد (نوزادی/کودکی) تأثیر بهسازی در ایجاد بیماری‌های روانی/عصیی همچون افسردگی دارد. تجربیات ناخوشایند در اوایل زندگی همچون از دست دادن پدر و مادر، بدرفتاری و کمبودهای عاطفی، ریسک ابتلا به اختلالات خلقی در دوران بعدی زندگی را افزایش می‌دهند.

مدل‌های مبتنی بر استرس اوایل زندگی ابتدا در جوندگان و پریمات‌ها ایجاد شد. جدایی از مادر یکی از معمول‌ترین روش‌ها برای ایجاد این مدل می‌باشد. جدایی تکرارشونده یا منفرد بچه موش‌ها از مادرشان منجر به اختلالات رفتاری و فیزیولوژیک می‌شود. اثرات سوء در جدایی تکرارشونده کمتر از محرومیت کامل است. چرا که نوزاد در مدل تکرارشونده در ساعتی از وجود مادر بهره‌مند است و علاوه بر آن در زمانی که نوزاد در کنار مادرش قرار داده می‌شود مراقبت‌های مادری افزایش می‌یابد (۱۶).

یکی دیگر از روش‌های اخیر در القای استرس اوایل زندگی، محدود کردن مواد آشیانه و بستر موش‌ها می‌باشد. در بچه موش‌های این مدل با تغییر در سیستم هیپوپotalاموس-هیپوفیز-آدرنال، سطح کورتیزول افزایش یافته و همچنین حافظه و یادگیری مرتبط با هیپوکامپ مختل می‌گردد (۱۷، ۱۸).

نسبت به موش‌هایی نشان می‌دهند که در زمان غیرفعال زندگی در معرض این استرس قرار گرفته‌اند (۱۰).

استرس خفیف مزمن

استرس خفیف مزمن (CMS)^۹ یکی از معتبرترین و واقع بینانه‌ترین مدل‌های ایجاد افسردگی است که بر روی علامت اصلی افسردگی یعنی عدم لذت بردن^{۱۰} تمکن می‌کند (۱۱). در این روش حیوانات به شکل غیرقابل پیش‌بینی در معرض یک سری از عوامل استرس‌زای^{۱۱} ملایم قرار می‌گیرند.

کتز و هرش^۹ اولین کسانی بودند که مدل استرس مزمن را ایجاد کردند. این محققان از عوامل استرس‌زای شدیدی چون شوک الکتریکی، استرس تکان دادن، شنا در آب سرد و فشردن دم استفاده کردند. بر اساس نتایج آن‌ها بعد از القاء استرس، سطح کورتیکواسترون افزایش یافت و از طرفی کاهش تمایل به خوردن سوکروز، که نشان‌دهنده اختلال در لذت بردن و کاهش حساسیت به پاداش می‌باشد، ایجاد شد (۲). بر اساس این تحقیقات، ویلنر^{۱۰} برای دستیابی به شرایط واقعی‌تر القایی از عوامل استرس‌زای ملایم‌تر در مدت زمان طولانی‌تر استفاده کرد، بنابراین مدل استرس مزمن ملایم ویلنر که عوامل استرس‌زایی زندگی انسانی را بهتر از مدل کتز تقلید می‌کرد جایگزین مدل کتز شد.

از جمله این عوامل استرس‌زا می‌توان مدت ابزوله کردن حیوان، نگهداری حیوان همراه با تعداد زیادی حیوان دیگر در یک قفس، محرومیت از آب یا غذا، اختلال در سیکل تاریکی/اروشنایی، کج کردن قفس، مرطوب کردن بستر قفس و غیره را نام برد. زمان مواجهه با عوامل استرس‌زا از حداقل دو هفته تا چند ماه می‌باشد. مزیت روش استرس مزمن ملایم این است که تغییرات بلندمدت در پارامترهای رفتاری، نوروشیمیایی، نوروایمیون و نورواندکرین در نمونه‌ها ایجاد می‌کند که شبیه اختلالات مشاهده شده در بیماران مبتلا به افسردگی می‌باشد (۱۱). نکته مهم‌تر اینکه در این روش عدم لذت بردن ایجاد می‌شود و از آنجایی که عوامل استرس‌زا غیرقابل پیش‌بینی می‌باشند و مرتباً شکل آن‌ها عوض می‌شود حیوان نمی‌تواند به آن‌ها خو گرفته و سازگاری پیدا کند. اختلال در حساسیت به پاداش ایجاد شده می‌تواند توسط مصرف مزمن (نه حاد) داروهای ضد افسردگی بهبود یابد. برای ارزیابی این مدل از آزمون مصرف سوکروز استفاده می‌شود که در ادامه بحث خواهد شد.

درماندگی آموخته

درماندگی و احساس درمانده بودن یکی از علایم اصلی افسردگی است. درماندگی آموخته (LH)^{۱۲} در انسان‌های افسرده بیانگر یک نقص رفتاری در کنترل محرک‌های آزاردهنده است که در مواجهه با محرک‌های آزاردهنده غیرقابل کنترل القاء می‌شود. به عبارت بهتر شخص افسرده برای خروج از شرایط ناگوار زندگی هیچ تلاشی نمی‌کند چرا که تلاش‌های قبلی او ناکام بوده‌اند و او یاد گرفته است که باید تسليم عوامل ناخوشایند زندگی باشد

⁶ Chronic mild stress

⁷ Anhedonia

⁸ Stressors

⁹ Katz and Hersh

¹⁰ Willner


¹¹ Learned helplessness

ارزیابی پاسخ‌های رفتاری مانند فعالیت حرکتی، بیش فعالی و رفتار جستجوگرانه و همچنین اندازه‌گیری اضطراب نیز استفاده شده است (۲۲). از آنجایی که در افسردگی میزان حرکت فرد کاهش می‌یابد از این آزمون برای ارزیابی میزان افسردگی استفاده می‌شود.

برای انجام این آزمون از یک جعبه رو باز که کف آن توسط خطوطی به چندین مربع مساوی تقسیم‌بندی شده استفاده می‌شود. جنس، ابعاد، شکل و رنگ دستگاه و نیز تعداد تقسیم‌بندی‌های کف آن، بسته به پروتکل به کار رفته متفاوت می‌باشد. به عنوان مثال تعداد مربع‌های کف جعبه می‌تواند از ۹ تا ۲۵ مربع متفاوت باشد. پنهانه این جعبه به دو ناحیه محیط و مرکز تقسیم می‌شود. به طور مثال: در تقسیم‌بندی ۲۵ تایی، ۹ مربع وسط به عنوان ناحیه مرکزی و مربع‌های باقی مانده به عنوان نواحی حاشیه‌ای در نظر گرفته شده و با رنگی متفاوت، مشخص می‌شوند. حرکت و محل موش توسط دوربین دیجیتالی که در بالای جعبه تعییه شده ردگیری و ثبت، و توسط نرم‌افزار مربوطه محاسبه و آنالیز می‌شود (تصویر ۲) (۲۳).

برای انجام آزمون، حیوان را به آرامی و به صورت تصادفی در یکی از چهار گوشه دستگاه قرار داده و اجازه می‌دهند تا محیط دستگاه را آزادانه به مدت ۵ دقیقه کاوش کند. در طول این مدت، رفتار موش از طریق دوربین قبل مشاهده است. بعد از انجام آزمون، موش‌ها به قفسه‌هایشان منتقل شده و کف و دیوارهای دستگاه هر بار توسط پنجه آغشته به الكل ۷۰٪ برای جلوگیری از اثرات بوی بر جای مانده از حیوان قبلی تمیز شده و اجازه داده می‌شود در بین هر آزمون خشک شود. طی ۲ روز متوالی این آزمون را تکرار کرده و میزان عبور از خطوط را ثبت و امتیازدهی می‌کنند.

افزایش در زمان گذرانده شده و تعداد ورود به مرکز می‌تواند به عنوان یک اثر شبه ضد اضطرابی محسوب شود، همچنین ورود به مربعات مرکزی بهمنظور ارزیابی رفتار جستجوگرانه استفاده می‌شود. کل مسافت طی شده و سرعت میانگین به عنوان ساختاری از فعالیت حرکتی در نظر گرفته می‌شوند (۲۴، ۲۵).



تصویر ۲- آزمون زمینه باز (۲۳).

¹² Forced swimming test

¹³ Floating

¹⁴ Immobility behavior

¹⁵ Immobility time

روش‌های ارزیابی افسردگی آزمون شنای اجباری

آزمون شنای اجباری (FST)^{۱۲} یکی از معترضترین و رایج‌ترین آزمون‌ها جهت بررسی افسردگی در جوندگان است. بر اساس نظریه درماندگی آموخته شده مارتین سلیگمن در صورتی که حیوان در معرض استرس مداوم قرار گیرد و راه گریزی از آن نداشته باشد، رفته رفته امید به گریز را از دست داده و تحرک و فعالیت خود را متوقف می‌کند و درمانده و بی‌حرکت می‌گردد. روش آزمایش به این صورت است که ظرفی استوانه‌ای از جنس شیشه‌آکریلیک به قطر ۴۵ و ارتفاع ۷۹ سانتی‌متر تا ارتفاع ۳۰ سانتی‌متر از آب ۲۳-۲۴ درجه سانتیگراد پر شده و حیوان به آرامی در آن قرار داده می‌شود. زمان این آزمون ۵ دقیقه می‌باشد و رفتار موش در این مدت ثبت می‌شود. به طور قراردادی قطع حرکات دست و پای موش و شناور شدن آن^{۱۳} را به عنوان بی‌حرکت^{۱۴} و مدت آن را به عنوان زمان بی‌حرکتی^{۱۵} در نظر می‌گیرند. ۲۴ ساعت قبل از انجام آزمون جهت کسب تجربه^{۱۶} شنا کردن اجباری، حیوان به مدت ۱۵ دقیقه در آب قرار داده می‌شود (تصویر ۱)-(۱۹).

همان‌طور که ذکر شد این آزمون بازتاب دهنده یک مرحله از یأس رفتاری در افسردگی می‌باشد، به گونه‌ای که موش‌های افسردگی که امید کمتری دارند مدت زمان بی‌تحرکی بیشتری نسبت به گروه کنترل نشان می‌دهند. تحقیقات نشان داده که استفاده از داروهای ضد افسردگی مدت زمان بی‌حرکتی را کاهش می‌دهد (۲۰).

لازم به ذکر است که بر اساس پروتکل مورد استفاده برای انجام این آزمون، ابعاد ظرف شیشه‌ای، حجم آب و نیز دمای آب می‌تواند متفاوت باشد.

آزمون زمینه باز

آزمون زمینه باز^{۱۷} ابتدا توسط هال^{۱۸} جهت ارزیابی احساسات و هیجان جوندگان پیشنهاد شد (۲۱). اما این آزمون برای



تصویر ۱- آزمون شنای اجباری. چپ: موش در حال تلاش و شنا کردن. راست: موش شناور و بی‌حرکت (۱۹).

¹⁶ Train

¹⁷ Open field test

¹⁸ Hall

¹⁹ Tail suspension test

شناخت

مدت برای پیشگیری از احتمال خطا در آزمون جای ظرف آب و سوکروز هر ۱۲ ساعت تعویض می‌شود. بطری‌ها در ابتدا و انتهای هر دوره ۸ ساعته وزن می‌شوند تا میزان مصرف از آن‌ها محاسبه شود و در پایان چهارمین روز، نسبت سوکروز به کل حجم مصرفی سنجیده می‌شود. موش‌هایی که در معرض استرس ملایم مزمن قرار می‌گیرند، بعد از استرس هفتگی به مدت چند هفته، تمایل کمتری برای مصرف سوکروز دارند.



تصویر ۴- آزمون ترجیح سوکروز (۲۸).

اگر مواجهه با استرس قطع شود مصرف سوکروز پس از مدتی نرمال می‌شود. اما اگر استرس به شکل مزمن اعمال شود ممکن است ماهها نیز در این شرایط (عدم لذت) بمانند. این روش یکی از مهمترین روش‌ها برای تشخیص افسردگی به دنبال استرس ملایم مزمن می‌باشد (۴، ۲۹).

لازم به ذکر است درصد سوکروز در محلول و مدت زمان انجام آزمون با توجه به پروتکل مورد استفاده می‌تواند متفاوت باشد.

خود تحریکی داخل مغزی


در سال ۱۹۵۴، آزمایش‌های میلنر و اولدز^{۲۳} نشان داد مراکزی در مغز وجود دارد که برای اعمال پاداشی تخصص یافته‌اند. در این آزمایش‌ها، تحریک الکتریکی مناطق ویژه‌ای از مغز باعث افزایش رفتار خود تحریکی می‌شد. از آن پس، مطالعاتی که با استفاده از خود تحریکی داخل مغزی (ICSS)^{۲۴} صورت گرفته، نشان داده است که مسیرهای سیستم پاداشی مغز وسیع هستند، به طوری که رفتار خود تحریکی را می‌توان با قرار دادن الکترود در مناطق مختلف مغز مانند هیپوپotalamus، ناحیه تگمنتوم شکمی (VTA)^{۲۵}، هسته اکومبنس (NAC)^{۲۶}، قشر سینگولاًی قدامی، آمیگدال، هیپوکامپ، قشر پیشانی، لوکوس سرلکوس و دستهٔ پیش مغز میانی ایجاد نمود (۳۰). در روش خود تحریکی داخل مغزی، حیوان یاد می‌گیرد که با تحریک نواحی مربوط به پاداش، توسط الکترودهای تعبیه شده در داخل مغزش، مسیرهای مربوطه را فعال کند.

تحت عمل استرئوتاکسی^{۲۷} الکترودهای دوقطبی از جنس فولاد

آزمون آویزان کردن از دم

آزمون آویزان کردن از دم (TST)^{۱۹} توسط محقق ایتالیایی به نام استرو^{۲۰} برای اندازه‌گیری تمایل به نالمیدی ابداع شد. در این روش موش را در اتاقکی از دم آویزان می‌کنند (تصویر ۳)-۲۶. معمولاً بعد از آویزان شدن، موش‌های سالم برای فرار و غلبه بر موقعیت ناراحت خود، شروع به تلاش و دست و پا زدن می‌کنند و به مدت حداقل ۱۰ تا ۳۰ دقیقه دوره‌هایی از تلاش و متعاقباً عدم تحرک خواهند داشت.

هر چه موش افسرده‌تر باشد تلاش کمتری برای فرار از حالت تعليق خواهد داشت و در نتيجه بيشتر بی حرکت است به طوری که موش‌های افسرده بعد از حدود ۲ تا ۴ دقیقه دست از تلاش بر می‌دارند. در مدت آزمایش که حدود ۶ دقیقه می‌باشد، میزان بی حرکتی موش ثبت می‌شود. استفاده از داروهای ضد افسردگی پیش از انجام آزمون، می‌تواند بر افزایش تلاش موش تأثیر بهسازی داشته باشد (۲۷).



تصویر ۳- آزمون آویزان کردن از دم (۲۶).

آزمون ترجیح سوکروز

رفتار عدم لذت بردن که در افراد افسرده ایجاد می‌شود با آزمون ترجیح سوکروز^{۲۱} ارزیابی می‌شود. برای انجام این آزمون از دو ظرف، یکی محتوی آب و دیگری محتوی سوکروز ۲ درصد استفاده می‌شود (تصویر ۴)-۲۸. جهت کاهش دادن پاسخ استرسی به شرایط جدید، ۲۴ ساعت قبل از انجام آزمون به مدت ۳ ساعت به موش اجازه داده می‌شود به طور آزادانه بین دو بطری یکی را برای نوشیدن انتخاب کند. بعد از خو گرفتن به محیط^{۲۲}، مدت زمان آزمون ۴ روز، روزی ۸ ساعت می‌باشد. در مدت آزمون، موش می‌تواند آزادانه یکی از بطری‌ها (آب یا محلول سوکروز) را برای نوشیدن انتخاب کند. در طی این

²⁰ Steru

²¹ Sucrose preference test

²² Habituation

²³ Milner and Olds

²⁴ Intracranial self-stimulation

²⁵ Ventral tegmental area

²⁶ Nucleus accumbens

²⁷ Stereotaxy

آزمون ماز مرتفع به علاوه شکل

آزمون ماز مرتفع به علاوه شکل (EPM)^{۲۹} برای ارزیابی رفتارهای مرتبط با اضطراب در مدل‌های جانوری با اختلالات سیستم عصبی مرکزی استفاده می‌شود. دستگاه ماز مرتفع به علاوه شکل از یک ماز به شکل به علاوه تشکیل شده که در ارتفاعی بالاتر از یک کف زمین قرار دارد. این ماز دارای چهار بازو و یک ناحیه مرکزی است که دو بازوی آن باز و دو بازوی دیگر بسته می‌باشد (تصویر ۶). حیوان را به مدت ۵ دقیقه داخل ماز می‌گذارند به طوری که می‌تواند آزادانه بازوهای آن را جستجو کند. رفتار حیوان مورد آزمایش توسط یک دوربین فیلمبرداری که در بالای دستگاه نصب شده است ثبت و توسط سیستم رדיابی ویدئویی آنالیز می‌شود.

در پایان آزمون، در صد میزان زمانی که حیوان در بازوها باز طی می‌کند نسبت به زمانی که در بازوها بسته می‌گذارند محاسبه می‌شود. حیوانات مضطرب ترجیح می‌دهند بیشتر در بازوها بسته بمانند و زمان کمتری را به جستجو در بازوها بیان می‌پردازند (۳۷).




تصویر ۶- دستگاه پلاس ماز مرتفع (۳۶).

آزمون جعبه روشن و تاریک

آزمون جعبه روشن و تاریک^{۳۰} مبتنی بر خصوصیت ذاتی جوندگان در گریز از مناطق روشن و همچنین جستجوگری ذاتی آنان می‌باشد. جعبه روشن/تاریک شامل دو محفظه از جنس پلاکسی گلاس می‌باشد که توسط توپل کوچکی به هم وصل شده‌اند. یکی از محفظه‌ها به رنگ سیاه و کاملاً تاریک و دیگری به رنگ سفید و روشن می‌باشد (تصویر ۷). ابتدا موش در محفظه تاریک قرار داده می‌شود و از آنجا می‌تواند وارد محفظه روشن شده و آن را بازدید کند. میزان تأخیر در اولین ورود به محفظه روشن، زمان کلی که حیوان در محفظه روشن می‌گذراند و تعداد ورودش به محفظه روشن، در طی مشاهده به مدت ۵ دقیقه ثبت می‌شود. موش‌های سالم با حس

ضد زنگ به صورت یکطرفه در ناحیه تگمنتال شکمی (یا نواحی دیگر پاداش) قرار داده شده و با سیمان دندانپزشکی به استخوان جمجمه ثابت می‌شوند. الکترودها به یک دستگاه استیمولاتور با جریان ثابت وصل می‌شوند. طی یک دوره حدود ۲ تا ۳ هفته‌ای حیوانات یاد می‌گیرند که با فشردن بینی به یک ناحیه و یا با چرخاندن یک اهرم می‌توانند حس لذت را تجربه کنند. بعد از پایان دوره آموزش، ثبت داده‌ها انجام می‌شود (تصویر ۸).

از آنجایی که افسردگی کاهش انگیزه، خستگی و کاهش انرژی را به دنبال دارد، موجب کاهش تمایل موش به تحریک الکترود و تجربه حس لذت می‌شود. این آزمون روشی مغاید برای بررسی تأثیر داروهای ضد افسردگی می‌باشد (۳۲).



تصویر ۵- خود تحریکی داخل مغزی (۳۱).

آزمون هایپوفازی ناشی از تازگی

آزمون هایپوفازی ناشی از تازگی^{۳۱} برای ارزیابی میزان اضطراب و هیجانات در حیوانات استفاده می‌شود. تحقیقات نشان داده است اختلالات اضطرابی و افسردگی کاملاً وابسته به هم هستند و میزان هم‌زمان بودن بالایی دارند به طوری که لاقل در ۶۰٪ از افراد افسرده یک یا چند اختلال اضطرابی گزارش شده است. همچنین شواهد متعددی نشان می‌دهند که افسردگی و اختلالات اضطرابی ریسک فاکتورهای ژنتیکی مشترکی دارند، بنابراین ممکن نیست ساختارهای کاملاً متفاوتی در انسان و یا حیوانات نشان دهند (۳۳، ۳۴).

از این رو این آزمون در تحقیقات مربوط به افسردگی نیز استفاده می‌شود. هایپوفازی به معنای کاهش تمایل به غذای ناشی از تازگی است و تحت تأثیر عوامل مختلف مانند غذای جدید، محیط آزمون جدید و یا ظرف غذای جدید برانگیخته می‌شود. در این آزمون حیوانات با شرایطی روپرو می‌شوند که باید بین مصرف غذای مورد علاقه‌شان در شرایط جدید و یا اجتناب از این شرایط انتخاب کنند. موش‌های مضطرب و افسرده نسبت به غذای موجود در ظرف غذای جدید و یا غذای موجود در محیط جدید بی تفاوت هستند. در این آزمون تأخیر و میزان مصرف غذا در شرایط جدید بررسی می‌شود (۳۵). محققان دریافتند که مصرف مزمن داروهای ضد افسردگی می‌تواند موجب کاهش هایپوفازی شود.

²⁸ Novelty-induced hypophagia test

²⁹ Elevated plus maze test

³⁰ Dark/light box

شناخت

بالای افسردگی و تشابهات سبب‌شناسی^{۳۲} و پاتوفیزیولوژی زیادی که با اختلالات اضطرابی دارد شناس موقتی در ایجاد مدل‌های حیوانی جامع که به درستی تأثیرات نسبی فاکتورهای دخیل در ایجاد افسردگی انسان را منعکس کنند ضعیف به نظر می‌رسد. اما به هر حال همین مدل‌های حیوانی توانسته‌اند تاکنون کمک شایانی در بهتر فهمیدن پاتولوژی زمینه این بیماری داشته باشند. همچنین مدل‌های حیوانی که به درمان با داروهای ضد افسردگی پاسخ می‌دهند برای مطالعه مکانیسم‌های عصبی درگیر در پاسخ به این داروها مفید می‌باشند. امروزه استفاده از مدل‌های حیوانی افسردگی، امید به درمان و یا پیشگیری از این بیماری را افزایش داده است. مدل‌های حیوانی باید از لحاظ عالیم، علل ایجاد، پاتوفیزیولوژی و پاسخ به درمان با داروی ضد افسردگی شباهت زیادی به انسان داشته باشند (۴۱). مدل‌های افسردگی مبتنی بر استرس، همچون استرس خفیف مزمن، درمان‌گری آموخته و استرس اوایل زندگی، از مهم‌ترین روش‌های القای افسردگی می‌باشند.

بعد از القای افسردگی، با توجه به نوع مطالعه مورد نظر می‌توان با آزمون‌های رفتاری متفاوتی به ارزیابی میزان افسردگی در مدل‌های ایجاد شده و بررسی درمان‌های صورت گرفته بر روی آن‌ها پرداخت. این روش‌ها عبارتند از:

روش‌های مبتنی بر نالمیدی مانند: آزمون شنای اجباری و آزمون آویزان کردن از دم

روش‌های مبتنی بر جایزه مانند: آزمون تمایل به سوکروز و آزمون خودتحریکی داخل معزی

روش‌های مبتنی بر اضطراب مانند: آزمون پلاس ماز مرتفع، آزمون جعبه باز، آزمون جعبه روشن/خاموش و آزمون هیپوفازی ناشی از تازگی

از نقاط ضعف مدل‌های افسردگی مبتنی بر استرس می‌توان به ضعف توجه به جنسیت اشاره نمود چرا که در اکثر قریب به اتفاق مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، تمرکز بر روی مدل‌های جانوری نر بوده است (۴۲) و این در حالی است که شیوع افسردگی در زنان دو برابر مردان می‌باشد. لذا در این زمینه بهتر است از سایر مدل‌های افسردگی از جمله مدل‌های ژنتیکی، اپتوژنیکی، مدل‌های مبتنی بر اصلاح نژاد انتخابی، مدل‌های فارماکولوژیکی و ایجاد مدل افسردگی با قطع پیاز بویایی استفاده نمود.

کنجکاوی ذاتی تمایل بالایی به تجربه مکان‌های جدید دارند، لذا با تأخیر اندکی وارد محفظه روشن می‌شوند، اما موش‌های افسردگی و مضطرب تمایل کمی به کاوش در مکان‌های ناآشنا دارند و ترجیح می‌دهند در محفظه تاریک بمانند. استفاده از داروهای ضد افسردگی تمایل موش‌های بیمار به محیط جدید را افزایش می‌دهند (۳۹).



تصویر ۷- جعبه روشن و تاریک (۳۹).

نتیجه‌گیری

افسردگی از جمله اختلالات روانی هتروژن است که با عالیمی همچون نالمیدی، اضطراب، تحريك پذیری، نگرانی، بی انگیزگی، احساس گناه و درمان‌گری همراه می‌باشد. بر اساس آمارهای به دست آمده، سازمان بهداشت جهانی پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۰ افسردگی دومین جایگاه را در میان سایر بیماری‌ها داشته باشد (۴۰). علی‌رغم تحقیقات وسیع به عمل آمده، هنوز سوالات زیادی در مورد بیماری‌زایی^{۳۱} و درمان این بیماری باقی‌مانده که باید پاسخ آن‌ها یافته شود که از علل آن دسترسی محدود به مدل‌های جانوری معتبر می‌باشد؛ چرا که بیماری‌های روانی همچون افسردگی با پیچیدگی معز انسان مرتبط می‌باشند.

به علاوه بعضی عالیم مرکزی همچون حالت افسرده، احساس بی‌ارزشی و فکرکردن مداوم به مرگ و خودکشی را در حیوانات آزمایشگاهی نمی‌توان نشان داد. بنابراین و با توجه به پیچیدگی

^{۳۱} Pathogenicity

^{۳۲} Etiology

منابع

1. Kessler RC, Bromet EJ. The epidemiology of depression across cultures. *Annu Rev Public Health.* 2013; 34: 119-38.
2. Beck AT, Alford BA. Depression: causes and treatment. 2nd ed. University of Pennsylvania Press. 2009.
3. Hammen C. Stress and depression. *Annu Rev Clin Psychol.* 2005; 1: 293-319.
4. Czeh B, Fuchs E, Wiborg O, Simon M. Animal models of major depression and their clinical implications. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.* 2016; 64: 293-310.
5. Bjorkqvist K. Social defeat as a stressor in humans. *Physiol Behav.* 2001; 73(3): 435-42.
6. Hollis F, Kabbaj M. Social defeat as an animal model for depression. *ILAR J.* 2014; 55(2): 221-32.
7. Berton O, McClung CA, DiLeone RJ, Krishnan V, Renthal W, Russo SJ, et al. Essential role of BDNF in the mesolimbic dopamine pathway in social defeat stress. *Science.* 2006; 311(5762): 864-8.
8. Palanza P. Animal models of anxiety and depression: how are females different? *Neurosci Biobehav Rev.* 2001; 25(3): 219-33.
9. Holly EN, Shimamoto A, Debold JF, Miczek KA. Sex differences in behavioral and neural cross-sensitization and escalated cocaine taking as a result of episodic social defeat stress in rats. *Psychopharmacology (Berl).* 2012; 224(1): 179-88.
10. Bartlang MS, Neumann ID, Slattery DA, Uschold-Schmidt N, Kraus D, Helfrich-Förster C, et al. Time matters: pathological effects of repeated psychosocial stress during the active, but not inactive, phase of male mice. *J Endocrinol.* 2012; 215(3): 425-37.
11. Willner P. Chronic mild stress (CMS) revisited: consistency and behavioural-neurobiological concordance in the effects of CMS. *Neuropsychobiology.* 2005; 52(2): 90-110.
12. Katz RJ, Hersh S. Amitriptyline and scopolamine in an animal model of depression. *Neurosci Biobehav Rev.* 1981; 5(2): 265-71.
13. Pryce CR, Azzinnari D, Spinelli S, Seifritz E, Tegethoff M, Meinlschmidt G. Helplessness: a systematic translational review of theory and evidence for its relevance to understanding and treating depression. *Pharmacol Ther.* 2011; 132(3): 242-67.
14. Seligman ME, Maier SF, Geer JH. Alleviation of learned helplessness in the dog. *J Abnorm Psychol.* 1968; 73(3): 256-62.
15. Drugan RC, Basile AS, Ha J-H, Healy D, Ferland RJ. Analysis of the importance of controllable versus uncontrollable stress on subsequent behavioral and physiological functioning. *Brain Res Protoc.* 1997; 2(1): 69-74.
16. Schmidt MV, Wang X-D, Meijer OC. Early life stress paradigms in rodents: potential animal models of depression? *Psychopharmacology (Berl).* 2011; 214(1): 131-40.
17. Rice CJ, Sandman CA, Lenjavi MR, Baram TZ. A novel mouse model for acute and long-lasting consequences of early life stress. *Endocrinology.* 2008; 149(10): 4892-900.
18. Naninck EF, Hoeijmakers L, Kakava-Georgiadou N, Meesters A, Lazic SE, Lucassen PJ, et al. Chronic early life stress alters developmental and adult neurogenesis and impairs cognitive function in mice. *Hippocampus.* 2015; 25(3): 309-28.
19. Animal research. <http://www.fermons-le-ceds.org/en/animal-research/>.
20. Petit-Demouliere B, Chenu F, Bourin M. Forced swimming test in mice: a review of antidepressant activity. *Psychopharmacology (Berl).* 2005; 177(3): 245-55.
21. Hall C, Ballachey EL. A study of the rat's behavior in a field. A contribution to method in comparative psychology. *Univ Calif Publ Psychol.* 1932; 6: 1-12.
22. Walsh RN, Cummins RA. The open-field test: a critical review. *Psychol Bull.* 1976; 83(3): 482-504.
23. CJ H. Animal models of depression. <http://psylab.idv.tw/animal%20models/open%20field%20test.jpg>.
24. Habr SF, Bernardi MM, Conceicao IM, Freitas TA, Felicio LF. Open field behavior and intra-nucleus accumbens dopamine release in vivo in virgin and lactating rats. *Psychol Neurosci.* 2011; 4(1): 115-21.
25. Brown RE, Corey SC, Moore AK. Differences in

- measures of exploration and fear in MHC-congenic C57BL/6J and B6-H-2K mice. *Behav Genet.* 1999; 29(4): 263-71.
26. Tail suspension test. http://www.bioseb.com/bioseb/anglais/default/item_id=2_cat_id=1_Tail0Suspension0Test_source=news.php.
27. Cryan JF, Mombereau C, Vassout A. The tail suspension test as a model for assessing antidepressant activity: review of pharmacological and genetic studies in mice. *Neurosci Biobehav Rev.* 2005; 29(4-5): 571-625.
28. Hamidi A. Comparison of animal models in enriched environments. <https://mazeengineers.com/comparison-animal-models-enriched-environments/>
29. Cline BH, Anthony DC, Lysko A, Dolgov O, Anokhin K, Schroeter C, et al. Lasting downregulation of the lipid peroxidation enzymes in the prefrontal cortex of mice susceptible to stress-induced anhedonia. *Behav Brain Res.* 2015; 276: 118-29.
30. Wise RA. Addictive drugs and brain stimulation reward. *Annu Rev Neurosci.* 1996; 19(1): 319-40.
31. Claffey P. Biological Foundations. <http://mikeclaffey.com/psyc2/notes-cog-motivation-emotion.html>.
32. Carlezon WA, Chartoff EH. Intracranial self-stimulation (ICSS) in rodents to study the neurobiology of motivation. *Nat Protoc.* 2007; 2(11): 2987-95.
33. Ohara K, Suzuki Y, Ochiai M, Tsukamoto T, Tani K, Ohara K. A variable-number-tandem-repeat of the serotonin transporter gene and anxiety disorders. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.* 1999; 23(1): 55-65.
34. Helmuth L. In sickness or in health? *Science.* 2003; 302(5646): 808-10.
35. Dulawa SC, Hen R. Recent advances in animal models of chronic antidepressant effects: the novelty-induced hypophagia test. *Neurosci Biobehav Rev.* 2005; 29(4): 771-83.
36. Elevated plus maze. <http://www.stoeltingco.com/anymaze/video-tracking/bundles/elevated-plus-maze-any-maze-bundle.html>.
37. Walf AA, Frye CA. The use of the elevated plus maze as an assay of anxiety-related behavior in rodents. *Nat Protoc.* 2007; 2(2): 322-8.
38. Stoelting Co. light/dark box. <http://www.stoeltingco.com/anymaze/mazes/anxiety-depression/light-dark-box.html>.
39. Chourbaji S, Urani A, Inta I, Sanchis-Segura C, Brandwein C, Zink M, et al. IL-6 knockout mice exhibit resistance to stress-induced development of depression-like behaviors. *Neurobiol Dis.* 2006; 23(3): 587-94.
40. Murray CJ, Lopez AD. Alternative projections of mortality and disability by cause 1990-2020: Global Burden of Disease Study. *Lancet.* 1997; 349(9064): 1498-504.
41. Willner P, Mitchell P. The validity of animal models of predisposition to depression. *Behav Pharmacol.* 2002; 13(3): 169-88.
42. Hua-cheng Y, Cao X, Das M. Behavioral animal models of de-pressure. *Neurosci Bull.* 2010; 26(4): 327-37.