



Modulatory Effect of Glial-Derived Growth Factor on Addiction

Maryam Jafarian¹, Mohammadesmaeil Alipour^{2*}

¹Shefa Neuroscience Research Center, Khatam Alanbia Hospital, Tehran, Iran

²School of Advance Technologies in Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Article Info:

Received: 6 Jun 2016

Accepted: 31 Aug 2016

ABSTRACT

Introduction: Glial-derived growth factor (GDNF) is an important secretory protein that plays a crucial role in the growth and development of the central and peripheral nervous systems, especially the survival of dopaminergic adult neurons. Several investigations have shown the unique negative modulatory role of GDNF in drug abuse. **Conclusion:** This study is a brief description on GDNF and its positive effects as a potential target for the treatment of drug addiction.

Key words:

1. Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor
2. Dopaminergic Neurons
3. Central Nervous System
4. Peripheral Nervous System
5. Substance-Related Disorders

*Corresponding Author: Mohammadesmaeil Alipour

E-mail: dralipour@yahoo.com

doi: 10.18869/acadpub.shefa.4.4.116

اثر تعديل کننده فاکتور رشد عصبی مشتق از گلیا بر اعتیاد

مریم جعفریان^۱، محمد اسماعیل علیپور^{۲*}

^۱ مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیاء، تهران، ایران

^۲ دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

اطلاعات مقاله:

تاریخ پذیرش: ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

تاریخ دریافت: ۱۷ خرداد ۱۳۹۵

چکیده

مقدمه: فاکتور رشد مشتق از گلیا یک پروتئین ترشحی مهم است که یک نقش حیاتی در رشد و نمو سیستم‌های اعصاب مرکزی و محیطی به خصوص بقای نورون‌های دوپامینرژیک بزرگسالان ایفاء می‌کند. مطالعات مختلف نقش تنظیمی منفی منحصر به فرد فاکتور رشد مشتق از گلیا در سوء مصرف مواد را نشان داده‌اند. **نتیجه‌گیری:** این مطالعه یک شرح مختصر بر روی فاکتور رشد مشتق از گلیا و اثرات مطلوب آن به عنوان یک هدف احتمالی برای درمان اعتیاد به مواد است.

کلید واژه‌ها:

۱. فاکتور رشد عصبی مشتق از رده سلولی گلیا
۲. نورون‌های دوپامینرژیک
۳. سیستم عصبی مرکزی
۴. سیستم عصبی محیطی
۵. اختلالات وابسته به مصرف مواد

* نویسنده مسئول: محمد اسماعیل علیپور

آدرس الکترونیکی: dralipour@yahoo.com

مقدمه

پروتئین‌های الحقی عصبی (NCAM)^{۱۰} نیز عمل می‌کند. اتصال GDNF به NCAM باعث فعال شدن پروتئین‌های خانواده Src (تیروزین کیناز) مثل Fyn شده و در نتیجه تحریک مهاجرت سلول‌های شوان و برآمدگی آکسونی در هیپوکامپ و قشر می‌شود. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که فعالیت GDNF منجر به افزایش نسخه برداری از ژن‌ها می‌گردد، به عنوان مثال GDNF سبب افزایش بیان پروتئین متصل شونده به کلسیم فریکونین و در نهایت فعال شدن آبشارهای کلسیمی در داخل سلول می‌شود (۸، ۹).

GDNF نقش مهمی در رشد و بقاء نورون‌های حرکتی، حسی، سمپاتیک و کلیه دارد. همچین نشان داده شده که در سیناپتوژنیس در هیپوکامپ نیز نقش فعال دارد. GDNF یک نقش عمده در ایجاد و بقاء نورون‌ها و رشد مجدد نورون‌های دوپامینزیک مغز بالغین به دنبال صدمات دارد (۱۰، ۱۱). همچنین باعث افزایش بقاء نورون‌های دوپامینی مزانسفالیک در محیط کشت می‌شود (۱۲). به عنوان مثال گزارش شده که تزریق آدنوویروس GDNF در استریاتوم سبب ممانعت از دزتراسیون نورون‌های دوپامینی به دنبال تزریق ۶-هیدروکسی دوپامین می‌شود. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که به خاطر نقش کلیدی که GDNF بر نورون‌های دوپامینزیک دارد می‌تواند در درمان بیماری‌ای^{۱۱} بیماری پارکینسون نیز ایفای نقش کند. بررسی‌های ونگ، کوبوری و همکارانشان حاکی از نقش تنظیمی GDNF در روند تحریک و رها شدن بعضی از واسطه‌های شیمیایی مثل گلوتامات و دوپامین است. درمان مزمون با GDNF در محیط کشت VTA سبب افزایش تعداد سیناپس‌ها در نورون‌های دوپامینزیک شده بود.

مطالعات دیگر بیان کرده‌اند که GDNF می‌تواند در یادگیری و حافظه نیز مؤثر باشد. گرلی و همکارانش گزارش کرده‌اند حذف یک کپی از ژن GDNF در موش‌ها سبب نقص در اکتساب و اختلال در حافظه فضایی موش‌ها شده بود (۱۳).

به نظر می‌رسد GDNF از دو طریق روی عملکرد نورون‌ها تأثیر می‌گذارد. اول با تأثیر روی کانال‌هایی مثل کلسیم و پتانسیم سبب تغییرات کوتاه‌مدت می‌شود. دوم از طریق تنظیم بیان ژن‌ها و تغییرات سیناپس‌ها اثرات بلندمدت ایجاد می‌کند (۱۴).

GDNF و اعتیاد

گیرنده‌های VTA و GFRα1 در ناحیه GDNF به میزان

فاکتور رشد مشتق از گلیا (GDNF)^۱ یکی از انواع فاکتورهای رشد مغزی است که معمولاً در دوران رشد در همه بخش‌های سیستم اعصاب مرکزی بیان می‌شود، اما در مغز بالغ، بیان آن محدود به مناطق خاصی است و برای ایجاد، تمایز، رشد و عملکرد نورون‌های GDNF دوپامینزیک مغز میانی ضروری است (۱). گرچه GDNF در آستروسیت‌ها بیان می‌شود، اما تحقیقات نشان داده است که در مغز بزرگ‌سالان، GDNF به صورت عمده در نورون‌ها تولید می‌گردد. منبع اصلی تولید GDNF نورون‌های دوپامینزیک بخش متراکم جسم سیاه و تغمتوں شکمی (VTA)^۲ و هسته اکومینس (NA)^۳ است. مطالعات نشان داده است GDNF در مغز بزرگ‌سالان به فراوانی در NA ساخته شده و به صورت رتروگرید به VTA^۴ حمل می‌شود که در آنجا به گیرنده‌های GFRα1^۵ متصل شده و مسیر علامت دهی خود را فعال می‌کند (۲، ۳). فعال شدن این مسیر سبب افزایش بیان ژن‌ها و یا افزایش شلیک نورون‌های دوپامینزیک می‌شود. انشعاب‌های VTA به NA یکی از اجزاء مهم سیستم دوپامینی مزولیمبیک است که هدف اصلی سوء مصرف داروها در مغز می‌باشد (۴).

مسیرهای پیام‌رسانی و عملکرد GDNF

به طور کلی دو مسیر عمده برای فعالیت GDNF شناخته شده است که شامل:

۱- فعالیت GDNF از طریق فعال شدن یک گیرنده پروتو-انکوژنی به نام Ret^۶- که از خانواده تیروزین کینازهاست- صورت می‌گیرد. در ابتدا GDNF به گیرنده اختصاصیش GFRα1^۷ باند می‌شود و جفت شدن گیرنده به لیگاند منجر به خدمت گرفتن Ret شده و با هم تشکیل یک کمپکس می‌دهند (۵، ۶). کمپلکس ایجاد شده منجر به اتوفسفریلاسیون جزء Ret و در نهایت فعال شدن پروتئین‌هایی مثل MAPK^۸، PLCγ^۹ و ERK1/2^{۱۰}، PI3K^{۱۱} می‌گردد همچنین فعال شدن MAPK به وسیله GDNF منجر به آغاز یک مدار خود تنظیم مثبت در GDNF از طریق فعال شدن پایدار Ret می‌شود. ونگ و همکارانش گزارش کرده‌اند که فعال شدن GDNF از طریق PI3K سبب افزایش بیان پروتئین متصل شونده به کلسیم کالبیندین می‌شود (۷).

۲- عدم حضور Ret در مناطقی مثل قشر و هیپوکامپ منجر به کشف وجود مسیر دیگری برای فعالیت GDNF شد. GDNF از طریق باند شدن مستقیم با

¹ Glial derived neurotrophic factor

² Ventral tegmentum area

³ Nucleus accumbens

⁴ Glomerular filtration rate

⁵ Rearranged during transfection receptor

⁶ Mitogen-activated protein kinase

⁷ Phosphatidylinositol 3kinase

⁸ Extracellular signal-regulated kinase 1/2

⁹ Phospholipase Cγ

¹⁰ Neural cell adhesion molecule

¹¹ Pathogenicity

هیدروکسیلاز شده بود (۱۷). در پژوهش دیگری که با موش‌های هتروزیگوت GDNF در مقایسه با موش‌های طبیعی انجام شد نقش GDNF درون‌زاد در سوء مصرف مورفین در این دو گروه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بیان کرداند که موش‌های هتروزیگوت GDNF نسبت به اثرات روانی حرکتی مورفین به طور معنی‌داری حساس‌تر هستند (۲۱، ۲۴). از طرف دیگر تزریق حاد و مزمن مورفین سبب افزایش بیشتری در سطح دوپامین خارج سلولی هسته اکومبنس در موش‌های هتروزیگوت نسبت به گروه سالم داشت. نکته جالب در پژوهش‌های صورت گرفته این است که کوکائین از طریق مسدود کردن باز جذب دوپامین در سطح سیناپس‌ها سبب افزایش غلظت دوپامین خارج سلولی می‌شود اما مورفین از طریق تحریک نورون‌های دوپامینزیک VTA سبب تنظیم پاسخ دهی نورون‌ها به آن می‌شود (۲۴، ۲۵).

و الک VDNF

تاکنون مطالعات حیوانی و انسانی زیادی درباره تأثیر GDNF بر سوء مصرف الکل انجام شده است و در اکثر مطالعات نیز شاهد تأثیر مثبت GDNF در کاهش مصرف الکل بوده‌اند. پژوهشگران نشان داده‌اند که مصرف تک دوز GDNF در موش‌ها سبب کاهش سریع خود-صرفی الکل در آن‌ها شده است (۲۳، ۲۶). در مطالعه دیگری که الگوی نوشیدن اجتماعی به صورت شرابخوارگی بیش از حد شبیه سازی شده بود تزریق GDNF سبب کاهش سطح متوسط مصرف الکل شده بود (۲۳، ۲۶). در مجموع پژوهش‌های متعددی که در این زمینه انجام شده نشان دهنده کاربرد هم در سوء مصرف کنندگان الکل سطح متوسط (۱۰٪) و هم در مصرف کنندگان الکل سطح بالا (۲۰٪) به‌منظور کاهش مصرف در موش‌های معتاد می‌باشد (۱۴).

در بررسی‌های انجام شده بر روی مسیرهای پیام‌رسانی فعالیت GDNF، نشان‌گر عملکرد چندگانه GDNF بر مولکول‌ها و پیتیدهای مختلف است. به نظر می‌رسد مسیر اصلی فعالیت GDNF که در نهایت منجر به فعال شدن Ret می‌شود، فعال کردن MAPK، PI3K و PLC γ است، بدین صورت که GDNF در VTA سبب فعال شدن MAP کیناز ERK1/2- که یک مهار کننده اختصاصی کینازهای بالا دست محسوب می‌شود- و همچنین MAP MEK می‌شود (۲۷). از آنجایی که تأثیر GDNF بر الکل بسیار سریع است شاید بتوان بیان داشت که مکانیسم‌های دخیل در این امر غیر ژنومیک می‌باشند. در مطالعه‌ای نشان داده‌اند که GDNF در مغز میانی اولیه به طور سریعی فعالیت کانال‌های پتاسیمی نوع A را از طریق فعال کردن مسیر MAP کیناز مهار می‌کند و سبب تغییر در تحریک پذیری ذاتی نورون‌های VTA

زیادی بیان شده‌اند، نورون‌های دوپامینزیک در VTA نقش مهمی در مدار نورونی مربوط به رفتارهای اعتیادی دارند. همه انواع سوء مصرف مواد سبب افزایش سطح خارج سلولی دوپامین در NA جوندگان و انسان شده‌اند (۱۵). یافته‌های سالهای اخیر نشان می‌دهد که مورد سوء GDNF نقش تنظیمی در عملکرد داروهایی که مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند (محرك‌های روانی، مورفین و اتلانول) دارد. بیشتر مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است بیانگر آن است که فعال شدن مسیر GDNF سبب کاهش تغییرات بیوشیمیایی و رفتاری در موش‌هایی است که مواجه با سوء مصرف مواد هستند (۱۴).

GDNF و محرك‌های روانی

بررسی‌های متعدد نشان داده‌اند که سیستم GDNF درون‌زاد در پاسخ به مواجهه با محرك‌ها فعال می‌شود و بیان آن به خصوص در NA در مدت زمان ۲۴ ساعت پس از تماس مکرر با محرك‌ها افزایش میابد (۱۶). همچنین نشان داده شده است که GDNF به صورت انتخابی نورون‌های دوپامینزیک را در مقایسه با نورون‌های سروتونرژیک در مقابل اثرات سمی متانفتامین‌ها محافظت می‌کند (۱۷).

تزریق GDNF به داخل VTA باعث کاهش (CPP) نسبت به کوکائین می‌گردد (۱۷). همچنین تزریق ممتد GDNF به وسیله پمپ در استریاتوم باعث کاهش مصرف کوکائین در Rat گردید (۱۸، ۱۹).

موش‌هایی که هتروزیگوت GDNF شده‌اند، به صورت معنی‌داری سطح GDNF پایین‌تری نسبت به نوع معمولی دارند و افزایش حساسیت نسبت به اثرات پاداشی کوکائین و متامفتامین را نشان می‌دهند (۲۰، ۲۱). همچنین در موش‌های هتروزیگوت، افزایش انگیزش و ولع برای مصرف متانفتامین که واسته به دوز می‌باشد نسبت به موش‌های معمولی دیده می‌شود (۲۲).

در مقابل اثرات GDNF در سوء مصرف مواد، GDNF تأثیری در مصرف داروهایی که باعث اثرات پاداش نمی‌شوند (غیر مخدرا) ندارد. به عنوان مثال: تزریق GDNF به داخل VTA، در مصرف سوکروز که مورد علاقه موش‌های است تأثیری ندارد (۲۳) و همچنین پیوند سلول‌های تولید کننده GDNF، تأثیری در مصرف آب در موش‌هایی که در محرومیت از آب بوده‌اند، نداشت (۱۹).

GDNF و اپیوئیدها

مشابه محرك‌های روانی یک سری از مطالعات نشان دهنده نقش تنظیمی منفی GDNF بر اثرات اپیوئیدها به خصوص در منطقه VTA است. مسر و همکارانش نشان داده‌اند که اینفیوژن GDNF به داخل VTA در موش‌هایی که به صورت مزمن در معرض مورفین قرار گرفته بودند، سبب مهار افزایش سطح تیروزین

¹² Condition place preference

۲- استفاده از مولکول‌های کوچکی که بتوانند به صورت سیستمیک باعث افزایش ساخت GDNF شوند و یا گیرنده‌های آن را فعال کنند؛ که بررسی‌های مختلف نشان داده امکان اجرای این روش از طرق مختلف وجود دارد (۳۳).

نتیجه‌گیری

اطلاعات موجود نشان دهنده تنظیم کاهشی GDNF بر اثرات القاء شده در سوء مصرف مواد دارد. در واقع مطالعات نشان داده است که کاهش سطح GDNF درون زاد یا مهار مسیر GDNF سبب افزایش چندین نشانگر بیوشیمیایی و سازگاریهای رفتاری در مصرف کنندگان به موادی مثل محرك‌های روانی، مخدراها و اتانول می‌شود. مکانیسم عمل GDNF برای مقابله با اعتیاد در حال حاضر ناشناخته است. به نظر می‌رسد که اثر واسطه‌ای سریع نامزد های احتمالی اعمال اثر GDNF باشند. تغییرات ایجاد شده به واسطه GDNF می‌تواند به بازسازی سینپاتی و همچنین تغییر پاسخ دهی سیستم دوپامینزیک مژولیمیبک برای مقابله با انگیزه و یا پاداش منجر شود. نکته قابل توجه این است که تعداد فزاینده‌ای از مطالعات مؤید آن هستند که داروهایی که تقلید کننده اثر GDNF هستند و یا می‌توانند باعث افزایش ساخت آن شوند (کابرگولین) ممکن است عوامل قوى و انتخابی برای درمان اعتیاد باشند.

شده و در نهایت منجر به کاهش خود - مصرفی الكل می‌شود (۲۸). از طرف دیگر GDNF همانند سایر فاکتورهای رشد سبب القای تغییرات رونویسی که زمینه ساز اعمال بلندمدت هستند، می‌گردد. به عنوان مثال گزارش شده است که GDNF سبب افزایش بیان انتقال دهنده دوپامین در سیستم مژولیمیبک می‌شود که منجر به تغییرات درازمدتی می‌گردد که فراتر از فعالیت یا غیر فعال بودن GDNF عمل می‌کند (۲۹).

GDNF به عنوان یک هدف مطلوب برای درمان اعتیاد

روی هم رفته، اطلاعات فوق بیانگر نقش انتخابی GDNF در تنظیم رفتارهای مرتبط با سوء مصرف مواد بوده و شاید بتوان گفت که با اتخاذ راهبردی^{۱۳} مناسب از طریق تنظیم اثر افزایشی GDNF به عنوان یک عامل درمانی برای مبارزه با اشکال مختلف اعتیاد مورد استفاده قرار بگیرد. با توجه به وزن مولکولی GDNF- که یک پروتئین ۲۴ کیلو دالتون است (۳۰) - بعید است که GDNF به راحتی بتواند از سد خونی مغز عبور کند و رساندن آن به مغز نیازمند مداخلات جراحی می‌باشد که امری غیر ممکن بوده و در درمان سوء مصرف الكل و داروها روش مناسبی نیست. بنابراین دو راه برای اینکار پیش بینی می‌شود:

- ۱- اتصال GDNF به پیتیدها یا پروتئین‌هایی که باعث عبور آن از سد خونی - مغزی شوند (۳۱، ۳۲).

منابع

1. Airaksinen MS, Saarma M. The GDNF family: signalling, biological functions and therapeutic value. *Nat Rev Neurosci.* 2002; 3(5): 383-94.
2. Barroso-Chinea P, Cruz-Muros I, Aymerich MS, Rodríguez-Díaz M, Afonso-Oramas D, Lanciego JL, et al. Striatal expression of GDNF and differential vulnerability of midbrain dopaminergic cells. *Eur J Neurosci.* 2005; 21(7): 1815-27.
3. Wang J, Carnicella S, Ahmadiantehrani S, He D-Y, Barak S, Kharazia V. Nucleus accumbens-derived glial cell line-derived neurotrophic factor is a retrograde enhancer of dopaminergic tone in the mesocorticolimbic system. *J Neurosci.* 2010; 30(43): 14502-12.
4. Nestler EJ. Molecular basis of long-term plasticity underlying addiction. *Nat Rev Neurosci.* 2001; 2(2): 119-28.
5. Jing S, Wen D, Yu Y, Holst PL, Luo Y, Fang M. GDNF-induced activation of the ret protein tyrosine kinase is mediated by GDNFR- α , a novel receptor for GDNF. *Cell.* 1996; 85(7): 1113-24.
6. Tsui-Pierchala BA, Ahrens RC, Crowder RJ, Milbrandt J, Johnson EM. The long and short isoforms of Ret function as independent signaling complexes. *J Biol Chem.* 2002; 277(37): 34618-25.
7. Wang H-J, Cao J-P, Yu J-K, Zhang L-C, Jiang Z-J, Gao D-S. Calbindin-D28K expression induced by glial cell line-derived neurotrophic factor in substantia nigra neurons dependent on PI3K/Akt/NF- κ B signaling pathway. *Euro J Pharmacol.* 2008; 595(1-3): 7-12.
8. Paratcha G, Ledda F, Ibáñez CF. The neural cell adhesion molecule NCAM is an alternative signaling receptor for GDNF family ligands. *Cell.* 2003; 113(7): 867-79.
9. Chao CC, Ma YL, Chu KY, Lee EH. Integrin αv and NCAM mediate the effects of GDNF on DA neuron survival, outgrowth, DA turnover and motor activity in

¹³ Strategy

- rats. *Neurobiol Aging.* 2003; 24(1): 105-16.
10. Beck KD, Valverde J, Alexi T, Poulsen K, Moffat B, Vandlen RA. Mesencephalic dopaminergic neurons protected by GDNF from axotomy-induced degeneration in the adult brain. *Nature.* 1995; 373(1): 339-41.
 11. Pascual A, Hidalgo-Figueroa M, Piruat JI, Pintado CO, Gómez-Díaz R, López-Barneo J. Absolute requirement of GDNF for adult catecholaminergic neuron survival. *Nat Neurosci.* 2008; 11(7): 755-61.
 12. Lin L-FH, Doherty DH, Lile JD, Bektesh S, Collins F. GDNF: a glial cell line-derived neurotrophic factor for midbrain dopaminergic neurons. *Sciences.* 1993; 260: 1130.
 13. Gerlai R, McNamara A, Choi-Lundberg D, Armanini M, Ross J, Powell-Braxton L. Impaired water maze learning performance without altered dopaminergic function in mice heterozygous for the GDNF mutation. *Euro J Neurosci.* 2001; 14(7): 1153-63.
 14. Carnicella S, Ron D. GDNF-a potential target to treat addiction. *Pharmacol Therapeut.* 2009; 122(1): 9-18.
 15. Volkow ND, Fowler JS, Wang G-J, Swanson JM, Telang F. Dopamine in drug abuse and addiction: results of imaging studies and treatment implications. *Arch Neurol-Chicago.* 2004; 9: 557-69.
 16. Semba Ji, Akanuma N, Wakuta M, Tanaka N, Suhara T. Alterations in the expressions of mRNA for GDNF and its receptors in the ventral midbrain of rats exposed to subchronic phencyclidine. *Mol Brain Res.* 2004; 124(1): 88-95.
 17. Messer CJ, Eisch AJ, Carlezon WA, Whisler K, Shen L, Wolf DHL. Role for GDNF in biochemical and behavioral adaptations to drugs of abuse. *Neuron.* 2000; 26(1): 247-57.
 18. Green-Sadan T, Kuttner Y, Lublin-Tennenbaum T, Kinor N, Boguslavsky Y, Margel S. Glial cell line-derived neurotrophic factor-conjugated nanoparticles suppress acquisition of cocaine self-administration in rats. *Exp Neurol.* 2005; 194(1): 97-105.
 19. Green-Sadan T, Kinor N, Roth-Deri I, Geffen-Aricha R, Schindler CJ, Yadid G. Transplantation of glial cell line-derived neurotrophic factor-expressing cells into the striatum and nucleus accumbens attenuates acquisition of cocaine self-administration in rats. *Euro J Neurosci.* 2003; 18(7): 2093-8.
 20. Airavaara M, Planken A, Gäddnäs H, Piepponen TP, Saarma M, Ahtee L. Increased extracellular dopamine concentrations and FosB/ΔFosB expression in striatal brain areas of heterozygous GDNF knockout mice. *Euro J Neurosci.* 2004; 20(9): 2336-44.
 21. Niwa M, Nitta A, Yamada Y, Nakajima A, Saito K, Seishima M. An inducer for glial cell line-derived neurotrophic factor and tumor necrosis factor- α protects against methamphetamine-induced rewarding effects and sensitization. *Biol Psychiat.* 2007; 61(7): 890-901.
 22. Yan Y, Yamada K, Niwa M, Nagai T, Nitta A, Nabeshima T. Enduring vulnerability to reinstatement of methamphetamine-seeking behavior in glial cell line-derived neurotrophic factor mutant mice. *Faseb J.* 2007; 21(9): 1994-2004.
 23. Carnicella S, Kharazia V, Jeanblanc J, Janak PH, Ron D. GDNF is a fast-acting potent inhibitor of alcohol consumption and relapse. *Proceedings of the National Academy of Sciences.* 2008; 105(23): 8114-9.
 24. Airavaara M, Tuomainen H, Piepponen T, Saarma M, Ahtee L. Effects of repeated morphine on locomotion, place preference and dopamine in heterozygous glial cell line-derived neurotrophic factor knockout mice. *Genes, Brain Behav.* 2007; 6(3): 287-98.
 25. Airavaara M, Mijatovic J, Viavainen T, Piepponen TP, Saarma M, Ahtee L. In heterozygous GDNF knockout mice the response of striatal dopaminergic system to acute morphine is altered. *Synapse.* 2006; 59(6): 321-9.
 26. He D-Y, McGough NN, Ravindranathan A, Jeanblanc J, Logrip ML, Phamluong K, et al. Glial cell line-derived neurotrophic factor mediates the desirable actions of the anti-addiction drug ibogaine against alcohol consumption. *J Neurosci.* 2005; 25(3): 619-28.
 27. Sweatt JD. The neuronal MAP kinase cascade: a biochemical signal integration system subserving synaptic plasticity and memory. *J Neurochem.* 2001; 76(1): 1-10.
 28. Yang F, Feng L, Zheng F, Johnson SW, Du J, Shen L. GDNF acutely modulates excitability and A-type K⁺ channels in midbrain dopaminergic neurons. *Nat Neurosci.* 2001; 4(11): 1071-8.
 29. Consales C, Volpicelli F, Greco D, Leone L, Colucci-D'Amato L, Perrone-Capano C. GDNF signaling in embryonic midbrain neurons in vitro. *Brain Res.* 2007; 1159: 28-39.
 30. Kastin AJ, Akerstrom V, Pan W. Glial cell line derived neurotrophic factor does not enter normal mouse

- brain. Neurosci Lett. 2003; 340(3): 239-41.
31. Kilic Ü, Kilic E, Dietz GP, Bähr M. Intravenous TAT-GDNF is protective after focal cerebral ischemia in mice. Stroke. 2003; 34(5): 1304-10.
32. Boado RJ, Zhang Y, Zhang Y, Wang Y, Pardridge

WM. GDNF fusion protein for targeted-drug delivery across the human blood-brain barrier. Biotechnol Bioeng. 2008; 100(2): 387-96.

33. Shoptaw S, Heinzerling KG, Rotheram-Fuller E, Steward T, Wang J, Swanson A-N. Drug Alcohol Depen. 2008; 96(1): 222-32.