

مقایسه پیامدهای رویانی و مادری در زنان آنما و غیرآنما زایمان کرده در سه ماهه سوم بارداری

دکتر فروزان میلانی (MD)^۱- دکتر بهرنگ معتمد (MD)^۲- دکتر سیده مرضیه قدسی (MD) (MSc)^۳- دکتر سیده مرضیه قدسی (MD)

*نویسنده مسئول: گروه زنان و زایمان، بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

پست الکترونیک: idsg2050@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله: ۹۴/۰۳/۱۱ تاریخ ارسال: ۹۴/۰۶/۰۵ تاریخ پذیرش: ۹۴/۰۷/۰۹

چکیده

مقدمه: آنما یکی از آشکارترین دشواری‌های دوران بارداری است که عوارض مادری و جنینی آن در بیشتر بررسی‌ها بیان شده در حالی که در بخش مطالعات یافته‌ها پیوستگی نداشته و تا جایی که گاهی ناسازگار بوده‌اند.

هدف: سنجش عوارض مادری و جنینی پس از زایمان در گروه زنان آنما و غیرآنما که برای زایمان به بیمارستان الزهرا رشت آمدند بوده‌اند.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت تحلیلی از نوع مورد-شاهدی بر ۴۲ زن باردار که در بیمارستان الزهرا رشت در سه ماهه سوم حاملگی خود زایمان کرده بودند انجام شد. بیماران در گروه آنما با Hb<11 (N=211) قرار گرفتند و از نظر عوارض مادری و جداشدن زودرس جفت، پره ترم لیبرو... و عوارض جنینی انجام شد. بیماران در گروه غیرآنما با Hb>11 (N=22) قرار گرفتند و از نظر عوارض مادری و جداشدن زودرس جفت، پره ترم لیبرو... و عوارض جنینی انجام شد. پس از گردآوری داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۹ و آزمون مستقل و آنالیز شد.

نتایج: میانگین سنی در گروه آنما (28 ± 6) سال و در گروه غیرآنما (28 ± 5) سال بود. مقایسه فراوانی BMI در زنان آنما و غیرآنما زایمان کرده که اختلاف آماری منفی دار بین ۲ گروه از نظر رده‌های گوناگون BMI وجود داشت ($P=0.029$). ولی بین میانگین BMI دو گروه اختلاف معنی دار آماری دیده نشد ($P=0.13$). مقایسه فراوانی از نظر تعداد پاریتی ($P=0.05$) و قوی پر اکلامپسی ($P=0.79$) و جداشدن زودرس (جفت ($P=0.72$) و LBW ($P=0.18$)) تولد نوزاد پره ترم ($P=0.025$) نمره آپتکار نوزادان ($P=0.044$)، IUFD ($P=0.012$)، IUGR ($P=0.057$) دفع مکونیوم نوزادان ($P=0.023$) بود که بین دو گروه افراد مورد مطالعه آنما و غیرآنما تقاضت آماری معنی داری دیده نشد.

میانگین و انحراف میانگین فری تین (44 ± 29) و میانه آن ۴۰ بود. میانگین و انحراف میانگین TSH (21.6 ± 5.1) و میانه ۲۰ بود.

نتیجه‌گیری: ارتباط معنی دار بین آنما مادران و بروز عوارض بارداری و جنینی دیده شد. چه با این یافته می‌تواند به سبب زدایش افراد دارای آنما ارثی و ذیر درمان باشد، بنابراین، مطالعات گسترش‌دار پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها: سه ماهه سوم آبستنی / عوارض آبستنی / کم خونی / همه گیری شناسی

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره بیست و پنجم شماره ۹۷، صفحات: ۶۸-۶۱

مقدمه

آنها دچار آنما هستند. و نزدیک ۵۰٪ زنان باردار نیز علایم آنما فقر آهن را نشان می‌دهند. مطالعات انجام شده در اراک (۱۳۷۵) و قزوین (۱۳۷۷) بر زنان غیرباردار در سن باروری یعنی ۱۵ تا ۴۵ سالگی وبا در نظر گرفتن هموگلوبین ۱۲g/dl به عنوان سنجه تشخیصی آنما نشان داد که آنما فقر آهن به ترتیب ۱۱/۲٪ و ۱۴٪ شیوع دارد (۵). به طور کلی نتایج در ارتباط با غاظت هموگلوبین و پیامد بارداری متناقض بوده است. برخی یافته‌ها نشان می‌دهند که به دنبال افت غلظت هموگلوبین، خطر بروز بعضی عوارض

آنما یکی از شایع‌ترین مشکلات دوران بارداری است که بسیاری از آنها غیرفیزیولوژی بوده و می‌تواند زمینه‌ساز زایمان زودرس، تولد نوزاد کم وزن، افزایش مرگ‌ومیر جنینی، افزایش خونروری پس از زایمان و زجر جنین می‌شود (۳-۱). نتیجه مطالعات گسترش‌دار نشان می‌دهد که چگونگی خون مادر بویژه آنما در سه ماهه آخر بارداری با پیامدهای منفی بارداری مانند وزن کم نوزادان در هنگام تولد رابطه معنی دار دارد (۴). دو سوم زنان در سن باروری نشانه‌هایی از کمبود آهن را نشان می‌دهند و دست کم ۵٪

۱. گروه زنان و زایمان، بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

۲. گروه داخلی، بیمارستان رازی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

۳. معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

کرده بودند انجام شد. به این صورت که همه بیماران بستری در سه ماهه سوم حاملگی بدون توجه به نوع زایمان و با در نظر گرفتن معیار ورود به مطالعه (زایمان در سه ماهه سوم، ناشستن بیماری‌های زمینه‌ای دیگر، خوشنودی بیمار برای شرکت در مطالعه)، پس از بازنمود شرایط مطالعه و ارایه فرم رضایت‌نامه آگاهانه توسط پژوهشگر اطلاعات دموگرافی از بیماران جمع‌آوری شد. در آغاز بستری CBC و در کسانی که هموگلوبین زیر 11 g/dL داشتند متغیرهای دیگری مانند فری‌تین و TSH نیز ارزیابی شد و براین پایه بیماران در گروه آنمی و غیرآنمی قرار داده شدند. همچنین، با توجه به معیارهای دموگرافی بیماران، در دو گروه همگن‌سازی شده و پس از زایمان و تولد نوزادان در هر دو گروه از دید عوارض بارداری مادری و جنینی بررسی شدند.

ابزار پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه محقق ساخته‌ای ساخته شده از پنج مؤلفه بنیادین بود. این ساختار شامل: الف) اطلاعات دموگرافی ب) شرح حال از زایمان پیشین و بیماری‌های زمینه‌ای مادر (ارزیابی معیار خروج از مطالعه)، ج) عوارض مادری حین بارداری (د) عوارض جنینی حین بارداری و ه) ارزیابی نوزاد پس از تولد بود.

معیارهای دموگرافی دربردارنده، ارزیابی سن، قد، وزن (BMI)، پاریتی (نولی پار، مولتی پار)، وزن قبل از حاملگی بود.

افراد با توجه به معیارهای ورود به مطالعه شامل زنان زایمان کرده در سه ماهه سوم (بدون توجه به نوع زایمان) و آنان که پس از مطالعه رضایت‌نامه آگاهانه حاضر به همکاری بودند، وارد مطالعه شدند. همچنین، معیارهای خروج از مطالعه به صورت زنانی با بیماری‌های زمینه‌ای (مانند دیابت، فشارخون، بیماری‌های کلازن و اسکولار، بیماری قلبی - عروقی، کلیوی، هموگلوبینوپاتی و بیماران آنمیک زیر درمان)، زنان با پیشینه ناهمجارتی‌های جنینی در زایمان پیشین، زنان با پیشینه زایمان زودرس، پرالامپسی، IUGR، زنان با سن حاملگی بالای ۴۲ هفته و زنانی که به هر دلیل حاضر به ادامه همکاری نباشند، تعریف شد. در این مطالعه دانسته‌های وزن کم هنگام تولد (Low Birth Weight) به صورت وزن نوزاد متولد شده

بارداری مانند وزن کم هنگام تولد و زایمان زودرس افزایش می‌یابد^(۶). برخی ارتباط U شکلی بین غاظت هموگلوبین مادر و پیامدهای نامطلوب بارداری یافته‌اند، بدین مفهوم که افزایش هموگلوبین بیش از $2/13 \text{ g/dL}$ همانند کاهش آن، عوارضی همچون زایمان زودرس، افزایش فشارخون مادر و محدودیت رشد داخل رحمی را در پی داشته است^(۷) گرچه برخی دیگر ارتباطی بین غاظت هموگلوبین و پیامدهای نامطلوب بارداری بدست نیاورده‌اند^(۸). بعضی مطالعات نیز ارتباط منفی بین فری‌تین سرم مادر و وزن تولد و ارتباط مثبت با زایمان زودرس را نشان داده‌اند^(۹-۱۱). همچنین، در بررسی‌های دیگر ارتباط آنمی مادری و آپکار پائین نوزاد نشان داده شده است^(۱۲).

با نگاه به این جستار که دو چرایی بسیار شایع کم‌خونی در میانه بارداری و دوره نفاس کمبود‌آهن و خونرودی است^(۵). در بسیاری از مرگ‌ومیرهایی که به علت عوارض بارداری و زایمان رخ می‌دهد، کم‌خونی سهیم است. زنان سالم در حین زایمان 1000 mL خونرودی دارند؛ اما در زنان دچار آنمی 250 mL خونرودی که برای یک زایمان، طبیعی است، می‌تواند کشنده باشد. پایداری زنان دچار کم‌خونی به عفونت کمتر و خطر بروز عوارض بی‌هوشی و جراحی در آنان بیشتر است^(۱۳) و روی هم رفته آنمی، عوارض و آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای مادر، نوزاد و فرآیند زایمان می‌تواند به همراه داشته باشد^(۱۴). از سوی دیگر ارتباط آنمی و عوارض مادری و جنین در برخی مطالعات نشان داده شده است اما در سایر مطالعات ارتباط، قوی نبوده و حتی گاهی متناقض هم بوده^(۱۵) و اطلاعات موجود برای مسجل کردن آن کافی نبوده است. بنابراین بر این مطالعه با هدف سنجش عوارض مادری و جنینی پس از زایمان در گروه زنان آنمی و غیرآنمی در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان الزهرا رشت انجام شد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه به صورت تحلیلی از نوع مورد- شاهدی طراحی شد که بر ۴۲۲ بیماری که در بیمارستان الزهرا رشت زایمان

(IUFD) مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان ارزیابی نوزاد پس از تولد که شامل آپگار نوزاد دقیقه اول و دفع مکونیوم بود نیز بررسی شد.

پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، داده‌ها با نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش ۱۹ تجزیه و تحلیل شد. گزارش متغیرهای کیفی از جدول‌های فراوانی و درصد و برای گزارش متغیرهای کمی از میانگین و انحراف معیار استفاده شده و برای مقایسه تک تک متفاوت‌های در دو گروه به تناسب از آزمون χ^2 و مستقل T test استفاده شد.

نتایج

این مطالعه بر ۴۲۲ بیماری که در بیمارستان الزهرا رشت زایمان کردند انجام شد. که به طوری که ۲۱۱ نفر از آنان در گروه آنمی و ۲۱۱ نفر از آنان گروه غیرآنمی با توجه به معیارهای ورود و خروج مطالعه ارزیابی و پایش قرار شدند.

کمتر از ۲۵۰۰ گرم، پرهترم به سن حاملگی زیر ۳۷ هفته، آپگار نوزاد که معیاری برای ارزیابی نحوه زنده‌سازی و تعیین نیاز نوزاد که در دقیقه ۱/۵ پس از تولد بکار می‌رود شامل ۵ مؤلفه بود (تپش قلب، تلاش تنفسی، تون عضلانی، برانگیختگی، رفلکس و رنگ) تعریف شد. همچنین، IUFD یا مرگ داخلی رحمی جنین با نداشتن ضربان قلب جنین تعریف شد. IUGR نیز به صورت وزن تخمینی جنین به سن حاملگی پایین‌تر از صدک دهم و دفع مکونیوم به عنوان دفع مدفع توسط جنین در داخل رحم در نظر گرفته شد. در تعریف آنمی برای مادران این مطالعه هموگلوبین کمتر از ۱۱ (Hb<۱۱) در سه ماهه سوم حاملگی معیار قرار داده شد. در مورد عوارض مادری جداشدن زودرس جفت به صورت کندگی جفت از محل خود قبل از تولد جنین تعریف گردیده است. برای عوارض مادری حین بارداری عوارضی مانند جداشدن زودرس جفت و پراکلامپسی ارزیابی شد. از سوی دیگر عوارض جنینی حین بارداری وقایعی مانند LBW، IUGR، پرهترم لیر و مرگ جنینی داخل رحمی

جدول ۱. مقایسه مشخصات دموگرافیک در دو گروه مورد مطالعه

	سطح معنی‌داری	گروه غیرآنمی		سن (میانگین ± انحراف معیار)	BMI
		تعداد = ۲۱۱	تعداد = ۲۱۱		
۰/۴		۲۸/۳۳±۵/۷۱	۲۸/۸۰±۶/۶۸		<۱۸/۵.....
۰/۰۲۹		۷(۳/۳)	۵(۲/۴)		۱۸/۵-۲۵
		۶۳(۲۹/۹)	۴۱(۱۹/۰)		۲۵-۳۵
		۱۲۵(۵۹/۲)	۱۵۴(۷۳)		>۳۵
		۱۶(۷/۶)	۱۲(۵/۷)		
۰/۵۵		۹۰(۴۲/۷)	۸۳(۳۹/۳)		پاریتی
		۱۲۱(۵۷/۳)	۱۲۸(۶۰/۷)		یک بار
					۲ و بیشتر

(جدول ۱). ولی میانگین BMI اختلاف معنی‌دار آماری وجود ندارد ($p=0/13$) میانگین ($۴/۹۹\pm ۴/۱۴$) در گروه آنمی، و میانگین ($۳/۹۶\pm ۲/۵۶$) در گروه غیرآنمی مشاهده شد. پس از کنترل اثر BMI در کنار عامل کم خونی در مدل لجستیک رگرسیون باز هم کم خونی اثری بر پیامدهای بارداری نداشت. توزیع فراوانی پاریتی در زنان آنمی و غیرآنمی زایمان کرده

میانگین سنی در گروه آنمی ($۲۸/۸۰\pm ۶/۶۸$) و در گروه غیرآنمی ($۲۸/۳۳\pm ۵/۷۱$) که پس از بررسی داده‌ها اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه از نظر سنی وجود ندارد ($p=0/4$).

مقایسه فراوانی BMI اختلاف آماری معنی‌دار بین دو گروه از نظر رده‌های گوناگون BMI وجود داشت ($p=0/029$)

از نظر توزیع فراوانی عوارض نوزادی مانند LBW ($P=0.18$)، تولد نوزاد پره‌ترم ($P=0.25$) نمره آپگار نوزادان ($P=0.44$ ، $P=0.57$) IUGR ($P=0.12$ ، $P=0.57$) دفع مکونیوم نوزادان ($P=0.23$) که به شرح فوق گزارش شد، بین دو گروه افراد مورد مطالعه آنما و غیرآنما تفاوت آماری معنی‌داری نداشت (جدول ۲).

به دو گروه اصلی سابقه یکباره پاریتی و دو یا بیشتر تقسیم شدند که اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه دیده نشد ($p=0.55$). (جدول ۱) از نظر توزیع فراوانی عوارض مادری بارداری مانند پراکلامپسی ($P=0.79$) و جداشدن زودرس جفت ($P=0.72$) اختلاف معنی‌دار آماری بین دو گروه زنان آنما و غیرآنما وجود نداشت.

جدول ۲. مقایسه عوارض مادری و جنینی در دو گروه مورد مطالعه

	گروه غیر آنما		عوارض مادری
	سطح معنی‌داری	تعداد = ۲۱۱	
	تعداد = ۲۱۱	تعداد = ۲۱۱	نوع زایمان
۰/۷۹	۷(۳/۳)	۶(۲/۸)	پراکلامپسی
۰/۸۴	۸۹(۴۲/۲)	۸۷(۴۱/۲)	طبیعی
	۱۲۲(۵۷/۸)	۱۲۴(۵۸/۸)	سازاری
۰/۷۲	۵(۲/۴)	۳(۱/۴)	جداشدن زودرس جفت
			عوارض جنینی
۰/۱۸	۶۱(۲۸/۹)	۴۸(۲۲/۷)	وزن کم هنگام تولد (زیر ۲۵۰۰ گرم)
۰/۲۵	۷۵(۳۵/۵)	۶۳(۲۹/۹)	زایمان زودرس (زیر ۳۷ هفته)
۰/۴۴	۱۷(۸/۱)	۱۲(۵/۷)	آپگار زیر ۷
۰/۱۲	۴(۱/۹)	۰	IUFD
۰/۵۷	۸(۳/۸)	۵(۲/۴)	IUGR
۰/۲۳	۱۰(۴/۷)	۱۷(۸/۱)	مکونیوم

از عوارضی که کم خونی زن باردار برای مادر و جنین به همراه دارد می‌توان پیشگیری کرد (۱۶). در مطالعه مروری Noronha و همکاران با عنوان کم خونی در بارداری در سال ۲۰۱۲ چاپ کردند، ۱۱ مطالعه در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۰۷ در جوامع آسیایی ارزیابی شد روی هم رفته ۱۹۳۱۳۱ نفر در این مطالعات بررسی شدند که در پایان نتیجه‌گیری شد که بیشترین شیوع کم خونی در زنان باردار 80% و کمترین آن 18% بود (۱۷).

بعد از کم خونی فقر آهن، شایع‌ترین کم خونی تغذیه‌ای ناشی از کمبود فولات است که این نوع کم خونی به نوبه خود می‌توانند باعث عوارض بارداری مانند جدا شدن زودهنگام جفت، سقط خود به خودی، ناهنجاری‌های جنینی و پراکلامپسی شود (۱۸). مطالعات گسترده از سال‌ها قبل در این زمینه در کشورهای گوناگون جهان مانند ایران انجام شده‌است (۵). با نگاهی کوتاه به مطالعات گذشته می‌توان

توزیع فراوانی فری‌تین ($44/68 \pm 29/04$) و با میانه ۴۰ گزارش شد، همچنین توزیع فراوانی TSH ($2/16 \pm 1/53$) میانه آن برابر ۲ که فقط در زنان آنما ارزیابی شد. همچنین کمینه و بیشینه فری‌تین ارزیابی شده به ترتیب ۱/۵ و ۱۷۱ گزارش شد.

بحث و نتیجه‌گیری

یکی از متغیرهای فیزیولوژی در بارداری که به صورت نهفته می‌تواند سلامت جنین و مادر را به خطر اندازد اختلال هماتولوژیک و به طور ویژه آنما باشد. گرچه بسیاری از این این آنماها غیرفیزیولوژی بوده که سبب زایمان زودرس، تولد نوزاد کم وزن، افزایش مرگ‌ومیر جنین، افزایش خونریوی پس از زایمان و زجر جنین می‌شود (۱-۳). شایع‌ترین کم خونی در دوران حاملگی کمبود آهن است که با تجویز آهن تکمیلی به راحتی پیشگیری می‌شود. به این ترتیب

بود. همین طور، در مادران آنمی ۷۵ مورد نوزاد پره‌ترم متولد شدند که در مادران غیرآنمی ۶۳ مورد بود. که نشان‌دهنده تفاوت بالینی در یافته‌های این مطالعه است. برخی دیگر نیز همانند مطالعه ما ارتباطی بین غلظت هموگلوبین و پیامدهای نامطلوب بارداری بدست نیاوردند^(۸). اما در برخی دیگر ارتباط آنمی مادری و اپگار پائین نوزاد عنوان شده است. مانند مطالعه Umber در سال ۲۰۰۷ که نتیجه‌گیری کرد خطر زایمان زودرس، وزن کم حین تولد، آپگار پائین دقیقه اول همچنین خطر IUGR بین زنان آنمی بیش از زنان غیرآنمی است^(۹). همچنین، یافته‌های مطالعه در زمینه فراوانی میزان هموگلوبین در افراد آنمی نشان داد بیشترین فراوانی هموگلوبین در بازه ۱۰/۹ که ۱۰/۷٪ و کمترین فراوانی متعلق به بازه هموگلوبین ۷ تا ۷/۹ که شامل ۱/۴٪ از همه جامعه آماری آنمی نشان داده بود. همان‌طور که بارز است بخش بیشتر بیماران در گروه آنمی، آنمی خفیف دارند که این جستار می‌تواند توجیه‌گر نتایج در زمینه عوارض مادری و جنینی نسبت به دیگر مطالعات مشابه باشد به این معنی که شاید از عواملی که در مطالعه ما سبب شد عوارض آنمی به طور معنی‌دار در مادر و نوزاد آن دیده نشود این بود که افراد مورد مطالعه ما بیشتر دچار آنمی خفیف دوران بارداری بودند و افرادی که آنمی شناخته شده و زیر درمان داشتند از مطالعه کنار گذاشته شده‌بودند. و این خود لزوم انجام پژوهشی یا بررسی عوارض مادری و جنینی را در مادران آنمی زیردرمان با علل گوناگون مطرح می‌سازد.

از سوی دیگر برای ارزیابی نوع آنمی در زنان آنمی میزان فری‌تین نیز در آنان سنجدیده شد. که میانگین و انحراف معیار فری‌تین ۴۴/۶۸±۲۹/۰۴ و میانه ۴۰ بدست آمد. کمینه و بیشینه فری‌تین ارزیابی شده به ترتیب ۱/۵ و ۱۷۱ بدست آمد. (۸۴/۸) درصد فری‌تین بالای ۱۵ داشتند که البته فری‌تین بالا به تنها یک فقر آهن را رد نمی‌کند چون یک پرتوئین فاز حاد است و در شرایط گوناگون مانند التهاب و عفونت ممکن است افزایش یابد. بهتر است در مطالعات دیگر در کنار آن میزان اشباع آهن نیز ارزیابی شد. به دلایل ناشناخته اختلال تیروئید در زنان، ۱۰ برابر شایع‌تر از مردان است. پیامدهای همراه اختلال تیروئید در زنان دربردارنده خونری‌های

دریافت که در بیشتر مطالعه‌ها، مادران باردار زیر ۱۸ ساله از نگاه دورمانده‌اند در حالی که نیاز به آهن به سبب هم‌افزایی نیازهای رشدی خود مادر در کنار نیازهای دوران بارداری افزایش می‌یابد^(۷). اما در مطالعه ما پس از بررسی داده‌ها بین دو گروه اختلاف آماری معنی‌داری از نظر سنی و پاریتی وجود نداشت. همچنین پس از کنترل اثر BMI در کنار عامل کم‌خونی در مدل لجستیک رگرسیون باز هم کم‌خونی اثری بر پیامدهای بارداری نداشت.

در مطالعه ما اختلاف آماری معنی‌دار بین دو گروه از نظر عوارض بارداری مانند پراکلامپسی ($p=0/79$) و جداشدن زودرس جفت ($0/72 = p$) وجود نداشت. هرچند اختلاف آماری معنی‌دار بین دو گروه از نظر پراکلامپسی و جداشدن زودرس جفت وجود نداشت اما از نظر بالینی افراد دچار پراکلامپسی در گروه آنمی $3/3$ درصد بود که بیشتر از افراد غیرآنمی ($2/8$ درصد) است. همچنین، جداشدن زودرس جفت در افراد آنمی $2/4$ درصد و در افراد غیرآنمی $1/4$ درصد بود که این تفاوت از نظر بالینی اهمیت ندارد.

اما در یک مطالعه گذشته‌نگر توسط Emre Karashin در ترکیه در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۳ پره‌ترم لیر در گروه آنمی $9/9$ ٪ و در گروه غیرآنمی $2/3$ ٪ نو پراکلامپسی در گروه آنمی نسبت به گروه غیرآنمی بالاتر بود. (۱۵) ارتباط آنمی و عوارض نوزادی مداوم نبوده است. برخی دیگر آنمی را ریسک فاکتوری برای پیامدهای نوزادی دانسته‌اند در صورتی که سایر مطالعات آن را تأیید نکرده است^(۱۹).

اما در مطالعه ما اختلاف آماری معنی‌داری از نظر عوارض نوزادی مانند نمره اپگار پائین، وزن پائین هنگام تولد، پره‌ترم بودن نوزادان، دفع مکونیوم، IUGR و IUFD بدست نیامد. اما در ارزیابی نمره اپگار در نوزادان زنان آنمی، نمره اپگار زیرهفت، $2/4$ درصد بیش از زنان غیرآنمی دیده شد و همچنین مرگ داخل رحمی جنین نیز در هیچ‌کدام از زنان غیرآنمی دیده نشد اما در مادران آنمی ۴ مورد ($1/9$ ٪) مرگ داخل رحمی جنین از 211 مورد گزارش شد یا نوزادان متولد شده با IUGR در زنان آنمی $1/4$ درصد بیشتر دیده شد. از سوی دیگر تعداد چشمگیری از نوزادان وزن پائین هنگام تولد متعلق به مادران آنمی و $6/2$ درصد بیش از مادران غیرآنمی

این که کم خونی حین بارداری به شرایط فرهنگی و اقتصادی، سن بارداری، شرایط تغذیه‌ای، بررسی پیش از زایمان، و دیگر عوامل بستگی دارد و از سویی این مطالعات در سال‌های گوناگون و در شرایط اجتماعی اقتصادی متفاوت و شهرهای گوناگون انجام شده است، شاید بتوان علت ناهمسویی گزارش‌ها را تا حدی توجیه کرد.

در پایان با وجود حجم نمونه بالای این مطالعه و همچنین، زمان طولانی انجام آن در مدت ۲ سال و این که گردآوری نمونه‌ها در یک مرکز مرجع در استان صورت گرفته است، پژوهش‌های گسترده‌تر و با همکاری مراکز متعدد پیشنهاد می‌شود.

بنابراین، پیشنهاد می‌شود به عنوان یک طرح ملی در سراسر کشور و با همکاری مراکز بهداشتی سطح کشور در یک بازه زمانی مشخص پژوهشی مشابه در سطح کلان طراحی و اجرا شود تا عوارض مادری و جنینی در زنان آنمنی با علل گوناگون (مانند علل ارشی، کمبود تغذیه‌ای، کمبود فولات و غیره) نیز بررسی شود. همچنین، با توجه به این جستار که جمع آوری نمونه آنمنی با علل گوناگون در یک مرکز منفرد به دلیل نادر بودن، محدود بودن تعداد حجم نمونه به سال‌های متتمادی زمان نیاز دارد که می‌تواند خطای مطالعاتی قابل توجه ایجاد نماید، اهمیت طراحی یک مطالعه گسترده و جامع در سطح کشور را توجیه می‌کند

نویسنده‌گان اعلام می‌دارند که هیچ‌گونه تضاد منافعی ندارند.

غیرطبیعی، افزایش شیوع کیست‌های تخدمانی، سقط مکرر، وزن کم هنگام تولد، نارسایی تخدمانی و گالاكتوره است (۲۱-۲۴). در مادران دچار کمکاری تیروئید میزان اختلال تکامل عصبی روانی جنین، اختلال رشد داخل رحمی، وزن کم هنگام تولد، زجر جنین، سقط خودبه‌خودی، مرگ جنین و همچنین شیوع نازایی، زایمان زودرس، جداسدن زودرس جفت و پراکلامسی افزایش می‌یابد (۲۵-۲۶). در مطالعه‌ایی که نادری و همکاران در سال ۹۰ به چاپ رسانند در بررسی میزان شیوع کمکاری تیروئید در ۶۲۰ خانم باردار مراجعه‌کننده با سن حاملگی کمتر از ۲۰ هفته، به این نتیجه رسیدند که شیوع کمکاری تیروئید ۱۰/۱۵٪ و شامل ۲/۲۵٪ آسکار و ۷/۹٪ تحت بالینی است. و در ادامه نتیجه‌گیری کردند که کمکاری تیروئید با هیچ‌یک از عوامل خطر و عوامل مادری و جنینی رابطه معنی‌داری ندارد ($P > 0.0025$) (۲۷). همچنین، با وجود این که یکی از اختلال‌هایی که می‌تواند در این مطالعه تورش ایجاد کند، وجود کمکاری تیروئید در زنان باردار است، میزان TSH سرم نیز در زنان آنمنی سنجیده شد. که توزیع فراوانی که با میانگین و انحراف معیار 16 ± 5.3 و میانه ۲ به دست آمد. کمینه و بیشینه TSH ارزیابی شده به ترتیب ۰/۱ و ۱۳ بود و همان‌طور که دیده می‌شود در بیشتر بیماران TSH در محدوده نرمال بود.

به طور کلی نتایج ناهمسو چه در کشورهای گوناگون جهان و چه در ایران گزارش شده است. افزون بر آن در شهرهای گوناگون ایران نیز نتایج گزارش شده ناسازگارند، با توجه به

منابع

- Rasmussen K.M., Stoltzfus R.J. New evidence that iron supplementation during pregnancy improves birth weight: new scientific questions. *Am J Clin Nutr.* 2003;78(4):673-674
- salah zehi H,khojaste F.Nursing mothers and infant health. Glban Publication, Tehran (1379): pp. 56-55.[Text in persian].
- Rasmussen K.M. Deficiency or iron-deficiency anemia and weight at birth, length of gestation and perinatal mortality. *J Nutri.* 2001;131:590-603.
- Bondevik G.T., Lie R.T., Ulstein M., Kvale G. Maternal hematological status and risk of low birth weight and preterm delivery in Nepal. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 2001;80(5):402-8.
- Navidian, A., Ebrahimi Tabas, E., Sarani, H., Ghalge, M., & Yaghobinia, F. (2006). The prevalence of Iron-deficiency anemia in the pregnant women referring to health centers in Zahedan. *Journal of Reproduction and Infertility*, 132-138.
- Lindsay H. Anemia and iron deficiency, effects on pregnancy outcome. *Am J clin Nutr.* 2000; 87: 360 – 5.
- Levy A, Fraser D, Katz M, Mazor M, Sheiner E. Maternal anemia during pregnancy is an independent risk factor for low birth weight and preterm delivery. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2005; 122(2): 182-6.
- Chang Sc, Brien ko, Nathanson Ms. Hemoglobin Concentrations influence birth outcomes in pregnant

- African-American adolescents. *J Nutr* 2003; 133(7): 2348-55.
9. La Flamme EM. Maternal Hemoglobin Concentration and pregnancy outcome: A study of the effects of elevation in El Alto, Bolivia. *MJM* 2010; 13 (1): 47-55.
10. Colden bery R, Tamar a T, Dubard M. Plasma ferritin and pregnancy outcome. *Am J obslet Gynecol.* 2006; 87: 360 – 5.
11. Tamura T, Golden berg R, Johanston K. Serum Ferritin, a Predictor of early spontaneous preterm delivery. *Obstet Gynecol.* 2007; 87: 380 – 6.
12. Robert Wilson et al. Midwifery Women diseases. Darius Kazemi translator. Tehran: pajouh publication, (1371) pp. 3-241.[text in persian].
13. rahbar N,ghorbani R,khan soltani S,The prevalence of individual risk factors associated with anemia in the third trimester of pregnancy in women referred to the clinic in Semnan University of Medical Sciences. *Koomesh Journal*, Vol. 1, No. 4, Summer 1379. 31- 36.[text in persian]
14. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL. *Williams Obstetrics*.22nd ed. USA: McGRAW-HILL Medical publishing Division; 2010. p. 1320-2.
15. Karashin E, ceyhan ST, Goktalya U. Maternal anemia and perinatal outcome. *Perinatal Jornal.* 2007 Dec; 15(3) 127 – 130.
16. Farzan R, Qamarunia, Amana M. Prevalence of anemia in pregnant women nad its effects on maternal and fetal morbidity and mortality. *Pak J Med.* 2010 January – March; 26(1): 92 – 95.
17. Noronha, J. A., Al Khasawneh, E., Seshan, V., Ramasubramaniam, S., & Raman, S. (2012). Anemia in pregnancy-consequences and challenges: a review of literature. *Journal of South Asian Federation of Obstetrics and Gynecology*, 4(1), 64-70.
18. Streiff RR and Little AB. Folic acid deficiency in pregnancy. *N Engl J Med* 1967; 276(14): 776-770.
19. C Unntingham F C, Leveno K J, Bloom S, Havth J, Rouse D, Spong C Y. *Williams Obstetrics*. 2010; 51: 1079 – 80.
20. Umber Jalil B, Yadmeen K, Razia N. Relationship between maternal hemoglobin and perinatal outcome. *Rawal Med J.* 2007 Kb: 7(32): 102 – 104
21. alizadeh L,akbar zadeh M,ramzi M,mir ershad F. (2011). Birth outcomes in pregnant women with normal levels of hemoglobin in the first trimester of pregnancy. *Health Journal*, 2 (2).[Text in persian]
22. Cooper DS. Thyroid hormone and pregnancy. *JAMA* 2000; 259(1): 31-75
23. Franklyn JA. The mamgement of hypothyroidism. *New Engel J Med* 1994; 330(24): 1731-8.
24. Kaplan MM. Monitring thyroxine treatment during pregnancy. *Thyroid* 1992; 2(2): 147- 52.
25. Lafranchi S. Congenital hypothyroidism: etiologies, diangnosis, and Management. *Thyroid* 1999; 9 (7): 735-40.
26. Kasper D.L, Braunwald E, Hauser S, Longo D, Jamesson J.L, Fauci A.S. *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 16th ed., USA, Mc graw-Hill, 2005; PP1732-52.
27. naderi T,honarvar Z,bahram pour A,yousef zadeh GH.(2012).The prevalence of hypothyroidism in pregnant women upon to risk factor referred to the shahid dadbin clinic in Kerman. *Kerman University of Medical Sciences*, 19 (3), 225-232.

Comparison of Post-Delivery Maternal and Fetal Complications among Anemic and Non –anemic Women

Milani F(MD)¹-Motamed B(MD)²- Salamat F(MSc)³- *Ghodsi Khorsand SM(MD)¹

***Corresponding Address:** Department of Gynecology, Al-zahra Hospital,School of medicine , Guilan University of Medical Sciences, Rasht,Iran
Email: idsdg2050@gmail.com

Received: 01/Jun/2015 Revised: 27/Aug/2015 Accepted: 01/Oct/2015

Abstract

Introduction: Anemia is one of the most common problems during pregnancy, whose maternal and fetal complications have been reported in many studies, most of which do not show any correlations and some at times were in contrast.

Objective: The present study aims to compare post-delivery maternal and fetal complications among anemic and non – anemic women who have been admitted to Al-Zahra hospital for delivery.

Materials and Methods: This study was conducted through a case-control analysis among 422 pregnant women who delivered their babies in the third trimester of their pregnancy. 211 cases of anemic women with HB<11 considering maternal complication and placenta abruption, preterm labor, and fetal complications were compared with (211) non-anemic pregnant women. The data were collected and analyzed by SPSS application (version19). Independent t-test and Chi-square test were used to analyze the data.

Results: The mean age was 28.80 ± 6.68 yrs for anemic women and 28.33 ± 5.71 yrs for the non-anemic. There was a significant difference between various levels of BMI among anemic and non-anemic women who had delivered a baby ($p=0.029$) but no significant statistical difference between the means of the two groups was observed ($p=0.13$). There was no statistically significant difference between the two groups in terms of parity ($P=0.55$), pre-eclampsia($P=0.79$), placenta abruption($P=0.72$), preterm labor($P=0.25$), neonatal Apgar score ($P=0.44$) •IUFD ($P=0.12$), IUGR($P=0.57$),neonatal meconium excretion($P=0.23$). The mean, the standard deviation, and the median of ferreting among anemic women were 44.68 ± 29.04 and 40, respectively and the mean and the standard deviation of TSH were 1.53 ± 2.16 and its median was 2.

Conclusion: In this study, a significant association between maternal anemia and pregnancy and fetal complications was observed. The results could be due to the removal and treatment of people with hereditary anemia. Therefore, further studies considering different types of anemia are suggested.

Conflict of interest: non declared

Keywords: Anemia \ Epidemiology \ Pregnancy Complications \ Pregnancy Trimester, Third

Journal of Guilan University of Medical Sciences, No: 97, Pages: 61-68

Please cite this article as: Milani F, Motamed B, Salamat F,Ghodsi Khorsand SM. Comparison of Post-Delivery Maternal and Fetal Complications among Anemic and Non –anemic Women. J of Guilan Univ of Med Sci 2016; 25(97):61-68. [Text in Persian]

-
1. Department of Gynecology, Al-zahra Hospital,School of medicine , Guilan University of Medical Sciences, Rasht,Iran
 2. Department of Internal Medicine, Razi Hospital, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht , Iran
 3. Research Vice Cansollar Ship, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran