

عملکرد کارکنان اتاق عمل در رعایت ایمنی تزربقات: یک مطالعه مشاهده‌ای

کریم باقری^۱، بهرام نبی‌لو^۲

تاریخ دریافت ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ تاریخ پذیرش ۱۳۹۵/۰۲/۰۲

چکیده

پیش‌زمینه و هدف: هدف از اقدامات پزشکی حفظ حیات و بهبود سلامتی است و کارکنان بهداشتی درمانی و بخصوص پرستاران، مسئولیت ارائه مراقبت همراه با ایمنی را به عهده دارند. ایمنی تزربقات در القا، حفظ و اتمام بیهوشی بیماران از اهمیت زیادی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان رعایت اصول ایمنی تزربقات در اتاق‌های عمل طراحی و اجرا گردید.

مواد و روش کار: این مطالعه توصیفی در سال ۱۳۹۳-۹۴ در اتاق‌های عمل یکی از مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه صورت گرفت. در این پژوهش، عملکرد کارکنان در انجام ایمن تزربقات در یک دوره ششم‌ماهه بررسی شد. چکلیست استاندارد سازمان جهانی بهداشت برای ثبت و جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها: در طول مدت مطالعه ۳۴۵ تزربق بهصورت مشاهده‌ای ثبت شد. مقایسه سه حیطه قبل، حین و بعد از تزربق نشان داد عملکرد کارکنان در رعایت موازین، به ترتیب در مرحله قبل از تزربق بیشترین (۹۰/۱ درصد) و در مرحله پس از تزربق کمترین (۷/۷ درصد) میزان را دارند. آزمون تی زوجی نشان داد که بین دو جنس از نظر میزان رعایت موازین تزربق ایمن اختلاف آماری معنی‌دار وجود دارد ($P=0.024$). ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین رعایت موازین تزربق ایمن با هر دو متغیر سن و سابقه کار ارتباط مستقیم وجود دارد و همبستگی با سابقه کار از نظر آماری معنی‌دار است ($P=0.014$).

بحث و نتیجه‌گیری: تبیین اهمیت موضوع، آموزش کارکنان و تدوین، تقویت و اجرای موازین نظارتی مواردی هستند که به رعایت بیش از پیش ضوابط تزربقات ایمن کمک می‌کنند.

کلیدواژه‌ها: اتاق عمل، کارکنان درمانی، تزربقات، ایمنی بیمار

مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره چهاردهم، شماره سوم، پی‌درپی ۸۰، خرداد ۱۳۹۵، ص ۱۹۱-۲۰۰

آدرس مکاتبه: ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت عمومی، تلفن: ۹۱۴۳۴۹۱۲۱۹

Email: bnabil@umsu.ac.ir

مقدمه

مراقبتی و تلاش کارکنان بر بهبود ایمنی و قابل اطمینان بودن خدمات متمرکز شود^(۳). هدف از خدمات ارائه شده نیز حفظ حیات و بهبود سلامتی است و تمام کارکنان بهداشتی درمانی و بخصوص پرستاران به عنوان مهم‌ترین گروه که وقت زیادی صرف بیماران می‌کنند، مسئولیت پیشگیری از انتقال عفونت‌های ناشی از مراقبت را به عهده دارند. توجه و تأمل در تزربقات ایمن نیز به عنوان بخشی از مسئولیت در محافظت از بیماران و کارکنان است^(۴).

ایمنی کارکنان و بیماران در کشورهای مختلف توسط مراجع مسئول مورد تأکید است و کارفرمایان باید محیط کاری ایمن و سالمی برای کارکنان تأمین کنند^(۵). مؤسساتی که از فرهنگ

برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی یکی از ارکان مهم پیشرفت هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهد و اطمینان از ارائه خدمات کیفی و ایمن در بخش سلامت، از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است^(۱) و بیمارستان‌ها که به عنوان جزء مهمی از نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی، ارائه خدمات درمانی پیچیده را در یکی از سطوح ارائه خدمات به عهده دارند، محلی برای انتقال بیماری‌ها یا صدمه به بیماران، کارکنان و سایر افراد نیز هستند^(۲).

مؤسسات بهداشتی درمانی و بهویژه بیمارستان‌ها باید از سطح قابل قبولی از فرهنگ ایمنی برخوردار باشند و تمام فرآیندهای

^۱ کارشناس بیهوشی، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی، ارومیه، ایران

^۲ دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)

از ویال‌های چند دوزی، استفاده نادرست از ویال‌های تک‌دوز، استفاده نادرست یا استفاده مجدد از سرسوزن، سرنگ و ستهای انفوژیون می‌شود (۲۰). برخی مطالعات در اواسط دهه ۹۰ میلادی نشان داد که ۳۹درصد (۲۱)، که در سال ۲۰۰۲ این بیماران متعدد استفاده مجدد می‌کنند (۲۲)، داده‌های حاصل از میزان به ۱درصد تا ۳درصد کاهش یافت (۲۳)، داده‌های این یک بنیاد ایمنی بیمار در بیهوشی بیانگر استفاده مجدد کلینیسین‌ها تا ۲۷درصد از سرنگ‌های انفوژیون پریوفول است (۲۴).

مطالعات اندک انجام‌شده در کشور نشان می‌دهد میزان آگاهی کارکنان بخش سلامت از نحوه انجام تزریقات ایمن کافی نیست و تزریق کنندگان مراحل مختلف قلی، حین و بعد از تزریق فقط حدود ۵۰درصد موازین را رعایت می‌کنند (۲۵) و آسیب ناشی از سرسوزن و اشیاء نوک‌تیز در بین کارکنان شایع بوده (۲۶) و میزان بروز آسیب‌های ناشی از سرسوزن در کارکنان درمانی قابل توجه می‌باشد که شایع‌ترین آسیب‌ها به علت تماس تصادفی با سرسوزن پس از انجام تزریق، سرپوش‌گذاری مجدد سرسوزن، آماده‌سازی دارو و در هنگام تزریق، بوده است (۲۷). همچنین نحوه انجام تزریقات ایمن مطلوب نبوده (۲۸) و بیشتر از ۵۰درصد پرستاران سابقه صدمه با سرسوزن را داشته‌اند (۲۹). برخی مطالعات نیز بیشترین آسیب با سرسوزن را در اتاق‌های عمل گزارش کرده‌اند (۳۰).

در بیمارستان‌ها اتاق‌های عمل از جمله بخش‌های مهمی هستند که رگ‌گیری، انفوژیون، تزریقات و پونکسیون جزو انفکاک‌ناپذیر فرآیند بیهوشی هستند که امکان ایجاد و القاء بیهوشی را میسر کرده و انجام اعمال جراحی را ممکن می‌کنند. مطالعه حاضر نیز باهدف بررسی عملکرد کارکنان در این زمینه در اتاق‌های عمل یک مرکز آموزشی درمانی به عنوان مرکز رفالت استانی و دارای دو مجموعه اتاق عمل فعال طراحی و اجرا گردید.

مواد و روش کار

این مطالعه مشاهده‌ای در سال ۱۳۹۳-۹۴ در اتاق‌های عمل یکی از مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه صورت گرفت. جامعه هدف، کارکنان اتاق عمل و جامعه موردمطالعه کارکنان شاغل در اتاق‌های عمل مرکز آموزشی درمانی منتخب بودند. واحد نمونه‌گیری شامل تزریقات صورت گرفته در فاصله زمانی شش ماه (بهمن ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۴) بود. معیارهای ورود شامل: درگیر بودن تزریق کننده در فرآیند آماده‌سازی، تگهداری و تزریق دارو، انجام تزریق در نوبت‌کاری صبح، حداقل شش ماه اشتغال تزریق کننده در اتاق عمل و در مورد دانشجویان یک‌ترم سابقه

ایمنی برخوردار هستند، شرایط کاری مناسبی برای کارکنان تأمین می‌کنند و به بهبود ایمنی و کیفیت مراقبت ملزم هستند (۶). تزریقات یکی از رایج‌ترین روش‌ها در تأمین و حفظ سلامت است و سالانه نزدیک ۱۶ میلیارد تزریق در کشورهای درحال توسعه صورت می‌گیرد که ۹۵ درصد آن‌ها جنبه درمانی دارد (۷). ایمنی تزریقات به عنوان جز لاینک برنامه کنترل و پیشگیری از عفونت، با توجه به نقش آن در انتقال بیماری‌ها اهمیت زیادی دارد (۸). در دهه گذشته تزریقات غیر ایمن از عوامل زمینه‌ساز اپیدمی عفونت‌های بیمارستانی بوده‌اند (۹).

مطالعات متعدد تزریقات غیر ایمن را از تمام نقاط جهان و بخصوص از آفریقا، آسیا و کشورهای بلوك شرق گزارش کرده‌اند (۱۰). میزان تزریقات غیر ایمن از ۱۵درصد در اروپای شرقی تا ۵۰درصد در قاره آسیا متفاوت است (۱۱). در کشورهای درحال توسعه انجام تزریقات برای کنترل بیماری‌ها امری متناول و اغلب غیرضروری و البته غیر ایمن است (۱۲). بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان تزریقات غیر ایمن در برخی مناطق جهان مثل آسیای جنوب شرقی بالا بوده و به ۷۵درصد نیز می‌رسد (۱۱). سهم تزریقات غیر ایمن از بار جهانی بیماری‌ها بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت برای سال ۲۰۰۸ شامل ۳۴۰۰۰ مورد عفونت HIV، ۱۵ میلیون مورد عفونت هپاتیت B، یک‌میلیون مورد عفونت هپاتیت C، سه میلیون عفونت باکتریایی و ۸۵۰۰۰ عفونت محل تزریق بوده است (۱۳). علل تزریقات غیر ایمن پیچیده بوده و دارای جنبه‌های ساختاری، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی است (۱۴).

بخش اعمال جراحی یا اتاق‌های عمل از کانون‌های جذب و مراکز مصرف دارو و بهویژه داروهای تزریقی در بیمارستان می‌باشد. با اینکه عده داروهای مصرفی در این واحد، خاص بوده و مستلزم هوشیاری و دقت زیادی نسبت به سایر بخش‌های است، ولی مصرف آن‌ها معمولاً با موازین ایمنی کمتری همراه است (۱۵)، چراکه مدیریت مصرف دارو در این بخش به خاطر پیچیدگی خاص این واحد و بازه زمانی کوتاه آماده‌سازی و مصرف دارو متفاوت از سایر بخش‌های است (۱۶، ۱۷). بر همین اساس کارکنان درگیر در فرآیند تزریق در اتاق عمل و به عبارتی اعضای تیم بیهوشی نسبت به سایر کارکنان، بیشتر در معرض عفونت‌های مربوط به عوامل بیماری‌زای منتقله با خون هستند (۱۸).

در پروسیچرهای بیهوشی در اتاق‌های عمل، مشکلات مربوط به ایمنی تزریقات مانند استفاده مجدد از سرنگ و ویال‌های چند دوزی^۱ گزارش شده‌اند (۱۹). تزریقات غیر ایمن توسط کارکنان بیهوشی یکی از طرق انتقال بیماری است که شامل استفاده نادرست

^۱ Multi dose

بیهودشی با میزان ۱۵۷ مورد (۴۵/۵ درصد) انجام شده بود. ویژگی‌های دمو گرافیک تزریق کنندگان در جدول ۱ ذکر شده‌اند. در رعایت اصول ایمنی قبل از تزریقات، بیشترین میزان مراعات ضوابط تزریق ایمن شامل ۹۹ درصد تزریقات مشاهده شده در گزینه "استفاده از سرنگ یکبار مصرف استاندارد" وجود داشت. کمترین مراعات در گزینه "شستشوی دستها با آب و صابون قبل از آماده‌سازی دارو برای تزریق"، با میزان ۱۸ درصد مشاهده شد (جدول ۲).

در موضوع رعایت اصول ایمنی حین تزریقات "استفاده از سرنگ و سرسوزن در یک بسته سالم یا دارای محافظه" در ۳۳۸ مورد (۹۹ درصد تزریقات) رعایت شده بود که بیشترین میزان در بین گزینه‌های این دسته بود. ۳۱ درصد داروهای تزریقی پوری بودند. در ۳۷ درصد تزریقات مشاهده شده از دستکش جدید و در ۸ درصد موارد از دستکش قبلی استفاده شد و در ۵۵ درصد موارد از دستکش استفاده نشد (جدول ۳).

موضوع رعایت اصول بعد از تزریقات بررسی شد. در استفاده از ویال‌های چند دوزی، پس از برداشتن یک دوز، در ۵۲ درصد موارد، سرسوزن عوض شده بود. سرپوش‌گذاری سرسوزن بعد از تزریق در ۲۸ درصد تزریقات مشاهده شده صورت نگرفت، فقط در ۳ درصد تزریقات مشاهده شده سرپوش‌گذاری سرسوزن با یکدست و در ۶ درصد تزریقات مشاهده شده سرپوش‌گذاری سرسوزن با دودست صورت گرفت (جدول ۴).

مقایسه سه حیطه قبل، حین و بعد از تزریق نشان داد عملکرد کارکنان در رعایت موازین تزریق ایمن قبل از تزریق ۹۰/۱ درصد، حین تزریق ۴۴ درصد و پس از تزریق ۳۷/۷ درصد بود که در مرحله قبل از تزریق بیشترین و در مرحله بعد از تزریق کمترین میزان را داشت.

آزمون تی زوجی نشان داد میزان رعایت موازین تزریق ایمن اساس جنس از نظر آماری معنی دار بوده ($P=0.024$) و میزان رعایت موازین توسط خانم‌ها بیشتر از آقایان بوده است. همچنین آزمون تی زوجی نشان داد میزان رعایت موازین تزریق ایمن برحسب دو مجموعه اتاق عمل A و B از نظر آماری معنی دار نبود ($P=0.113$). ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین رعایت موازین تزریق ایمن با هر دو متغیر سن و سابقه کار ارتباط مستقیم وجود داشت و همبستگی با سابقه کار از نظر آماری معنی دار بود ($P=0.014$). آزمون آنالیز واریانس نشان داد در زمینه رعایت موازین تزریق ایمن بین چهار گروه درگیر در تزریقات، شامل کارشناسان، دستیاران، انتدھا و دانشجویان بیهودشی از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود نداشت ($P=0.167$) (جدول ۴).

کارآموزی در اتاق عمل و کامل بودن فرآیند تزریق‌ها از آماده‌سازی تا رگ‌گیری و تزریق دارو بود. معیارهای خروج شامل: انجام یکی از مراحل تزریق خارج از اتاق عمل و اشتغال کمتر از شش ماه در اتاق عمل بود.

ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این بررسی، چکلیست استاندارد ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی بود (۲۹). چکلیست شامل ۱۶ گویه به صورت سه گزینه‌ای "بلی، خیر و مورد نداشت" در سه سازه قبل، حین و بعد از تزریق تنظیم شد. برای روایی و پایابی چکلیست با توجه به عینی بودن داده‌های موردنیاز و عدم نیاز به تفسیر و استنتاج مشاهدات و تکمیل چکلیست طبق مشاهدات عینی، قبل از مرحله اصلی جمع‌آوری داده‌ها، دو نفر بیست مورد چکلیست را همزمان و بهطور مستقل از هم تکمیل و نتایج باهم مقایسه شد و تغییرات جزئی لازم اعمال شد. برای تعیین پایابی از محاسبه آلفا کرونباخ استفاده شد ($\alpha=0.715$). چکلیست مورد استفاده در تنظیم دستورالعمل تزریق ایمن وزارت بهداشت نیز مورد استناد قرار گرفته است (۱۰).

در این پژوهش تمامی چکلیست‌ها به صورت مشاهده‌ای نامحسوس و بدون اطلاع تزریق کننده تکمیل شد تا داده‌های به دست آمده با کمترین میزان خطأ و سوگیری جمع‌آوری گردد. برای رعایت نامحسوس بودن جمع‌آوری داده‌ها، از چهار نفر از کارکنانی استفاده شد که سرکشی آن‌ها به اتاق‌های عمل و یادداشتبرداری جزو فعالیت‌های جاری و روزمره بود و ورود و خروج آن‌ها به اتاق‌های عمل عادی بود. تمامی داده‌های جمع‌آوری شده در محیط نسخه ۲۱ نرمافزار SPSS وارد شد.

برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی مثل فراوانی، نسبت، درصد، میانگین، واریانس و انحراف معیار استفاده شد. بررسی تفاوت آماری بر اساس جنس و دو مجموعه اتاق عمل با T-Test مستقل و بر اساس شغل تزریق کننده با استفاده از آنالیز واریانس صورت گرفت. بررسی همبستگی بین سن و تزریقات با ضریب همبستگی پیرسون آنچه شد. سطح معنی داری $p<0.05$ تعیین شد. ملاحظات اخلاقی در انجام پژوهش مدنظر بود و کسب مجوز کمیته اخلاق از معاونت پژوهشی دانشگاه و بدون اسم و مشخصات بودن چکلیست‌ها رعایت گردید.

یافته‌ها

در طول مدت مطالعه ۳۴۵ تزریق توسط ۸۲ نفر انجام شده بود. از ۳۴۵ تزریق ثبت شده به صورت مشاهده‌ای، ۵۳ درصد (۱۸۳ مورد) در مجموعه اتاق‌های عمل A و ۴۳ درصد (۱۶۲ مورد) در مجموعه B صورت گرفته بود. بیشترین تعداد تزریقات توسط کارشناسان

جدول (۱): فراوانی مطلق و نسبی تزریقات بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک و زمینه‌ای تزریق کنندگان

ردیف	متغیر	تعداد(درصد)	کل
۱	سابقه کار	<۱۰	۳۴۵
		۱۱-۲۰	(۸۱/۴) ۲۸۱ (۱۲/۸) ۴۳
		>۲۰	(۵/۸) ۲۵
۲	جنس	ذکر	۳۴۵
		مؤنث	(۵۵) ۱۹۱ (۴۵) ۱۵۴
۳	سن	<۳۰	۳۴۵
		۳۱-۴۰	(۲۵/۵) ۸۸ (۵۶) ۱۹۳
		۴۱-۵۰	(۱۷/۵) ۶۱
		>۵۱	(۱) ۳
۴	شغل	کارشناس	۳۴۵
		رزیدنت	(۴۵/۵) ۱۵۷ (۳۴/۸) ۱۲۰
		اتند	(۱۲/۸) ۴۴
		دانشجو	(۷) ۲۴
۵	تعداد پرسنل	A	۳۴۵
	اتفاق عمل	B	(۴۷) ۱۶۲ (۵۳) ۱۸۳

جدول (۲): فراوانی و درصد رعایت موازین تزریق ایمن قبل از تزریقات

ردیف	گویه	تعداد	درصد
۱	آماده‌سازی دارو در روی میز، عدم آلوگی و سایل تزریق با خون، خونابه و سوآب آلوده	۳۱۴	۹۱
۲	شستشوی دست‌ها با آب و صابون قبل از آماده‌سازی دارو برای تزریق	۶۲	۱۸
۳	شستشوی دست‌ها با ماده پاک‌کننده الکلی قبل از آماده‌سازی دارو برای تزریق	۲۸۱	۸۱/۴
۴	استفاده از سرنگ یکباره‌صرف استاندارد در تزریقات	۳۴۱	۹۹
۵	آماده‌سازی دارو با سرنگ و سرسوزن باسته سالم یا دارای محافظ	۳۸۸	۹۸
۶	استفاده از سرنگ و سرسوزن در یک بسته سالم یا دارای محافظ برای تزریق	۳۱۶	۹۱/۶
	میانگین درصد موارد کل سازه قبل از تزریق		۹۰/۱

جدول (۳): فراوانی و درصد رعایت موازین تزریق ایمن حین تزریقات

ردیف	گویه	تعداد	درصد
۱	آماده‌سازی داروهای پودری، با حلال و داروی ساخت یک کارخانه	۱۸	۵/۲
۲	استفاده از حجم درستی از حلال در آماده‌سازی داروی پودری	۹۹	۲۸/۷
۳	پاک کردن سرپوش پلاستیکی و بیال چند دوزی با ماده ضدعفونی‌کننده	۴۱	۸۱/۴
۴	عدم استفاده از سوآب کشیف در پاک کردن سرپوش پلاستیکی و بیال‌های چند دوزی	۱۱	۱۱/۶
۵	استفاده از پنبه یا گاز تمیز برای شکستن آمپول‌های شیشه‌ای	۱۲۶	۴۸/۸
۶	نگهداری داروی حساس به حرارت، در حرارت ۲-۸ درجه سانتی‌گراد	۵۰	۷۰/۴
۷	استفاده از دستکش جدید توسط تزریق کننده	۱۲۸	۳۷
	میانگین درصد موارد کل سازه حین تزریق		۴۴

جدول (۳): فراوانی و درصد رعایت موازین تزریق ایمن بعد از انجام تزریقات

ردیف	گویه	تعداد	درصد
۱	تعویض سرسوزن در استفاده از ویال‌های چند دوزی، پس از برداشتن یک دوز	۳۷	۵۲
۲	عدم سرپوش‌گذاری سرسوزن بعد از تزریق	۹۶	۲۷/۸
۳	استفاده از جداسازی یا خم کننده سرسوزن	۱۰۷	۴۱/۶
	میانگین درصد موارد کل سازه بعد از تزریق	۳۷/۷	

جدول (۴): معنی‌داری تزریقات بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک و زمینه‌ای

ردیف	متغیر	تعداد(درصد)	P value
۱	<۱۰	(۸۱/۴) ۲۸۱	P=0.01
	۱۱-۲۰	(۱۲/۸) ۴۳	
	>۲۰	(۵/۸) ۲۵	
۲	مذکور	(۵۵) ۱۹۱	P=0.02
	مؤنث	(۴۵) ۱۵۴	
	کارشناس	(۴۵/۵) ۱۵۷	
۳	شغل	(۳۴/۸) ۱۲۰	P=0.17
	رزیدنت	(۱۲/۸) ۴۴	
	اتند	(۷) ۲۴	
۴	دانشجو	(۴۷) ۱۶۲	P=0.11
	اتاق عمل	(۵۳) ۱۸۳	
	A		
	B		

بحث

نتایج نشان داد رعایت موازین مربوط به تزریقات ایمن در اتاق‌های عمل مرکز منتخب از ضعف نسبی بخوردار بوده و در نگاه خوش‌بینانه در حد قابل قبول بود. در مقایسه سه مرحله قبل، حین و بعد از تزریق نیز رعایت ایمنی تزریقات در مرحله قبل از تزریق بهتر از سایر مراحل بود. مقایسه بررسی حاضر با مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور، نشان داد نتایج در برخی موارد هم‌راستا و در برخی موارد نیز ناهمخوان بودند.

مقایسه نتایج بررسی حاضر با مطالعه جلالی نیا در زمینه بکار گیری اصول تزریق ایمن نشان داد پرستاران در سه مرحله قبل، حین و بعد از تزریق به ترتیب با فراوانی ۴۹/۴ درصد، ۵۱/۸ درصد و ۵۵/۵ درصد موازین را رعایت می‌کردند (۲۴). نتایج پژوهش حاضر با مطالعه جلالی نیا همخوانی ندارد که می‌تواند ناشی از تفاوت در شرایط حاکم بر دو محیط یعنی اتاق عمل و اورژانس باشد. مدیریت مصرف دارو در اتاق عمل به خاطر پیچیدگی خاص این واحد و بازه زمانی کوتاه آماده‌سازی و مصرف دارو متفاوت از سایر بخش‌های است (۱۷، ۱۸). همچنین گروه‌های موربد بررسی ناهمسان در دو مطالعه نیز می‌تواند عامل مؤثری در نتایج متفاوت باشد.

در مطالعه جلالی نیا حدود ۹۸ درصد از پرستاران از سرسوزن و سرنگ جداگانه، استریل و یکبار مصرف برای هر تزریق استفاده کرده بودند (۲۴) که با مطالعه حاضر همخوانی دارد. در مطالعه جلالی نیا بین امتیازات به دست آمده از نحوه به کارگیری روش‌های تزریق ایمن در حین تزریق با جنس همبستگی معنادار وجود داشت. در پژوهش حاضر نیز تفاوت بین جنس و رعایت موازین تزریق ایمن معنی‌دار بود و رعایت موازین توسط خانم‌ها بیشتر از آقایان بود.

نتایج مطالعه فورد^۱ نشان داد ۲۲ درصد تزریق کنندگان در اتاق عمل از یک سرسوزن یا سرنگ برای کشیدن دارو از ویال چند دوزی استفاده کرده بودند (۲۰). در بررسی حاضر در استفاده از ویال‌های چند دوزی، پس از برداشتن یک دوز، در ۴۸ درصد موارد، سرسوزن عوض نشده بود. این اختلاف قابل تأمل می‌تواند ناشی از کم توجهی مسئولین به آموزش و نظارت و سهل‌انگاری کارکنان در رعایت موازین بوده یا حتی با دلایلی مثل کاهش هزینه‌ها توسط تزریق کننده توجیه شود.

در مطالعه اکبر^۲ سرپوش‌گذاری سرسوزن بعد از تزریق در ۱۶ درصد تزریق‌ها مشاهده شد و در ۹۸/۸ درصد مشاهدات از سرنگ و سرسوزن بسته‌بندی شده استفاده شده بود (۳۰). ارقام فوق در

² Akbar¹ Ford

سرپوش‌گذاری کرده بودند (۳۶) و وونگ^۹ در کامبوج سرپوش‌گذاری سرسوزن را بعد از تزریق در ۵۵درصد افراد گزارش کرده و ۱۳درصد کارکنان سرنگ و سرسوزن را بروش درست دور نیانداخته بودند (۳۷). در مطالعه حاضر سرپوش‌گذاری سرسوزن بعد از تزریق در ۷۲درصد تزریقات مشاهده شده صورت گرفت، که دو نتیجه بهم قابل مقایسه نیستند. همان‌طور که ذکر شد تفاوت قابل توجه در سرپوش‌گذاری بعد از تزریق در اتاق عمل می‌تواند ناشی از استفاده مکرر از یک دارو در سرنگ برای یک بیمار در طول عمل جراحی و در فواصل زمانی کوتاه جهت حفظ سطح بیهوده باشد. مدت زمان انجام عمل جراحی غالباً خیلی کمتر از بازه زمانی تکرار دارو در بخش‌های بستره است که می‌تواند دلیل سرپوش‌گذاری بیش از حد در اتاق عمل باشد.

در مطالعه رهان^{۱۰} در هند فعالیت‌های غیر ایمن شامل نشستن دست‌ها ۹۵/۴درصد، عدم استفاده از دستکش یا عوض نکردن آن ۱۶/۱درصد، گذاشتن سرپوش سرسوزن بعد از تزریق ۱۲/۲درصد، پاک کردن سرسوزن با سواب ۱۵/۴درصد و شکستن آمپول با جسم سخت ۴۴/۴درصد بوده است (۳۸).

با توجه به لزوم انجام اعمال جراحی و به تبع آن نیاز به تزریقات در اتاق‌های عمل و فراوانی قابل توجه تزریقات از نظر تنوع، تعداد و تکرار، بررسی‌ها و مطالعات بیشتر در زمینه ایمنی تزریقات در این محیط به روشن شدن بیشتر ابعاد موضوع کمک خواهد کرد.

نتیجه‌گیری

بر اساس نتایج و یافته‌های حاصل از این مطالعه، ضرورت توجه بیشتر به موازین مربوط به تزریق ایمن در اتاق‌های عمل مشخص شد. توجه به فرهنگ ایمنی و تأثیر اصلی عوامل سیستمی در ایمنی کارکنان و بیمار نقش تعیین‌کننده در ارتقا ایمنی دارد. تبیین اهمیت موضوع آموزش کارکنان و تدوین، تقویت و اجرای موازین نظارتی مواردی هستند که به نهادینه شدن بیش از پیش ضوابط تزریقات ایمن کمک می‌کنند.

این تحقیق نشان داد که میزان رعایت موازین ایمنی در تزریقات توسط کارکنان که با سلامت خودشان و مردم سروکار دارند، و بر اساس اظهارات خود آن‌ها نیاز به بهبود دارد. همچنین جنبه‌های مقرراتی، آموزشی و نظارتی نیز در نحوه انجام تزریقات ایمن، نیازمند توجه و اهتمام بیشتری است. تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و نظارت بر انجام موازین مرتبط و رویده‌ها، در تغییر وضعیت و کاهش آثار احتمالی منفی مؤثر خواهد بود.

مطالعه حاضر به ترتیب ۷۲درصد و ۹۸درصد بود که از همسانی نسبی یا کامل حاکی هستند.

در مطالعه کافل^۳ سرپوش‌گذاری مجدد در ۹۴/۱درصد وجود داشت (۳۱) و در بررسی حاضر این مقدار ۷۲درصد بود. بر اساس دستورالعمل WHO اصولاً سرسوزن بعد از تزریق و بدون سرپوش‌گذاری، باید دور انداخته شود (۳۲)، ولی در اتاق عمل به خاطر تکرار تزریق داروی موجود در سرنگ در طول عمل، احتمالاً میزان سرپوش‌گذاری بالاتر خواهد بود.

پائول^۴ در بررسی خود گزارش کرده است که ۱۲/۵درصد افراد قبل از تزریق دست‌های خود را آب و صابون شسته بودند، فقط ۷/۳پرسنل پرستاری حین تزریق از دستکش استریل استفاده کرده بودند و سرپوش‌گذاری مجدد در ۴۲/۵درصد موارد درصد وجود داشت (۳۳). در بررسی حاضر "شستشوی دست‌ها با آب و صابون قبل از آماده‌سازی دارو برای تزریق توسط فرد تزریق کننده"، در ۱۸درصد مشاهدات رعایت شده بود، در ۴۵درصد موارد از دستکش استفاده شد بود و سرپوش‌گذاری مجدد در بررسی حاضر ۷۲درصد بود. دوراندازی صحیح سرنگ در ۴۱/۲درصد موارد مشاهده شد.

در مطالعه گوندر^۵ عدم استفاده از سرنگ و سرسوزن جدید برای بیمار جدید در ۳درصد موارد، و استفاده از سرنگ و سرسوزن جدید برای ویال چند دوزی در ۷۲درصد موارد وجود داشت (۹) و در بررسی حاضر در استفاده از ویال‌های چند دوزی، پس از برداشتن یک دز، در ۵۲درصد موارد، سرسوزن عوض شده بود.

در مطالعه جیارد^۶ بیشترین معراجات در مورد تعویض دستکش بین تزریقات و ۹۴/۵درصد موارد بود (۳۴). ولی در بررسی حاضر در ۷۳درصد تزریقات مشاهده شده از دستکش جدید و در ۸درصد موارد از دستکش قبلی استفاده شد و در ۵۵درصد موارد از دستکش استفاده نشد. آموزش کارکنان، نظارت و در دسترس بودن وسایل از عوامل سازمانی بوده و تغییر نگرش پرسنل و تغییر رفتار نیز می‌تواند از عوامل انسانی مؤثر در موضوع باشد. در مطالعه WHO در ایالات متحده عواملی همچون عدم استفاده از وسایل یکبار مصرف تزریق و عدم تزریق استریل و نبود سفتی باکس به تعداد قابل قبول به عنوان عوامل مؤثر بر تزریقات غیر ایمن در نظر گرفته شده است (۱۱).

در مطالعه یووانگ^۷ در سال ۲۰۰۴ در چین، ۱۶درصد تزریقات غیر ایمن بودند (۳۵). بر اساس مطالعه اوموروگبه^۸ در بیمارستان‌های نیجریه، ۲۳درصد پرستاران به‌طور مرتب و ۳۲/۸درصد آنان برخی اوقات بعد از تزریق سرسوزن را

³ Kaphle

⁴ Paul

⁵ Gounder

⁶ Giard

⁷ Youwang

⁸ Omorogbe

⁹ Vong

¹⁰ Rehan

تشکر و قدردانی

از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و مسئولین مرکز آموزشی درمانی منتخب که زمینه انجام این پژوهش

References:

1. Nabilou B. Proceedings of the National Congress of patient safety. Urmia: 2011. P. 26-28. (Persian)
2. World Health Organization. A review of determinants of hospital performance: report of the WHO Hospital Advisory Group Meeting. Geneva: 1994.
3. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. To Err Is Human: Building a Safer Health System. Washington, DC: National Academy Press; 2000.
4. Adejumo PO, Dada FA. A comparative study on knowledge, attitude, and practice of injection safety among nurses in two hospitals in Ibadan, Nigeria. International Journal of Infection Control [Internet] 2013 [cited 2016 Jun 12];9(1). Available from: <http://www.ijic.info/article/view/10092>
5. Colling L. Russell, York W. T., Hospital and Healthcare Security, 5th Ed. Elsevier Inc. 2009.
6. Hughes RG. Tools and Strategies for Quality Improvement and Patient Safety. In: Hughes RG, editor. Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses [Internet] Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2008 [cited 2016 Jun 12]. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2682/>
7. WHO injection safety fact sheet No. 231, Revised October 2006. Available from: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs231/en/>
8. FMOH, JSI/MMIS. Do No Harm: Injection Safety in the Context of Infection Prevention and Control Trainer's Guide FMOH and JSI/MMIS. Nigeria: 2007.P. 1-126.
9. Gounder P, Beers R, Bornschlegel K, Hinterland K, Balter S. Medication injection safety knowledge and practices among anesthesiologists: New York State, 2011. J Clin Anesthesia 2013; 25(7): 521-8.
10. Ministry of health. Injection Safety Guidelines. 2009. (Persian)
11. Hutin YJF, Hauri AM, Armstrong GL. Abstract use of injections in health care settings worldwide, 2000: literature review and regional estimates. BMJ 2003; 327: 1075-8.
12. Drucker E, Alcabes PG, Marx PA. The injection century: massive unsterile injections and the emergence of human pathogens. Lancet 2001; 358: 1989-92.
13. Reid S. Preliminary results of the WHO GBD from unsafe injections [abstract]. Geneva: World Health Organization; 2010. [who.int/injection_safety/sign/en/](http://www.who.int/injection_safety/sign/en/). In Report on Annual Meeting of the Safe Injection Global Network, 9-11 November 2010, Dubai, United Arab Emirates (Accessed 18 Dec. 2011).
14. Saoji A. Injection Safety Awareness and Knowledge in a Rural Population. Global J Health Sci 2011; (3) 1: 189-92.
15. Kesieme EB, Uwakwe K, Irekpita E, Dongo A, Bwala KJ, Alegbeleye BJ. Knowledge of Hepatitis B Vaccine among Operating Room Personnel in Nigeria and Their Vaccination Status. Hepat Res Treat 2011;2011:157089.
16. Frandzel S. Bar-code scanning can fix 'black hole' of OR drug safety. Anesthesiol News 2012; 39 (1). 30.
17. Merali R, Orser BA, Leeksma A, Lingard S, Belo S, Hyland S. Medication safety in the operating room: teaming up to improve patient safety. Healthc Q 2008;11(3 Spec No.):54-7.

- Downloaded from umf.umsu.ac.ir at 16:41 IRST on Saturday September 24th 2016
18. Brown L B. Medication administration in the operating room: new standards and recommendations. *AANA J* 2014; 82(6): 465-9.
 19. Centers for Disease Control and Prevention. Transmission of hepatitis B and C viruses in outpatient settings—New York, klahoma, and Nebraska, 2000-2002. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2003; 52: 901-6.
 20. Ford K. Survey of Syringe and Needle Safety Among Student Registered Nurse Anesthetists: Are We Making Any Progress? *AANA J* 2013; (81)1: 37-41.
 21. Rosenberg AD. Accidental needlesticks: do anesthesiologists practice proper infection control precautions? *Am J Anesthesiol* 1995; 22: 123-32.
 22. Wilson WO. Infection control issue: understanding and addressing the prevalence of unsafe injection practices in healthcare. *AANA J* 2008; 76: 251-3.
 23. Anesthesia Patient Safety Foundation newsletter. Available from: <http://www.apsf.org/assets/Documents/summer2008.pdf>.
 24. Jalalinia SF, Zakerimoghaddam M, Kazemnezhad A. Evaluation of the use of safe injection methods by nurses in emergency department. *Hayat* 2006;12(1): 35-45.
 25. Hashemi SH, Torabian S, Mamani M, Moazen D Sh. The Prevalence of Needle stick and Sharps Injuries among Health Care Workers in Hamadan, Iran. *Sci J Hamadan Univ Med Sci* 2012; 18 (4): 41-6. (Persian)
 26. Shiva F, Shiva FR. Injection Practices in Children: Knowledge and Perception of Healthcare Workers. *Pejouhesh* 2008; 32 (3): 247-52. (Persian)
 27. Mohammed N, Allami A, Malek Mohamadi R. Percutaneous exposure incidents in nurses: Knowledge, practice and exposure to hepatitis B infection. *Hepat Mon* 2011; 11: 186-90.
 28. Abdi MH, najafipour S, hamidizade S, Jamali F, Pournorou N. A survey of accidental injuries caused by Sharp instruments injuries among healthcare workers in Jahrom University of medical sciences hospitals, 2008. *Jjums* 2009; 2(7); 30-3. (Persian)
 29. World Health Organization. Revised Injection Safety Assessment Tool (Tool C - Revised). Geneva: World Health Organization; 2008. Available from: http://www.who.int/injection_safety/Injection_safety_final-web.pdf. Accessed November 8, 2013.
 30. Abkar MA, Wahdan IM, Sherif AA, Raja YA. Unsafe injection practices in Hodeidah governorate, Yemen. *J Infection Public Health* 2013; 6: 252-60.
 31. Kaphle H, Poudel S, Subedi S, Gupta N, Jain V, Paudel P. Awareness and Practices on Injection Safety among Nurses Working in Hospitals of Pokhara, Nepal. *Int J Med Health Sci* 2014; (3)4: 301-7.
 32. World Health Organization. *Injection safety*. Geneva: WHO; 2002. P. 231.
 33. Pual B, Roy S, Chattopdhyaya D, Bisoi S, Misra R, Bhattacharya N, et al. A Study on Safe Injection Practices of Nursing Personnel in a Tertiary Care Hospital of Kolkata, West Bengal, India. *TAF Prev Med Bull* 2011; 10(6): 681-6.
 34. Giard M, Laprugne-Garcia E, Caillat-Vallet E, Russell I, Verjat-Trannoy D, Ertzscheid M-A, et al. Compliance with standard precautions: Results of a French national audit. *Am J Infect Control* 2016;44(1):8-13.
 35. Yan Y, Zhang G, Chen Y, Zhang A, Guan Y, Ao H. Study on the injection practices of health facilities in Jingzhou district, Hubei, China. *Indian J Med Sci* 2006; 60: 407-16.
 36. Omorogbe VE, Omuemu VO, Isara AR. Injection safety practices among nursing staff of mission hospitals in Benin City, Nigeria. *Annals African Med* 2012; 11(1): 36-41.

37. Vong S, Perz JF, Sok S, Som S, Goldstein S, Hutin Y, et al. Rapid assessment of injection practices in Cambodia, 2002. *BMC Public Health* 2005;5:56.
38. Rehan HS, Chopra D, Sah RK, Chawla T, Agarwal A, Sharma GK. Injection practices of healthcare professionals in a Tertiary Care Hospital. *J Infect Public Health* 2012; 5(2): 177-81.

OPERATING ROOM STAFF PERFORMANCE IN MEDIATION INJECTION SAFETY: AN OBSERVATIONAL STUDY

Karim Bageri¹, Bahram Nabilou²,

Received: 18 Feb, 2016; Accepted: 22 Apr, 2016

Abstract

Background & Aims: The aim of medical practice is to preserve and improve health and healthcare workers, especially nurses, are responsible for providing care with safety. Medication injection safety is of utmost importance as the most common method in induction, maintenance and termination of anesthesia in patients. This study aimed to evaluate the medication injection safety in operating room settings.

Materials & Methods: This observational study was performed in the operating rooms of a teaching hospital affiliated to Urmia University of Medical Sciences in 2014-15. In this study, performance of employee was studied in three stages of injection practice: pre-injection, during and post-injection in a six-month period. Data collection was conducted by the World Health Organization standard checklist.

Results: During the study period, 345 injections were observed in two operating room settings. Comparison of three injection stages showed the most (89.7%) and the least (40.5%) conformance in pre-injection and post-injection stages, respectively. Paired t-test showed that the conformity of safe injection practice on the basis of gender was statistically significant ($P = 0.024$). Pearson correlation coefficients showed direct correlation between safe injection conformity with age and work experience. Correlation between safe injection conformity and working experience was statistically significant ($P=0.014$).

Conclusion: Based on the results and findings of the study, the importance of principles for safe injection practice was found in the operating rooms. Highlighting the importance of the issue and continuing education will lead to change attitudes and practice and ultimately help to improve the situation.

Key words: Medical Staff, Operating Rooms, Injections, Patient Safety

Address: Urmia, Urmia University of Medical Science

Tel: +98 9143491219

Email: bnabil@umsu.ac.ir

¹ Nurse Anesthetist, Emam Khomeini Teaching Center, Urmia, Iran

² Associate professor. PhD of health services management, Social determinants of health Research Center, School of Public Health, Urmia University of Medical Science, Urmia, Iran (Corresponding Author)