

مقاله پژوهشی اصیل

ارتباط بین عالیم هشدار دهنده و زمان مراجعه بیماران مبتلا به سکته قلبی

لیدا سلطانی^۱، دانشجوی دکترای پرستاری
علی راوری^۲، دکترای پرستاری
*سکینه سبزواری^۳، دکترای پرستاری

خلاصه

هدف. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین عالیم هشدار دهنده و زمان مراجعه بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال ۱۳۹۱ انجام شد.

زمینه. اطلاعات بسیار محدودی در مورد نحوه پاسخ گویی افراد نسبت به عالیم هشدار دهنده سکته قلبی و زمان مراجعه آنها به مراکز درمانی وجود دارد.

روش کار. نمونه پژوهش شامل ۱۷۵ بیمار مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بود. جهت جمع آوری داده ها (به مدت هفت ماه) از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد که شامل بخش های اطلاعات دموگرافیک، عالیم هشدار دهنده و زمان مراجعه بود. پرسشنامه ها طی مصاحبه حضوری بر بالین بیمار و مطالعه پرونده پزشکی، توسط پژوهشگر تکمیل شدند. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ جهت تهیه آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، توزیع فراوانی مطلق و نسبی) و تحلیلی (آزمون کای دو و ضربه همبستگی) پیرسون استفاده شد.

یافته ها. بیشترین درصد بیماران، مذکر ۷۶/۶ و میانسال ۵۳/۱ (درصد) و میانسال ۳۸/۶ (درصد) بودند. از ۱۷۵ نفر بیمار مورد بررسی، ۱۳۲ نفر (۷۵/۴ درصد) عالیم هشدار دهنده، دو هفته قبل از حادثه قلبی داشتند. همچنین، ۵۱ نفر (۲۸/۶ درصد) برای عالیم هشدار دهنده به مطب، درمانگاه یا بیمارستان مراجعه کرده بودند. حداقل فاصله زمانی بین بروز عالیم هشدار دهنده و مراجعه بیماران به بیمارستان، ۱۵ دقیقه و حداقل فاصله زمانی، ۱۵۰۰ دقیقه بود. ارتباط آماری معنی داری بین عالیم هشدار دهنده و زمان مراجعه بیماران مشاهده شد ($p=0.07$). متوسط فاصله زمانی بین بروز عالیم هشدار دهنده و مراجعه بیماران به بیمارستان، ۲۰۶/۹ دقیقه بود.

نتیجه گیری. شناخت عالیم هشدار دهنده می تواند موجب پیگیری سریع تر بیماران مبتلا به سکته قلبی برای درمان گردد. آموزش جهت افزایش آگاهی عمومی از عالیم هشدار دهنده، به ویژه آموزش به افراد دارای سابقه خانوادگی و در معرض خطر بیماری های قلبی عروقی، راهکار مناسبی به نظر می رسد.

کلیدواژه ها: سکته قلبی، عالیم هشدار دهنده، زمان مراجعه

۱ کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

۲ استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

۳ استادیار، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران (*نویسنده مسئول) پست الکترونیک: S_Sabzevari@kmu.ac.ir

مقدمه

بیماری ایسکمیک قلب شایع ترین شکل بیماری قلبی عروقی است و مهمترین عامل مرگ در کل جهان محسوب می‌شود (واکارینو و همکاران، ۲۰۱۰). بیشترین آمار مرگ در کشور ایران نیز مربوط به بیماری های قلبی عروقی است. بیماران دچار سکته قلبی حاد نسبت به سایر افراد، ۴ تا ۶ برابر بیشتر در معرض خطر مرگ ناگهانی قرار دارند و بیش از نیمی از این بیماران پیش از رسیدن به بیمارستان فوت می‌کنند (نگویان و همکاران، ۲۰۱۰). تاخیر در تشخیص و درمان سکته قلبی به میزان قابل توجهی از فواید و مزایای درمان می‌کاهد و مراجعه به موقع برای درمان می‌تواند مرگ ناشی از عوارض بیماری را کم کند (چوگتای و همکاران، ۲۰۱۰). شروع سریع درمان پس از بروز علایم اولیه حاد سکته قلبی (درمان ترومبوپلاستیک و آنتیپوپلاستی اولیه) باعث محدود شدن وسعت ضایعه میوکارد و کاهش خطر مرگ بیمار می‌گردد (لادویگ و همکاران، ۲۰۱۱). برخی بیماران مبتلا به سکته قلبی تقریباً تا ۲ ساعت بعد از شروع علایم برای درمان مراجعه نمی‌کنند (یان و همکاران، ۲۰۰۹).

یافته‌های مطالعه سبزواری و همکاران (۱۳۸۶) نشان داد بیشتر بیماران، با بیش از ۶ ساعت تاخیر مراجعه می‌کنند و میانگین زمان تاخیر ۳۴۴ دقیقه بوده است. این در حالی است که تاخیر بیش از یک ساعت، تاثیر مداخلات درمانی را به شدت کاهش می‌دهد (پیتو و همکاران، ۲۰۰۶). نیم ساعت تاخیر برای درمان، به طور متوسط یک سال از عمر فرد می‌کاهد (درآکوب و همکاران، ۲۰۰۷). اگرچه دو دهه است که فاصله زمانی قابل پذیرش بین شروع علایم و درمان را کمتر از ۶۰ دقیقه ذکر کرده‌اند، اما شواهد حاکی از آن است که تاخیرهای پیش بیمارستانی همچنان میانگین ۲ تا ۴ ساعت را دارند و مداخلات نیز برای کاهش تاخیرها موفقیت آمیز نبوده‌اند (پرکینز بوراس و همکاران، ۲۰۰۹).

بسیاری از بیماران حتی قبل از بروز علایم حاد سکته قلبی دچار علایم هشداردهنده ای می‌شوند که خبر از حادثه قلبی می‌دهند (هوانگ و همکاران، ۲۰۱۱). توجه دقیق به علایم هشداردهنده امکان شناسایی زودرس بیماران مشکوک به سکته قلبی را فراهم می‌کند که در این صورت، با شروع زودهنگام درمان‌های مناسب می‌توان خطر بروز عوارض و مرگ را کاهش داد. علایم هشداردهنده به عنوان آنژین قبل از سکته و علایم ایسکمی قلبی تعریف می‌شوند که از یک فرایند ایسکمیک پیش از حادثه حاد قلبی خبر می‌دهند. آمارهای متعددی در مورد بروز علایم هشداردهنده قبل از سکته حاد قبلی گزارش شده است. مشرقي مقدم و همکاران (۱۳۸۵) گزارش کرده‌اند علایم هشداردهنده قبل از سکته شایع است و حداقل در ۶۰ درصد بیماران مشاهده می‌شوند. در مطالعه هوانگ و همکاران (۲۰۱۱) گزارش شده است که ۷۸ تا ۹۰ درصد زنان با تشخیص سکته قلبی، پیش از حمله حاد، حداقل یک علامت هشداردهنده را برای بیشتر از یک ماه، هر روز یا چند مرتبه در هفتة تجربه کرده‌اند. پژوهش لولین و همکاران (۲۰۰۹) نشان می‌دهد علایم هشداردهنده تقریباً در ۸۰ درصد بیماران با سکته قلبی گزارش شده است که حتی از یک سال تا شش ماه قبل از شروع مرحله حاد وجود داشته‌اند. در مطالعه مک سوئینی و همکاران (۲۰۱۰) گزارش شده است بیش از ۹۵ درصد زنان تحت مطالعه، پیش از حمله قلبی، علایم هشداردهنده داشته‌اند.

در بسیاری از بیماران سکته قلبی، علایم هشداردهنده متنوعی گزارش شده است که توجه به این علایم می‌تواند راهی برای تشخیص و درمان سریع تر و در نتیجه پیشگیری از پیشرفت بیماری باشد (لولین و همکاران، ۲۰۰۹). از بین علایم هشداردهنده، درد قلبی علامت اصلی بوده است. بروز درد به عنوان علامت هشداردهنده، به طور متناسب قبل از حمله حاد گزارش شده است. بیماران دارای علایم هشداردهنده که دچار ایست قلبی شده‌اند از هفتنه‌ها و ماه‌ها قبل با سیستم درمانی در تماس بوده‌اند. تعدادی از بیماران که احیاء قلبی موفقیت آمیز در خارج از بیمارستان داشته‌اند گزارش کرده‌اند که در بازه زمانی چهار هفتۀ پیش از ایست قلبی دچار درد آنژینی یا تنگی نفس بوده‌اند (برانوالد، ۲۰۱۵).

متاسفانه بیشتر افراد از علایم هشداردهنده اطلاعی ندارند و آنها را جدی نمی‌گیرند. علیرغم این که شناسایی این افراد بسیار ضروری است، اما به ندرت شناخته و گزارش می‌شوند (لولین و همکاران، ۲۰۰۹). با توجه به شیوع بالای بیماری قلبی به ویژه انفارکتوس میوکارد و مرگ ناشی از آن، پیش‌بینی بیماری حتی با احتمال ضعیف، می‌تواند کمک موثری به تشخیص زودهنگام بیماری نماید تا اقدامات درمانی لازم به موقع انجام شود.

تاخیر پیش بیمارستانی بیشترین زمان از کل مدت تاخیر (۷۵ درصد) را شامل می‌شود (لادویگ و همکاران، ۲۰۱۰). بیشترین گذشت زمان قبل از رسیدن به بیمارستان، در صحنه سپری می‌شود که یک بخش مهم از کل زمان درمان است و اگر بیش از ۱۲۰ دقیقه

باشد نتایج منفی بر پیامد درمان دارد (چوگتای و همکاران، ۲۰۱۰). بیشتر از نیمی از بیماران سکته قلبی جهت جستجوی مراقبت درمانی، بالای ۲ ساعت و بیش از یک چهارم آنها بیشتر از ۶ ساعت تاخیر دارند (نگویان و همکاران، ۲۰۱۰). تاخیر بیماران انفارکتوس قلبی به دو دوره از زمان تقسیم می‌شود: تاخیر قبل از بیمارستان (زمان شروع علایم تا رسیدن بیمار به بیمارستان) و تاخیر داخل بیمارستان (از زمان رسیدن به بیمارستان تا شروع درمان). تاخیر پیش بیمارستانی شامل تاخیر زمان تصمیم گیری و تاخیر زمان انتقال است (کرایم و کری، ۲۰۰۹). بیماران انفارکتوس بر اساس زمان مراجعه از شروع علایم اولیه به سه گروه تقسیم می‌گردند: گروهی که زود مراجعه میکنند (کمتر از ۲ ساعت)، گروه دارای متوسط زمان (۲-۶ ساعت) و گروهی که دیر می‌آیند (۶-۲۴ ساعت) (ماروهاشی و همکاران، ۲۰۱۰).

علیغum اهمیت علایم هشداردهنده در مراجعه به موقع به مرکز درمانی، مطالعات اندکی در زمینه ارتباط علایم هشداردهنده و مراجعه به موقع بیماران مبتلا به سکته قلبی انجام شده است. بررسی انجام شده توسط هوانگ و همکاران (۲۰۱۱) درباره ارتباط علایم پیش درآمد سکته قلبی با تاخیر مراجعه بیماران دچار اولین سکته قلبی حاد نشان می‌دهد بیش از نیمی از جامعه پژوهش علایم هشداردهنده را داشته اند و فقط ۴۰ درصد آنها به درمانگاه یا بیمارستان مراجعه کرده اند. با تشخیص به موقع علایم هشداردهنده می‌توان قبل از بروز حمله قلبی حاد بهترین و مناسب ترین اقدامات درمانی را انجام داد و از بروز نکروز میوکارد و مرگ ناگهانی پیشگیری کرد. در این مطالعه به بررسی ارتباط علایم هشداردهنده و زمان مراجعه بیماران به مرکز درمانی پرداخته شده است.

مواد و روش‌ها

این مطالعه یک پژوهش مقطعی بود. نمونه پژوهش را ۱۷۵ بیمار مبتلا به سکته حاد قلبی تشکیل داد که از تاریخ تیر تا دی ۱۳۹۱ در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب رفسنجان بستری شده بودند. این بیماران برای نوبت اول بستری می‌شدند. تشخیص سکته حاد قلبی بر اساس علایم بالینی و تعییرات الکتروکاردیوگرافی (بالا رفتن قطعه ST و افزایش تیتر آنزیمی به دو برابر میزان طبیعی) مسجل می‌شد (نمورا و همکاران، ۲۰۱۰). معیارهای ورود به مطالعه شامل تشخیص قطعی سکته قلبی حاد، برخورداری از وضعیت با ثبات روحی روانی، و توانایی برقراری ارتباط کلامی بودند.

ابزار جمع آوری داده‌ها شامل پرسشنامه پژوهشگر ساخته مشتمل بر دو بخش بود. بخش اول، درباره خصوصیات دموگرافیک و بخش دوم شامل علایم هشداردهنده و فاصله زمانی بین علایم هشداردهنده و مراجعه بود. ابزار پژوهش بر اساس بررسی متون و پژوهش‌های قبلی (مک سوینی، ۲۰۱۲؛ هوانگ و همکاران، ۲۰۱۱؛ لوولین و همکاران، ۲۰۰۹؛ ماروهاشی و همکاران، ۲۰۱۰؛ پرکینز پوراس، ۲۰۰۹؛ یان و همکاران، ۲۰۰۹) تدوین گردید. علایم هشداردهنده بر اساس مطالعه مک سوینی تعیین شد که به شرح زیر بودند: ۱) درد (در قفسه سینه، دست، شانه، گردن، فک، گلو یا پا)، ۲) اضطراب/خستگی (اضطراب، اختلال خواب، ضعف/خستگی)، ۳) مشکلات گوارشی (تهوع/استفراغ، بی اشتہایی، سوء‌همضم)، ۴) مشکلات مربوط به سر (سرگیجه، سردرد، مشکلات بینایی)، و ۵) سایر موارد (تعزیق، تنگی نفس، تپش قلب، سرفه، بی حسی اندام‌ها). پرسشنامه‌ها طی مصاحبه حضوری بر بالین بیمار و مطالعه پرونده پزشکی، توسط پژوهشگر تکمیل شدند.

در مطالعات مختلف بازه‌های زمانی مختلفی برای بررسی علایم هشداردهنده در نظر گرفته شده است. در مطالعه مشرقي مقدم و همکاران، علایم هشداردهنده در بازه زمانی دو هفته‌ای بررسی شده اند. یکی از مهمترین محدودیت‌های مطالعات مربوط به علایم هشداردهنده، زمان طولانی بررسی نشانه‌های هشداردهنده ذکر شده است. هر قدر مدت زمان طولانی تر در نظر گرفته شود، به خاط آوردن آنها برای بیماران مشکل تر می‌شود (هوانگ و همکاران، ۲۰۱۱). در این پژوهش، علایم هشداردهنده به مجموعه‌ای از علایم فوق اطلاق شد که در بازه زمانی دو هفته قبل از حادثه قلبی تظاهر کرده بودند. در این مطالعه، مدت زمان به عنوان فاصله زمانی بین شروع علایم اولیه سکته قلبی تا رسیدن به بیمارستان تعریف شده است. در مطالعات متعددی، این زمان به عنوان تاخیر محاسبه شده است.

روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا انجام گرفت. پرسشنامه به ۱۰ نفر شامل پزشک متخصص قلب و عروق (۳ نفر)، پرستاران بالینی با تجربه (۳ نفر)، و اعضای هیئت علمی پرستاری (۴ نفر) داده شد و نظرات اصلاحی آنها اعمال گردید. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ تعیین شد که ضریب کل آلفا ۰/۹۲ به دست آمد. ملاحظات اخلاقی معمول در پژوهش‌ها مانند رضایت بیماران

شرکت کننده و بی نام بودن پرسشنامه ها مورد توجه قرار گرفت. همچنین، نمونه گیری با مجوز رسمی و ارائه معرفی نامه و پس از هماهنگی با رئیس بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب رفسنجان شروع شد.

به منظور افزایش صحت اطلاعات، پرسشنامه توسط پژوهشگر از طریق مصاحبه بر بالین بیمار، ۴۸ ساعت بعد از پذیرش با زمانی که وضعیت بالینی وی به ثبات می رسید، در بخش مراقبت ویژه قلبی، تکمیل می شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۸ استفاده شد. نتایج در قالب آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، توزیع فراوانی مطلق و نسبی) و تحلیلی (آزمون کای دو و ضریب همبستگی پیرسون) تهیه شدند.

یافته ها

بیشتر افراد تحت مطالعه، مرد (۷۶/۶ درصد)، متاهل (۸۷/۴ درصد)، در دامنه سنی ۴۶-۵۶ سال (۵۳/۱ درصد) با میانگین ۵۹/۳۴ سال و انحراف معیار، بی سواد (۴۷/۷ درصد) و بازنشسته (۳۰/۹ درصد) بودند (جدول شماره ۱).

جدول شماره ۱: مشخصات دموگرافیک بیماران مبتلا به سکته قلبی

متغیر	تعداد (درصد)
جنس	
زن	(۲۳/۴) ۴۱
مرد	(۷۶/۶) ۱۳۴
سن (سال)	
۲۹-۴۵	(۱۵/۴) ۲۷
۴۶-۶۵	(۵۳/۲) ۹۳
۶۶-۹۰	(۳۱/۴) ۵۵
وضعیت تأهل	
متاهل	(۸۷/۴) ۱۵۳
مجرد	(۱۲/۶) ۲۲
تحصیلات	
بی سواد	(۴۷/۴) ۸۳
ابتدایی	(۲۰) ۳۵
متوسطه	(۲۱/۷) ۳۸
دانشگاهی	(۱۰/۹) ۱۹
شغل	
آزاد	(۱۸/۹) ۳۳
کارمند	(۱۳/۱) ۲۳
بازنشسته	(۳۰/۹) ۵۴
خانه دار	(۱۹/۴) ۳۴
کارگر	(۵/۱) ۹
کشاورز	(۱۲/۶) ۲۲

یافته ها نشان داد که ۱۳۲ نفر (۷۵/۴ درصد) عالیم هشدار دهنده را گزارش کردند و ۴۳ نفر (۲۴/۶ درصد) عالیم خاصی قبل از بروز سکته قلبی حاد نداشتند. متغیرهای سن، جنس، شغل و تحصیلات با بروز عالیم هشدار دهنده ارتباط معنادار آماری نداشتند. درد به عنوان شایع ترین علامت هشدار دهنده قبل از بروز سکته قلبی حاد گزارش شد و شایع ترین محل درد، ناحیه قفسه سینه بود. به جز درد، عالیم اضطراب/خستگی و عالیم گوارشی از عالیم شایع هشدار دهنده بودند (جدول شماره ۲). عالیمی چون ضعف و خستگی،

عدم تحمل فعالیت و تعریق، توسط بیش از ۲۲ درصد بیماران گزارش شد. بعضی از بیماران نیز از چندین علامت مختلف شاکی بودند. همچنین، یافته ها نشان می دهد ۵۷ نفر (۳۲/۶ درصد) از بیماران با عالیم هشداردهنده، به مطب پزشکان مراجعه داشتند و ۱۱۸ نفر (۶۷/۴ درصد) مراجعه ای نداشتند. از بین بیمارانی که عالیم هشداردهنده را گزارش کردند ۵۹ نفر (۴۴/۷ در زمان استراحت و ۷۳ نفر (۵۵/۳ در زمان فعالیت دچار عالیم شده بودند. همچنین، ۱۰۱ نفر (۷۶/۵ درصد) به صورت روزانه و ۳۱ نفر (۲۳/۵ درصد) به صورت هفتگی دچار عالیم هشداردهنده بودند.

جدول شماره ۲: توزیع فراوانی مطلق و نسبی عالیم هشداردهنده بیماران مبتلا به سکته قلبی

عالیم هشداردهنده	تعداد (درصد)
درد	
قفسه سینه	(۳۹/۴) ۶۹
اپی گاستر	(۲۲/۳) ۳۹
دست	(۱۵/۴) ۲۷
کتف	(۱۰/۹) ۱۹
شانه	(۹/۷) ۱۷
اضطراب / خستگی	
ضعف و خستگی	(۲۹/۷) ۵۲
کاهش فعالیت های روزانه	(۲۴) ۴۲
اضطراب	(۱۸/۳) ۳۲
اختلالات خواب	(۱۵/۴) ۲۷
عالیم گوارشی	
تبوع / استفراغ	(۸/۶) ۱۵
بی اشتهایی	(۸) ۱۴
دل درد	(۸) ۱۴
مشکلات مربوط به ناحیه سر	
سرگیجه	(۵/۷) ۱۰
سردرد	(۴) ۷
سایر موارد	
تعریق	(۲۲/۹) ۴۰
تنگی نفس	(۱۳/۱) ۲۳
سرفه	(۱۰/۹) ۱۹
تپش قلب	(۸) ۱۴

یافته های مربوط به زمان تاخیر نشان می دهد که میانگین زمان تاخیر، ۲۰۶/۹ دقیقه با انحراف معیار ۲۳۵/۴ و میانه زمان تاخیر ۱۳۰ دقیقه بود. همچنین، ۸۶ نفر (۴۹/۱ درصد) در دو ساعت اول پس از شروع عالیم مراجعه کرده بودند و ۸۹ نفر (۵۰/۹ درصد) تاخیری بیش از دو ساعت داشتند. یافته ها نشان داد میانگین رتبه زمان تاخیر در بیماران با عالیم هشداردهنده، ۹۰/۵۷ و در بیماران بدون عالیم هشداردهنده ۸۰/۱۰ بوده است. با وجود این که میانگین زمان تاخیر بیماران با عالیم هشداردهنده بیشتر بود، آزمون آماری من ویتنی اختلاف معنادار آماری بین دو گروه نشان نداد ($Z = -1/18, p = 0.23$). اما آزمون آماری کای دو ارتباط معنادار آماری بین عالیم هشداردهنده و زمان تاخیر نشان داد، به طوری که درصد بیشتری از بیماران بدون عالیم هشداردهنده، با تاخیر بیشتری مراجعه داشتند (جدول شماره ۳). یافته های جدول شماره ۳ نشان می دهد ۶۷ نفر (۵۰/۸ درصد) افراد با عالیم هشداردهنده، تاخیری بیش از دو ساعت داشتند، حال آن که ۱۱ نفر (۲۵/۶ درصد) از بیماران بدون عالیم هشداردهنده، تاخیر بیش از دو ساعت داشتند.

جدول شماره ۳: مقایسه زمان تاخیر در بیماران مبتلا به سکته قلبی، با و بدون عالیم هشداردهنده

عالیم هشداردهنده	داشته است	نداشته است	زمان تاخیر (ساعت)
	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)
کمتر از ۲	(۴۹/۲) ۶۵	(۷۴/۴) ۳۲	df=۲, $x^2=۹/۹۰$, P=۰/۰۰۷
۲-۶	(۴۲/۵) ۵۶	(۱۶/۳) ۷	
بیشتر از ۲	(۸/۳) ۱۱	(۹/۳) ۴	

یافته ها نشان داد بیماران دچار درد قفسه سینه، درد دست، درد در ناحیه کتف و بیمارانی که از تنگی نفس شاکی بودند بیشتر از سایر بیماران به مطب پزشکان یا سایر مراکز درمانی سرپایی مراجعه داشتند. آزمون آماری کای دو ارتباط آماری معناداری بین بروز این عالیم با مراجعه بیماران نشان داد. بین سایر عالیم هشداردهنده با مراجعه بیماران ارتباط معناداری مشاهده نشد.

بحث

یافته های این مطالعه نشان داد بیشتر بیماران، قبل از بروز سکته حاد قلبی، عالیم هشداردهنده را تجربه کرده بودند و از این نظر تفاوتی بین مردان و زنان وجود نداشت. مطالعه ای در نزور توسط لوولین و همکاران (۲۰۰۹) با عنوان "عالیم هشداردهنده سکته قلبی و تاثیر آن بر فاز حاد" انجام شد که در آن، ۸۰ درصد بیماران عالیم هشداردهنده را قبل از شروع نشانه های انفارکتوس میوکارد گزارش کرده بودند. در مطالعه هوانگ و همکاران (۲۰۱۱)، ۵۳/۵ درصد افراد تحت مطالعه عالیم هشداردهنده را تجربه کرده بودند که در قیاس با مطالعه حاضر بسیار کمتر است. مروری بر متون نشان می دهد مطالعات بسیار محدودی درباره عالیم هشداردهنده و عوامل موثر بر آن انجام شده است. بنابراین، شواهد معتبری وجود ندارد که بتوان دلیل بیشتر بودن آمار عالیم هشداردهنده در مطالعه حاضر را با مطالعه هوانگ و همکاران در کره توجیه کرد، اما تفاوت های فرهنگی، دانش و اطلاعات زمینه ای بیماران، خصوصیات و ویژگی های فردی افراد تحت مطالعه، ذهنیت و قضایت افراد نسبت به مراکز درمانی، وضعیت معیشتی و اقتصادی از جمله عوامل تاثیر گذار خواهند بود. شاید مطالعات بیشتر با حجم نمونه بیشتر بتواند ارتباط بین جنس با عالیم هشداردهنده را مشخص سازد.

در این مطالعه عالیم مربوط به درد به عنوان شایع ترین عالیم هشداردهنده گزارش شد و درد قفسه صدری بیشترین فراوانی را داشت. عالیم مربوط به خستگی و اضطراب نیز در مرتبه بعدی قرار داشت و عالیم گوارشی و عالیم مربوط به ناحیه سر از فراوانی خیلی کمتری برخوردار بود. در مطالعه لوولین و همکاران (۲۰۰۹) علامت هشداردهنده درد قفسه سینه بیشترین علامت گزارش شده بود. در مطالعه هوانگ و همکاران (۲۰۱۱) نیز عالیم مربوط به درد قفسه سینه، اپی گاستر و درد کمر بالاترین فراوانی را داشتند. در مطالعه حاضر به جز درد، خستگی و ضعف نیز به عنوان عالیم شایع گزارش شده است. در مطالعه کریستنون و همکاران (به نقل از سوینی و همکاران، ۲۰۰۴) که روی ۵۱۵ زن به صورت آینده نگر انجام شد ضعف و خستگی شایع ترین علامتی بود که زنان تحت مطالعه تجربه کرده بودند. اما تحقیق مک سوینی و همکاران (۲۰۱۰) تحت عنوان "تفاوت های نژادی در زنان دچار انفارکتوس میوکارد و عالیم هشداردهنده نشان داد ۹۵ درصد بیماران دارای عالیم هشداردهنده بودند و شایع ترین علامت ها به ترتیب شامل خستگی، اختلالات خواب و درد قفسه سینه بود.

در مطالعه حاضر علامت هشداردهنده، خستگی غیرمعمول و ضعف عمومی بوده است. در مطالعه هوانگ و همکاران (۲۰۱۱) در کره علامت خستگی و ضعف عمومی کمتر گزارش شده است که می تواند ناشی از کم بودن تعداد بیماران زن (یک سوم بیماران) نسبت به مرد باشد و اینکه مطالعه مک سوینی و همکاران بر روی زنان انجام شده است. در مطالعه لوولین و همکاران (۲۰۰۹)، علامت هشداردهنده خستگی در بیماران گزارش شده است. شاید نتیجه متفاوت ناشی از بررسی عالیم هشداردهنده در مدت زمان بیشتر باشد.

در مطالعه ای که در ژاپن توسط ماروهاشی (۲۰۱۰) با عنوان "اثر علامت هشداردهنده آنژین صدری بر پیشرفت سکته بیماران مبتلا به اولین انفارکتوس حاد میوکارد" انجام شد، یک سوم افراد مورد مطالعه عالیم آنژین صدری را ۲۴ ساعت قبل از حمله قلبی داشتند. مطالعه ای توسط یان و همکاران (۲۰۰۹) در چین با عنوان "ارتباط آنژین قبل از انفارکتوس و رفتارهای جستجوی مراقبت و تاثیر آن

بر میزان پرفیوژن مجدد زودهنگام در انفارکتوس حاد میوکارد" نشان داد که نیمی از بیماران، عالیم آنژین صدری را ۴۸ ساعت قبل از شروع حمله قلبی داشتند.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که یک چهارم بیماران، عالیم هشداردهنده گوارشی داشتند. هوانگ و همکاران (۲۰۱۱) در پژوهش خود فراوانی عالیم هشداردهنده گوارشی را گزارش کردند که نزدیک به نتیجه مطالعه حاضر می باشد. تقریباً در هر دو مطالعه، عالیم هشداردهنده گوارشی یکسان مورد بررسی قرار گرفته اند. فراوانی بروز عالیم هشداردهنده تنفسی در این مطالعه با مطالعه هوانگ و همکاران مطابقت دارد. در هر دو تحقیق عالیم تنگی نفس، سرفه و خلط به عنوان عالیم هشداردهنده تنفسی در نظر گرفته شده اند. در مطالعات مک سوبینی و همکاران (۲۰۱۰) و لوولین و همکاران (۲۰۰۹) علامت هشداردهنده تنگی نفس به میزان بیشتر گزارش شده است.

در این مطالعه، بیش از نیمی از افرادی که عالیم هشداردهنده داشتند به درمانگاه یا بیمارستان مراجعه کرده بودند و بقیه، به امید بهبودی خودبخودی مانده بودند یا خوددرمانی یا اقدامات دیگری انجام داده بودند. در مطالعه هوانگ و همکاران (۲۰۱۱) درصد افرادی که عالیم هشداردهنده داشتند به درمانگاه یا بیمارستان مراجعه کرده بودند که تقریباً شبیه نتیجه پژوهش حاضر می باشد. در مطالعه حاضر بین عالیم هشداردهنده و زمان تاخیر ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد. با وجود این که میانگین رتبه زمان تاخیر در بیماران با عالیم هشداردهنده نشود. درصد بیشتری از بیماران با عالیم هشداردهنده، تاخیری بیش از دو ساعت داشتند. در مطالعه هوانگ و همکاران نیز بیماران دارای عالیم هشداردهنده با تاخیر بیشتری مراجعه کرده بودند. در مطالعه ذان و همکاران (۲۰۰۱) نیز گزارش شد بیمارانی که قبل از بروز حمله حاد قلبی، علامت دار بودند با تاخیر بیشتری مراجعه کرده بودند.

بر اساس نتایج این مطالعه، در نیمی از بیماران، فاصله زمانی بین شروع عالیم حاد حمله قلبی و زمان مراجعه به مراکز درمانی کمتر از ۱۲۰ دقیقه بود. این نتیجه با نتایج مطالعه هوانگ و همکاران (۲۰۱۱) همخوانی دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، حداقل زمان مراجعه ۱۵ دقیقه و حداقل ۱۵۰۰ بود. یا (۲۰۰۹) می نویسد، برخی بیماران مبتلا به سکته قلبی، تقریباً تا ۲ ساعت به دنبال درمان نمی روند و از دهه های گذشته این روند وجود داشته است. در مطالعه پرکینز پوراس (۲۰۰۸) با عنوان "تاخیر پیش بیمارستانی بیماران سندرم حاد کرونری"، میانگین زمان تاخیر مراجعه بیماران ۶/۱ ساعت بود، که از میانگین زمان به دست آمده در مطالعه کنونی بیشتر است. تحقیقی در کانادا توسط گلدبُرگ و همکاران (۲۰۰۹) با عنوان "تاخیر پیش بیمارستانی در بیماران با سندرم حاد کرونری" میانگین زمان تاخیر مراجعه را ۲/۸ ساعت گزارش کرد که از میانگین زمان به دست آمده در مطالعه حاضر کمتر می باشد. مطالعه ای در کانادا توسط سازینسکی (۲۰۰۸) با عنوان "روند تاخیر پیش بیمارستانی در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد" نشان داد که ۴۵ درصد بیماران کمتر از ۲ ساعت تاخیر در مراجعه داشتند.

بر اساس نتایج این مطالعه، هرچند اثر محافظتی آنژین قبل از سکته قلبی وجود دارد، اما به دلیل تردید در شناخت عالیم و در نتیجه تاخیر مراجعه، میزان برقراری خونرسانی مجدد و درمان به موقع بیماران مبتلا به سکته قلبی دارای عالیم هشداردهنده کمتر است. زمانی که عوامل خطر زای سکته قلبی تحت کنترل قرار می گیرند، مهمترین عامل پیش بینی کننده سکته قلبی، عالیم هشداردهنده، می باشند (مک سوبینی و همکاران، ۲۰۰۳). بر این اساس، قادر درمان باید علاوه بر عالیم حاد سکته قلبی به عالیم هشداردهنده نیز توجه نمایند. آموزش به افراد دارای خطر بیماری قلبی عروقی برای پیشگیری از بروز حوادث قلبی باید شامل الگوهای عالیم هشداردهنده و تشویق به رفتارهای جستجوی درمانی سریع در زمان شروع عالیم باشد. این آموزش ها به ویژه برای بیماران مشکوک به سکته قلبی حاد ضروری است.

نتیجه گیری

بیشتر بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد عالیم هشداردهنده را در روزهای قبل از حمله قلبی دارند و بیشتر آنها توجهی به عالیم نمی کنند و عده کمتری نیز به مطب پزشکان مراجعه می نمایند. بیمارانی که نشانه های هشداردهنده را داشتند، پس از وقوع عالیم حاد سکته قلبی با تاخیر بیشتری به بیمارستان مراجعه داشته اند. بنابراین یکی از عواملی که می تواند زمان تاخیر را بیشتر کند وجود عالیم هشداردهنده می باشد. شناسایی نشانه های هشداردهنده قدم اصلی در تشخیص زودرس بیماران قلبی عروقی توسط تیم درمانی است. پزشکان و پرستاران باید در مورد نشانه های هشداردهنده بیماران مشکوک به سندرم حاد کرونری سوال نمایند. با توجه

به شیوع بالای بیماری قلبی، به ویژه انفارکتوس میوکارد و مرگ ناشی از آن، امکان پیش بینی حتی با احتمال ضعیف بیماری می تواند کمک موثری در تشخیص زودهنگام بیماری های ایسکمیک قلب باشد تا اقدامات درمانی لازم به موقع انجام شود. آموزش تیم مراقبتی درمانی درباره نشانه های هشداردهنده و اهمیت مراجعت به موقع بیماران مبتلا به سکته قلبی می تواند در پیشگیری و درمان به هنگام موثر واقع شود و از موارد مرگ کم کند.

تقدیر و تشکر

این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد. نویسندهای بدنی وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از شرکت کنندگان در پژوهش که امکان انجام مطالعه حاضر را فراهم ساختند اعلام می دارند.

منابع فارسی

- سبزواری، س.، مطلبی، آ. محمدعلیزاده، س. ۱۳۸۷. بررسی عوامل موثر بر تاخیر در مراجعت بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد به بیمارستان. مجله دانشکده پرستاری مامایی رازی کرمان، ۸، ۴۲-۳۵.
- مشرقی مقدم، ح.، کاظمی، ط.، بشارتی مقدم، ف. ۱۳۸۷. بررسی علائم پرودروم ال در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد. مجله اپیدمیولوژی ایران، ۴، ۱-۵.

منابع انگلیسی

- Braunwald, E. 2015. Heart Diseases. A text book of cardiovascular Medicine, Philadelphia, W B Saunders Co.
- Chughal, H., Ratner, D., Pozo, M., Crouchman, J. A., Niedz, B., Merwin, R. & Lahita, R. G. 2010. Pre-hospital delay and its impact on time to treatment in ST-elevation myocardial infarction. *The American Journal of Emergency Medicine*, 29, 396-400.
- Dracup, K., Mckinley, S., Riegel, B., Moser, D. K., Meischke, H., Doering, L. V., Da-Vidson, P., Paul, S. M., Baker, H. & Pelter, M. 2009. A randomized clinical trial to reduce pa-tient prehospital delay to treatment in acute coronary syndrome. *Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes*, 2, 524-532.
- Hwang, S. Y., Zerwic, J. J. & Jeong, M. H. 2011. Impact of prodromal symptoms on prehospital delay in patients with first-time acute myocardial infarction in Korea. *Journal of cardiovascular nursing*, 26, 194-201.
- Khraim, F. M. & Carey, M. G. 2009. Predictors of pre-hospital delay among patients with acute myocardial infarction. *Patient Education and Counseling*, 75, 155-161.
- Goldberg, R. J., Spencer, F. A., Fox, K. A. A., Brieger, D., Steg, P. G., Gurinkel, E., et al. . 2009. Prehospital Delay in Patients With Acute Coronary Syndromes (from the Global Registry of Acute Coronary Events [GRACE]). *The American Journal of Cardiology*103, 598-603.
- Ladwig, K.-H., Meisiger, C., Hymer, H., Wolf, K., Heier, M., Vonschedeit, W. & Kuch, B. 2011. Sex and age specific time patterns and long term time trends of pre-hospital delay of patients presenting with acute ST-segment elevation myocardial infarction. *International journal of cardiology*, 152, 350-355.
- Lovlien, M., Johansson, I., Hole, T. & Schei, B. 2009. Early Warning Signs of an Acute Myocardial Infarction and Their Influence on Symptoms During the Acute Phase, With Comparisons by Gender. *GENER MEDICINE*, 6, 444-453.
- Maruhashi, T., Ishihara, M., Inoue, I., Kawagoe, T., Shimatani, Y., Kurisu, S., Naka-ma, Y., Kagawa, E., Dai, K. & Matsushita, J. 2010. Effect of prodromal angina pectoris on the infarct progression in patients with first ST-elevation acute myocardial infarction. *Circulation Journal*, 74, 1651-1657.
- Mcsweeney, J. C., O'Sullivan, P., Cleves, M. A., Lefle,r L. L, Cody, M., Moser D. K., & Etal. 2010. Racial Differences in Women's Prodromal and Acute Myocardial Infarction Symptoms. *Am J Crit Care*, 19, 63-73.
- Mcsweeney, J. C., Cody, M., O'sullivan, P., Eiberson, K., Moser, D. K. & Garvin, B. J. 2003. Women's early warning symptoms of acute myocardial infarction. *Circulation*, 108, 2619-2623.
- McSweeney, J. C., Cleves, A. M., Cole, S. C., Fischer, P. E. . 2009. Detecting and Treating Symptoms: Women' Sleep Disturbance Associated With Coronary Heart Disease *Circulation Journal*, 20, 5503-4.
- Mcsweeney, J. C., O'sullivan, P., Cody, M. & Crane, P. B. 2004. Development of the McSweeney acute and prodromal myocardial infarction symptom survey. *Journal of Cardiovascular Nursing*, 19, 58-67.
- Nguyen, H. L., Saczynski, J. S., Gore, J. M. & Goldberg, R. J. 2010a. Age and sex differences in duration of prehospital delay in patients with acute myocardial infarction a systematic review. *Circula-tion: Cardio-*

Cardiovascular Nursing Journal, 4(4), Winter 2016

- vascular Quality and Outcomes, 3, 82-92.
- Nomura, T., Tatsumi, T., Sawada, T., Kojima, A., Urakabe, Y., Enomoto-Uemura, S., et al. 2010. Clinical manifestations and effects of primary percutaneous coronary intervention for patients with delayed pre-hospital time in acute myocardial infarction. *Journal of Cardiology*, 56, 204-210.
- Perkins-Porras, L., Whitehead, D. L., Strike, P. C. & Steptoe, A. 2009. Pre-hospital delay in patients with acute coronary syndrome: Factors associated with patient decision time and home-to-hospital delay. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 8, 26-33.
- Pinto, D. S., Kirtane, A. J., Nallamothu, B. K., Murphy, S. A., Cohen, D. J., Laham, R. J., Cutlip, D. E., Bates, E. R., Frederick, P. D. & Miller, D. P. 2006. Hospital Delays in Reperfusion for ST-Elevation Myocardial Infarction Implications When Selecting a Reperfusion Strategy. *Circulation*, 114, 2019-2025.
- Saczynski, J. S., Yarzebski, J., Lessard, D., Spencer, F. A., Gurwitz, J. H., Gore, J. M., et al. 2008. Trends in Prehospital Delay in Patients With Acute Myocardial Infarction (from the Worcester Heart Attack Study). *The American Journal of Cardiology*, 102, 1589-94.
- Vaccarino, V., Badimon, L., Corti, R., Dewit, C., Dorobantu, M., Hall, A., Koller, A., Marzilli, M., Pries, A. & Bugiardini, R. 2011. Ischaemic heart disease in women: are there sex differences in pathophysiology and risk factors? Position paper from the working group on coronary pathophysiology and microcirculation of the European Society of Cardiology. *Cardiovascular research*, 90, 9-17.
- Yan, H., Song, L., Yang, J., Sun, Y. & Hu, D. 2009. The association between pre-infarction angina and care-seeking behaviors and its effects on early reperfusion rates for acute myocardial infarction. *International Journal of Cardiology*, 135, 86-92.
- Zahn, R., Schiele, R., Schneider, S., Gitt, A. K., Seidl, K., Bossaller, C., Schuler, G., Gottwik, M., Altmann, E. & Rosahl, W. 2001. Effect of preinfarction angina pectoris on outcome in patients with acute myocardial infarction treated with primary angioplasty (results from the Myo-cardial Infarction Registry [MIR]). *The American journal of cardiology*, 87, 1-6.

Original Article

Relationship between prodromal (warning) symptoms and referring time in patients with myocardial infarction

Lida Soltani¹, PhD Student

Ali Ravari², PhD

* Sakine Sabzevari³, PhD

Abstract

Aim. The aim of the study was to determine the relationship between prodromal symptoms and referring time in patients with myocardial infarction in cardiac care unit of Rafsanjan Imam Ali-ibn Abi-Talib hospital in 2012.

Background. There is little information about how people respond to prodromal symptoms of myocardial infarction and how fast they refer to medical centers.

Method. In a cross-sectional study, 175 patients with acute myocardial infarction were recruited. For data collection, lasting about seven months, a questionnaire consisting of demographic data, risk factors for heart disease, prodromal symptoms, referring time and causes of delay was used. Questionnaires were completed by the researcher with bedside interview with patient and using medical records. Data were analyzed in SPSS version 18 using descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency distribution and percentage) and inferential statistics (Chi-square test and Pearson coefficient).

Findings. The majority of patients were male (76.6%) and middle-aged (53.1). Of 175 patients, 132 (75.4%) had experienced warning sign, two weeks before the cardiac event and 43 (24.6%) had experienced no symptoms. Also, 51 patients (38.6%) had referred the physician office, clinic or hospital after experiencing warning signs. The time duration of patients arrival to hospital ranged from 15 minutes to 1500 minutes. There was a statistically significant correlations between prodromal symptoms and referring time in patients with myocardial infarction ($p=0.007$). Findings showed that the average total referring time was 206.94 minutes.

Conclusion. Recognizing prodromal symptoms leads to earlier seeking treatment in patients with myocardial infarction. Education for increasing public awareness of warning symptoms, especially for those with family history and risk of cardiovascular disease seems to be an appropriate strategy.

Keywords: Myocardial Infarction, Prodromal symptoms, Referring time

1 PhD Student, Department of Medical Surgical Nursing, Faculty of Nursing, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

2 Assistant Professor of Nursing, Geriatric Care Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

3 Assistant Professor of Nursing, Nursing Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
(*Corresponding Author) email: S_Sabzevari@kmu.ac.ir