



## پارامتر سازی اثرات میزان و ترکیب غذا بر رشد و ذخیره مواد مغذی در ماهی قزلآلای رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*)

سحر عباسی فرد<sup>۱</sup>، عبدالصمد کرامت<sup>۲\*</sup>، اسدالله تیموری<sup>۳</sup>، حسین رحمانی<sup>۴</sup>

۱. دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته تکثیر و پرورش آبزیان، ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
۲. استادیار، گروه شیلات، ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
۳. دانشیار، گروه علوم دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
۴. دانشیار، گروه علوم شیلات، ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

تاریخ دریافت: ۹۴/۰۲/۱۳  
تاریخ پذیرش: ۹۴/۰۲/۰۶

<sup>\*</sup>نوسنده مسئول مقاله: amirkola@yahoo.com

می توانند در برنامه ریزی های رشد اقتصادی و توسعه ای مفید باشند (Hua et al., 2009). مدل های بیوانرژیتیک رایج که ذخیره انرژی بدن را تخمین می زند، اطلاعات کمی در رابطه با ترکیب شیمیایی لاشه فراهم می کنند. از سوی دیگر، این مدل ها دارای محدودیت هایی هستند که برای شرایط پیچیده محیطی و تغذیه ای که آبزی پروری با آن مواجه است، کاربری چندانی ندارند. بنابراین نیاز برای مدل های تشریحی که بر پایه کاربرد مواد مغذی و فرایندهای بیوشیمیایی درون سلولی پس از مصرف غذا باشند، احساس می شود (Bureau & Hua 2008).


این تحقیق به منظور طراحی مدلی به منظور پیش بینی دقیق تر رشد و ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزلآلای رنگین کمان انجام شد. چارچوب اصلی کار برگرفته از مدل رشد تحت عنوان Fish growth simulator; FGS2 (برای Ricker, 1979; Tran-duy, 2008) مدل هایی که بتوانند پیش بینی رشد ماهی قزلآلای بود که اثرهای سطوح غذا و ترکیب های مختلف غذا روی رشد این ماهی را بررسی

یکی از اهداف علم تغذیه بدلیل مواد غذایی به بافت (افزایش رشد) با کارایی بالا در کمترین زمان ممکن است. به همراه افزایش رشد، کیفیت و ترکیبات تشکیل دهنده محصولات تولید شده نیز می تواند با اهمیت باشد (Mohiti-Asliet al., 2012). در این باره تعیین رابطه کلی بین مصرف غذا، افزایش وزن و ترکیب شیمیایی بدن به منظور پیش بینی رشد و احتیاجات مواد مغذی و نیز مدیریت تولید مفید به نظر می رسد (Dumaset al., 2010). از طرفی تعیین روابط بین مصرف غذا و رشد برای انواع مختلف غذا برای دسته های وزنی مختلف ماهیان در شرایط پرورشی مختلف، نیازمند زمان و هزینه بالاست. به این منظور مدل سازی می تواند به کمک آید و ارتباط بین مصرف غذا و رشد را پیش بینی کند و نقش بسیار مهمی را در برنامه ریزی برای توسعه آبزی پروری ایفا کند (Ricker, 1979; Tran-duy, 2008). مدل هایی که بتوانند پیش بینی دقیق تری از رشد و کارایی غذا داشته باشند،

مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده غذا شامل پروتئین، کربوهیدرات و چربی است. طی فرایند هضم پروتئین، کربوهیدرات و چربی به ترتیب به آمینو اسیدها، گلوکز و اسیدهای چرب و گلیسرول تبدیل می‌شوند. با توجه به اهداف و نوع کارکرد هر مدل اجزای مدل بر اساس آن می‌تواند تعریف و بازنویسی گردد. این اجزا باید قابلیت کمی شدن (محاسبه) در مدل داشته باشند. این پارامترها شامل: ۱. هضم پذیری: که برای پروتئین، چربی و کربوهیدرات به ترتیب ۹۳، ۹۰ و ۴۵ درصد قرار داده شد. (Borquezet et al., 2011; Zhang et al., 2012; Palmegiano et al., 2006; Cho, 1992) برای تعیین متabolism روتین: از معادله  $HeE = (-0.01 + 3.26 \times T - 0.05 \times T^2) \times MBW$  در حالی که  $HeE$  گرمای تولید شده در شرایط گرسنگی است ( $kJ/day$ ),  $T$  درجه حرارت آب  $(^{\circ}C)$  و  $MBW$  (وزنی متabolism) =  $kgBW^{-0.8}$  (میزان وزنی متabolism)

کرده و در زمان خود موفقیت خوبی به همراه داشت (Van Dam and Penning de Vries, 1995) (FGS2) می‌تواند رشد و چربی و پروتئین ذخیره شده را با توجه به میزان و ترکیب غذا و درجه حرارت محیط پیش‌بینی کند. اما این مدل با توجه به گذر زمان و تغییرات به وجود آمده، نیاز به پارامترسازی دوباره دارد. بعضی از پارامترهای مدل FGS2 با پیشرفت تکنولوژی، تغییر ترکیب شیمیایی غذا و بهبود روش‌های اندازه‌گیری دستخوش تغییراتی شده که باید در مدل اصلاح شود. از جمله این پارامترها قابلیت هضم‌پذیری برای پروتئین، چربی و کربوهیدرات، متabolism روتین، متabolism تغذیه و رابطه بین پروتئین و وزن‌تر ماهی هستند. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، اصلاح مدل FGS2 به منظور پیش‌بینی دقیق‌تر رشد و ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان *Oncorhynchus mykiss* است.

مهم‌ترین اجزای مدل و روابطشان در شکل ۱ نشان داده شده است که بر اساس مدل FGS2 است. نقطه آغازین در این مدل میزان و ترکیب غذای مورد استفاده است.



شکل ۱ دیاگرام روابط میان اجزای مدل (اقتباس از مدل FGS2)

این مطالعه میزان تلفات گرمایی برای هر کدام از مواد غذی به طور جداگانه بر اساس ترکیب غذا محاسبه و با هم جمع شد.

۳. متابولیسم تغذیه: تلفات گرمایی برای گلوکز ۶٪ میزان گلوکز مصرف شده از طریق غذا، برای چربی ۱۳٪ و برای پروتئین ۳۰٪ اندازه گیری شد (Gordon et al., 1977). در

وزن تر ذخیره شده به این صورت به دست آمد ( $Y = 1/52$ ,  $r^2 = 0.924$ )، ARE =  $67.63\%$ . با محدوده  $0.86\%$ -تا  $0.72\%$  است.

داده های مورد استفاده در این آزمایش برای مدل (FGS2): هم تست شد. میزان توافق بین مقادیر پیش‌بینی شده (Y) و مشاهده شده (X) برای پروتئین ذخیره شده بدین صورت به دست آمد:  $0.101 \pm 0.1787X$ , ARE =  $20.9\%$ ,  $r^2 = 0.886$ ,  $Y = 0.9053 - 0.053X$ , ARE =  $29.4\%$ . با محدوده  $12.17\%$ -تا  $86.8\%$  این مقادیر برای چربی ذخیره شده به صورت صورت به دست آمد ( $Y = 0.94X + 0.904$ ), ARE =  $21.4\%$ ,  $r^2 = 0.902$ ,  $Y = 2.051X - 0.982$ , ARE =  $21.4\%$ , با محدوده  $35.2\%$ -تا  $93.9\%$ , که در نمودار ۲ نشان داده شده‌اند.

نتایج به دست آمده نشان داد که مدل پیشنهاد شده در این تحقیق پروتئین ذخیره شده و وزن تر ماهی را با درصد خطای کمتری نسبت به مدل FGS2 پیش‌بینی می‌کند، ولی ARE (میانگین خطای نسبی) برای تخمین چربی ذخیره شده در این مدل تقریباً با درصد خطای تخمین چربی ذخیره شده در مدل FGS2 برابر بود. میزان ضریب هضم‌پذیری می‌تواند یکی از دلایل این اختلاف باشد. با گذشت سال‌ها و بهبود کیفیت غذا، هضم‌پذیری مواد غذی افزایش یافته و همچنین عموماً هضم‌پذیری چربی بیشتر از پروتئین است (Cho and Bureau, 2001). بنابراین بهبود ضرایب هضم‌پذیری با در اختیار قراردادن مقادیر واقعی ترموماد غذی در فرایند سوخت ساز می‌تواند منجر به پیش‌بینی دقیق‌تری از میزان پروتئین ذخیره شده و رشد گردد.

در مدل حاضر میزان پروتئین و چربی ذخیره شده نسبت به مدل قبلی کمتر برآورد شد. تخمین بیشتر میزان

کاربری بیوسنتر: انرژی که برای ساخت هر گرم از پروتئین و چربی مصرف می‌شود و بر اساس گزارش Jobling (1985) به ترتیب  $70 \text{ g}^{-1}$  ATP mol گزارش شد که در این مطالعه نیز همین مقدار قرار داده شد.

۵. رابطه بین پروتئین و وزن بدن: رابطه مستقیم بین وزن بدن و پروتئین ذخیره در بافت‌ها وجود دارد و با افزایش وزن بدن میزان ذخیره پروتئین‌افزایش می‌یابد (Dumas et al., 2007).

در این تحقیق داده‌های موجود در چهار آزمایش برای تست مدل استفاده شد (Azevedo et al., 1998; Bureau et al., 2004 a; Azevedo et al., 2004 b; 2006). دلیل انتخاب این آزمایش‌ها کامل‌تر بودن داده‌های انتشار یافته و نزدیک‌تر بودن شرایط آزمایشی به هم‌دیگر بود. برای مقایسه نتایج پیش‌بینی مدل با نتایج آزمایش از مقدار RE (Relative error) (خطای نسبی) و relative error (میانگین خطای نسبی) استفاده شد (Tran Duy, 2008).

$$RE_i = \frac{SW_i - EWi}{0.05 \times (SW_i + EWi)} \times 100$$

$$ARE = \sum_{i=1}^n RE_i$$

در حالی که REi خطای نسبی برای موردano SWi مقدار پیش‌بینی شده توسط مدل و EWi مقدار مشاهده شده در آزمایش است.

نتایج این تحقیق نشان داد که میزان توافق بین مقادیر پیش‌بینی شده (Y) و مشاهده شده (X) برای پروتئین ذخیره شده بدین صورت به دست آمد:  $0.072 \pm 0.077X$ , ARE =  $52.0\%$ ,  $r^2 = 0.97$ ,  $Y = 1.347X - 0.069$ , ARE =  $58.2\%$ . این مقادیر برای چربی ذخیره شده به صورت ( $Y = 1.095X - 0.896$ ,  $r^2 = 0.896$ , ARE =  $30.0\%$ ) با محدوده  $28.2\%$ -تا  $57.9\%$  برای

درصدی از انرژی مورد نیاز برای متابولیسم که توسط چربی تأمین می شود و رابطه میزان پروتئین به انرژی جیره با این پارامتر و همچنین ساخت معادله ای با درصد خطای پایین برای پیش‌بینی دقیق وزن تر بدن است.

#### منابع

- Azevedo, P.A., Cho, C.Y., Leeson, S. & Bureau, D.P. 1998.** Effects of feeding level and water temperature on growth, nutrient and energy utilization and waste outputs of Rainbow trout (*Oncorhynchusmykiss*). *Aquatic Living Resources*, 11: 227-238.
- Azevedo, P.A., Leeson, S., Cho, C.Y. & Bureau, D.P. 2004a.** Growth, nitrogen and energy utilization of juveniles from four salmonid species: diet, species and size effects. *Aquaculture*, 234: 393-414.
- Azevedo, P.A., Leeson, S., Cho, C.Y. & Bureau, D.P. 2004b.** Growth and feed (*Oncorhynchusmykiss*) and Atlantic salmon (*Salmo salar*) reared in freshwater: diet and species effects, and responses utilization of large size rainbow trout over time. *Aquaculture Nutrition*, 10:401-411
- Borquez, A., Serrano, E., Dantagnan, P., Carrasco, J. & Adrian, H. 2011.** Feeding high inclusion of whole grain white lupin (*Lupinus albus*) to rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*): effects on growth, nutrient digestibility, liver and intestine histology and muscle fatty acid composition. *Aquaculture Research*, 42: 1067-1078.
- Bureau, D.P., Hua, K. 2008.** Models of nutrient utilization by fish and potential application for fish culturoperation. In *Mathematical Model in Animal Nutrition* (Eds J. France & E. Kebreab), pp. 442-461.
- Bureau, D.P., Hua, K. & Cho, C.Y. 2006.** Effect of feeding level on growth and nutrient deposition in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss Walbaum*) growing from 150 to 600 g. *Aquaculture Research*, 37:1090-1098.
- Cho, C.Y., Bureau, D.P. 2001.** A review of diet formulation strategies and feeding systems to reduce excretory and feedwastes in aquaculture. *Aquaculture Research*, 32: 349-360.
- Dumas, A., de Lange, C.F.M., France, J. & Bureau, D.P. 2007.** Quantitative description of body

پروتئین، چربی ذخیره شده و وزن تر ماهی توسط مدل FGS2 در مقایسه با مدل ساخته شده در این تحقیق حاکی از این است که مدل FGS2 قسمت بیشتری از مواد غذایی هضم شده را به نسبت میزان واقعی، به بیوکس تبدیل می کند. چنین شرایطی می تواند نشان دهنده این باشد که در ماهی میزان بیشتری از این مواد برای تأمین انرژی متابولیسمی اکسید می شوند و میزان انرژی متابولیسم کل بیشتر از مقداری است که در مدل FGS2 محاسبه شد. Machiels and Henken, 1987. نیز در بررسی نتایج خود به این نتیجه رسیدند که میزان انرژی مورد نیاز برای متابولیسم تغذیه و متابولیسم روتین در آزمایش های تست شده بالاتر از میزانی است که آنها برآورده اند. وجود چنین خطایی می تواند ناشی از انتخاب روش محاسبه متابولیسم روتین باشد.

مدل ساخته شده در این تحقیق عمدتاً برآورده کمتری از میزان وزن بدن در مقایسه با آزمایش می دهد. تخمین وزن تر ماهی به طور مستقیم با تخمین پروتئین ذخیره شده در ارتباط است و چون رابطه ای که از آن برای این برآورده استفاده می شود (From & Rasmussen 1984) خود به تنهایی تخمین کمتری از میزان واقعی را نشان می دهد. بنابراین حتی اگر ما دقیق تر بپیش بینی را برای پروتئین ذخیره شده داشته باشیم، پیش بینی وزن تر ماهی همواره کمتر خواهد بود. بنابراین استفاده از یک رابطه مطمئن با پیش بینی دقیق می تواند در تخمین درست وزن تر ماهی مؤثر باشد.

با وجود اینکه مدل پیشنهادی این تحقیق در مقایسه با FGS2 پیش بینی دقیق تری از ذخیره مواد غذایی دارد، اما به نظر لازم است تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا زمینه استفاده بیشتر علم مدل سازی در پیش بینی فرایند رشد و ترکیب شیمیایی بدن فراهم شود. از جمله مواردی که نیاز به آزمایش های بیشتری دارند تعیین دقیق

and *Oncorhynchus mykiss* (Walbaum). *Aquaculture Research*, 26: 415-425.

**Zhang, Y., Overland, M., Sørensen, M., Penn, M., Mydland, L. T., Shearer, K. D. & Storebakken, T., 2012.** Optimal inclusion of lupin and pea protein concentrates in extruded diets for rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Aquaculture*, 360-361: 344-349.

composition and rates of nutrient deposition in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Aquaculture*, 273:165-181.

**Dumas, A., France , J. 2010.** Modelling growth and body composition in fish nutrition: where have we been and where are we going. *Aquaculture Research*, 41: 161-181

**From J., Rasmussen, G. 1984.** A growth model, gastric evacuation, and body composition in rainbow trout *Salmogairdneri Richardson. Dana*, 3: 61-139.

**Gordon, M.S., Bartholomew, C.A., Grinnell, A.D., Jorgensen, C.B. & White, F.N. 1977.** Animal Physiology: Principle and Adaptations, 3rd edn, New York, Macmillan.

**Hua, k., Birkett, S., de Lange, K.& Bureau, D.P. 2009.** Adaptation of a non-ruminant nutrient-based growth model to rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Agricultural Science*, 148: 17-29.

**Machiels, M.A.M. and Henken,A.M.1986.** A dynamic simulation model for growth of the African catfish, *Clarias gariepinus* (Burchell 1822) I. Effect of Feeding level on Growth and Energy Metabolism. *Aquaculture*, 56: 29-52.

**Mohiti-Asli, M., Shivazad, M., Zaghari, M., Aminzadeh, S., Rezaian, M., Mateos, G.G. 2012.** Dietary fibers and crude protein content alleviate hepatic fat deposition and obesity in broiler breeder hens. *Poultry Science*, 91: 3107–3114.

**Palmegiano, G.B., Daprà, F., Forneris, G., Gai F., Gasco, L., Guo, K., Peiretti, P.G., Sicuro, B. and Zoccarato, I. 2006.** Rice protein concentrate meal as a potential ingredient in practical diets for rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Aquaculture*, 258: 357–367

**Ricker, W.E. 1979.** Growth rates and models. In: W.S. Hoar, D.J. Randall and J.R. Brett (Editors), Fish Physiology, Vol. VIII: Bioenergetics and Growth. Academic Press, New York, pp. 678-744 .

**Tran Duy, A. 2008.** Modeling fish growth using the concentration of metabolites to regulate feed intake and metabolism. PhD thesis at Wageningen University, The Netherlands.

**Van Dam, A. A., Penning, De Vries, F. W.T. 1995.** Parameterization and calibration of a model to simulate effects of feeding level and feed composition on growth of *Oreochromis niloticus*(L.)

---

## Parameterization of feeding levels and feed composition on growth model and nutrient retention in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*)

Sahar Abbasyfar<sup>1</sup>, Abdolsamad Kermat Amirkolaie<sup>2\*</sup>, Asadollah Taimouri Yansari<sup>3</sup>, Hosein Rahmany<sup>4</sup>

1- M.Sc. Graduated, Department of Animal Sciences, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural and Natural Resources University, Sari

2-Assistant Prof., Department of Fisheries, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural and Natural Resources University, Sari

3- Associate Prof., Department of Fisheries, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural and Natural Resources University, Sari

4- Associate Prof., Department of Fisheries, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural and Natural Resources University, Sari

---

\*Corresponding author: amirkola@yahoo.com

---

### Abstract

This study was to up-grade a model leading to a more accurate prediction of growth and body composition in rainbow trout. Based on an earlier model (FGS2) predicting fat and protein retention in relation to feed level and composition, we tested the model using the latest nutritional experiment conducted on rainbow trout. The result showed that our model predicted more accurately by up-grading digestibility estimates for protein, fat and carbohydrate and also maintenance and feeding metabolism than that of FGS2. A more accurate prediction observed in relation to wet weight gain and protein retention can be resulted from the correction of digestibility estimates, calculation of heat loss based on feed composition and changing of routine metabolism coefficient.

**Key words:** Growth model, Routine metabolism, Rainbow trout, Digestibility