



دوماهنامه طب جنوب

پژوهشکده زیست-پزشکی خلیج فارس

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

سال نوزدهم، شماره ۶، صفحه ۹۵۱-۹۶۱ (بهمن و اسفند ۱۳۹۵)

Iran South Med J 2017; 19(6): 951-961

## نانو حامل پلیمری Diblock و کورکومین، رویکردی جدید به منظور غلبه بر مقاومت دارویی در سرطان سینه

سمیرا حاجی‌غلامی<sup>۱</sup>، زیبا ویسی‌ملکشاهی<sup>۲\*</sup><sup>۱</sup> گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس<sup>۲</sup> گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

(دریافت مقاله: ۹۴/۴/۱۹ - پذیرش مقاله: ۹۴/۹/۱۶)

### چکیده

زمینه: سرطان سینه یکی از علت‌های مرگ و میر در جهان می‌باشد. نیمی از افراد با بیماری متاستاتیک مقاومت به تاموکسی芬 را گسترش می‌دهند و تقریباً تمام بیماران سرانجام به تاموکسی芬 مقاومت پیدا می‌کنند. بهمنظور مقابله با تأثیرات منفی تاموکسی芬، این دارو در ترکیب با ماده ضدسرطان کورکومین که سمیت کمتری نسبت به تاموکسی芬 دارد، قرار گرفت. در این تحقیق به منظور بسته‌بندی تاموکسی芬 در کنار کورکومین از نانو حامل پلیمری دی‌بلک (دندروزوم) استفاده شد و تأثیر ترکیب حاصل شده (نانو تاموکسی芬 + کورکومین) بر سلول‌های MCF-7 مقاوم به تاموکسی芬 و سلول‌های فیبروبلاست مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها: MTT Assay به منظور بررسی تأثیر ضد تکثیر و سمیت دارو مورد استفاده قرار گرفت. فلوسایتومتری و Annexin-V-FLUOS به ترتیب به منظور بررسی تأثیر ضد تکثیر و القای آپوپتوز استفاده شد.

یافته‌ها: نانو (تاموکسی芬+کورکومین) در مقایسه با داروی تاموکسی芬 تأثیرات سمی کمتری بر سلول‌های نرمال داشت و باعث افزایش فعالیت آپوپتوزی و کاهش تکثیر در سلول‌های MCF-7 مقاوم به تاموکسی芬 شد. کورکومین و تاموکسی芬 با خاصیت سینرژیستی و القای آپوپتوز را در سلول‌های MCF-7 مقاوم به تاموکسی芬 نسبت به تاموکسی芬، نانو تاموکسی芬 و نانو کورکومین افزایش دادند.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد که تغییرات اعمال شده بر تاموکسی芬 توسط نانو حامل پلیمری و کورکومین به درمان مؤثرتر سرطان سینه کمک می‌کند.

وازگان کلیدی: کورکومین، تاموکسی芬، نانو حامل پلیمری، سرطان سینه

\* تهران، گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

E mail: zvemalekshahi@yahoo.com

## مقدمه

سرطان سینه شایع ترین بیماری بدخیم در میان زنان و دومین علت مرگ به دنبال سرطان می‌باشد. سرطان سینه به عنوان شایع ترین سرطان تهابی در میان زنان جهان محسوب می‌شود. این سرطان در اثر چندین جهش در ژن‌های کنترل کننده مسیرهای حیاتی سلول از جمله رشد و نمو و آپوپتوز به وجود آمده و منجر به تولید توده‌های سلولی توموری می‌شود (۱-۲).

بر طبق مطالعات اپیدمیولوژیک، سالانه هزاران مورد جدید به بیماران اضافه می‌شود و میزان مرگ و میر آن فراوان می‌باشد (۳). درمان‌های رایجی که در بیماری سرطان استفاده می‌گردد، شامل جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی و فناوری نانو می‌باشد (۴). سرطان‌های سینه ER+ تقریباً ۷۰ درصد کل سرطان‌های سینه را تشکیل می‌دهند و غالباً با تاموکسیفون که یک آنتیاستروژن است درمان می‌شوند. اگر چه تاموکسیفون دارویی مؤثر در درمان سرطان سینه ER+ محسوب می‌شود، اما مصرف طولانی مدت آن می‌تواند با آثار جانبی بر سایر ارگان‌ها همراه باشد (۵ و ۶).

یکی از مهم‌ترین تأثیراتی که مصرف طولانی مدت تاموکسیفون بر جای می‌گذارد، مقاومت ایجاد شده در سلول‌های سرطانی سینه است که حتی با وجود تاموکسیفون این سلول‌ها به رشدشان ادامه می‌دهند. ۵۰ درصد افراد با بیماری متاستاتیک به صورت جدید مقاومت به تاموکسیفون را گسترش می‌دهند و تقریباً تمام بیماران سرانجام به تاموکسیفون مقاومت پیدا می‌کنند. تقریباً ۴۰ درصد بیماران مبتلا به سرطان سینه، بعد از ۱-۳ سال درمان با تاموکسیفون به آن مقاوم می‌شوند (۷). بکار بردن یک ترکیب زیستی در کنار تاموکسیفون که سمیت کمتری نسبت به تاموکسیفون بر سلول‌های نرم‌مال داشته باشد و در همراهی با تاموکسیفون خاصیت

ضدتوموری برابر و یا بیشتری بر سلول‌های سرطانی داشته باشد، می‌تواند به درمان سرطان سینه به صورت مؤثرتر و ایمن‌تری کمک کند (۸-۹). کورکومین یک ترکیب پلی‌فلنی است که از ریشه زردچوبه استخراج می‌شود. این ترکیب دارای خواص ضد سرطانی، ضد تکثیر سلولی، ضد التهاب، ضد جهش‌زاوی و آنتی اکسیدانی است. کورکومین می‌تواند بر بسیاری از مکانیسم‌های شکل گرفته در سلول‌های مقاوم به تاموکسیفون غلبه کند و سلول‌های مقاوم را به سلول‌های حساس به تاموکسیفون تبدیل کند.

کاهش دوز مصرفی تاموکسیفون می‌تواند تا حدود زیادی سمتی ایجاد شده بر سلول‌های نرم‌مال را کاهش دهد. از طرف دیگر قرار گرفتن کورکومین در کنار دوز کاهش یافته تاموکسیفون، خاصیت ضد توموری دوز کاهش یافته تاموکسیفون را احیا می‌کند و القای آپوپتوز را به حالت اولیه و حتی بیشتر می‌رساند.

مطالعات گسترده‌ای که در زمینه کورکومین صورت گرفته است، حاکی از حلالیت ضعیف، جذب کم و متابولیسم سریع این ترکیب دارویی و در نتیجه محدودیت استفاده از آن به دلیل زیست ماندگاری ضعیف کورکومین می‌باشد (۱۰ و ۱۱). راهکارهای مؤثر برای رفع این مشکل شامل استفاده از ادجوانت‌ها، لیپوزوم‌ها، میسل‌ها و ذرات نانو می‌باشد.

امروزه به منظور افزایش حلالیت و در نتیجه افزایش خاصیت ضد سرطانی کورکومین از ناقلين مختلفی برای رسانش دارو استفاده می‌شود. یکی از مهم‌ترین ناقلين، دندروروزوم‌ها می‌باشد. دندروروزوم‌ها در مقایسه با سایر ناقلين دارویی از جمله لیپوزوم‌ها، نانوذرات و غیره از مزایای متعددی از جمله پایداری، عدم سمتی و زیست تخریب‌پذیری برخوردارند. نانو حامل پلیمری صرف نظر از اینکه به پایداری کورکومین در شرایط زیستی

**آماده‌سازی ترکیبات**

در این مطالعه از ۴ ترکیب دارویی استفاده شد. این ترکیبات شامل تاموکسیفن (Sigma-USA)، Sigma-Aldrich، نانو کورکومین (کورکومین از شرکت Sigma-Aldrich, USA) (Sigma-Aldrich, USA تاموکسیفن + کورکومین) می‌باشند. همچنین از پلیمر Diblock به عنوان نانو حامل استفاده شد. نسبت ترکیب برای نانوترکیبات به این صورت: تاموکسیفن ۱، کورکومین ۳ و نانو حامل پلیمری ۵ بود.

غلظت‌های دارویی به کار برده شده برای داروی نانو تاموکسیفن و نانو (تاموکسیفن+کورکومین) بر اساس مقدار تاموکسیفن به کار برده شده و برای نانو کورکومین بر اساس کورکومین به کار برده شده در آن ترکیب در نظر گرفته شد.

#### تعیین درصد بقا سلول‌ها

میزان بقا و رشد سلولی توسط تست بیوشیمیایی MTT(methylthiazol tetrazolium) جهت انجام تست، سلول‌های MCF-7 مقاوم به تاموکسیفن و فیبروبلاست توسط تریپسینه کردن و با تراکم بیشتر از ۷۰ درصد جمع‌آوری شدند. سپس در پلیت ۹۶ خانه‌ای الایزا، تعداد ۸۵۰۰، ۶۰۰۰، ۳۵۰۰ سلول در هر چاهک، به ترتیب در زمان‌های ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت برای سلول‌های MCF-7 مقاوم به تاموکسیفن و تعداد ۶۰۰۰، ۵۰۰۰، ۴۰۰۰ سلول در هر چاهک، به ترتیب در زمان‌های ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت برای سلول‌های فیبروبلاست منتقل شدند و به مدت ۲۴ ساعت کشت داده شدند (تعداد سلول‌ها در هر چاهک و در هر دوره زمانی توسط منحنی استاندارد به دست آمده است). در واکنش جداگانه‌ای، سلول‌ها با غلظت (۱-۳۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر) از داروی نانو

بدن کمک می‌کند، می‌تواند به بسته‌بندی تاموکسیفن و کورکومین در کثارت هم کمک کند (۸ و ۹). با توجه به مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، خواص ضد سرطانی و سم‌زدایی بسیاری در مورد کورکومین نمایان شده است. از این رو پتانسیل بالای این دارو در امور درمانی، مطالعه حاضر را به سمت ایجاد ترکیباتی از کورکومین و سایر داروهای موجود سوق داد. با توجه به شیوع سرطان سینه در ایران، در این تحقیق بر آن شدید تأثیر همراهی کورکومین و تاموکسیفن به کمک نانو حامل پلیمری را بر روی سلول‌های MCF-7 مقاوم به تاموکسیفن بررسی کنیم. رده سلولی MCF-7 به عنوان یک مدل شناخته شده برای مطالعات آزمایشگاهی (in vitro) سرطان سینه می‌باشد.

#### مواد و روش‌ها

##### کشت سلول

رده سلولی MCF-7 از انسستیتو پاستور ایران خریداری شد. این رده سلولی در محیط کشت حاوی FBS (DMEM, Gibco, USA) ۱۰ درصد GIBCO, USA) ۱ درصد پنیسیلین و استرپتومایسین تحت شرایط ۵ درصد CO<sub>2</sub> و دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد در در فلاسک T-75 کشت داده شد.

**مقاوم سازی سلول MCF7** به داروی تاموکسیفن بعد از کشت، این سلول‌ها به طور متنابض تحت تیمار تاموکسیفن قرار گرفتند. غلظت اولیه داروی تاموکسیفن کمتر از IC<sub>50</sub> در نظر گرفته شد. اما با گذشت زمان سلول‌ها به غلظت بیشتری از دارو نیاز داشتند تا میزان مرگ و میر سلول‌های MCF7 مشخص شوند. این عمل طی ۱۵ پاساژ به مدت ۴ ماه تکرار شد تا سلول‌هایی حاصل شد که در غلظتی تقریباً دو برابر IC<sub>50</sub> تاموکسیفن، شروع به مرگ و میر داشتند.

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده‌های به دست آمده از دستگاه فلوسیتومتر به کمک نرمافزار Flowing تفسیر شدند.

### بررسی آپوپتوز

سنجهش آپوپتوز با استفاده از Annexin-V-Fluos و با استفاده از کیت PI staining (Roche, Germany) مطابق دستورالعمل کیت انجام گرفت. برای آنالیز داده‌ها از فلوسیتومتر FACSCalibur™ و نرمافزار Flowing استفاده شد.

### آنالیز آماری

همه تست‌ها سه بار تکرار شدند. جهت آنالیز داده‌های به دست آمده از T-test، برای بررسی معنادار بودن نتایج از P-value استفاده شد. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرمافزار GraphPad Prism انجام شد.

### یافته‌ها

#### تعیین درصد بقا سلول‌ها

بررسی مقادیر IC<sub>50</sub> به دست آمده از MTT assay test برای سلول‌های MCF-7 مقاوم به تاموکسیفین و سلول‌های نرمال فیبروبلاستی HFSF-PI3 تحت تیمارهای دارویی تاموکسیفین، نانو تاموکسیفین، نانو کورکومین و نانو (تاموکسیفین + کورکومین) در دوره‌های زمانی مختلف نشان داده شده است (جدول ۱). IC<sub>50</sub> برای تیمار تاموکسیفین سلول‌های MCF-7 مقاوم به تاموکسیفین بیشتر از سلول‌های نرمال فیبروبلاستی HFSF-PI3 و این اختلاف با  $P=0.0068$  معنادار بود (جدول ۱).

(تاموکسیفین + کورکومین)، نانو تاموکسیفین و تاموکسیفین و با غلظت (۱۰-۶۰ میکروگرم بر میلی لیتر) از نانوکورکومین و غلظت (۲۰-۲۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر) از نانو حامل پلیمری دی بلاک تحت تیمار قرار گرفتند. بعد از گذشت مدت زمان‌های ۷۲، ۴۸، ۲۴، ۲۰ ساعت به هر چاهک میزان ۲۰ میکرولیتر از محلول MTT با غلظت (۵ میلی گرم بر میلی لیتر) اضافه شد و پلیت‌ها به مدت ۴ ساعت انکوبه شدند. در این مرحله محلول رویی دور ریخته شد و به هر چاهک ۲۰ میکرولیتر حلal دی متیل سولفوکسید (DMSO) اضافه شد. میزان جذب نوری با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری سنجیده و جذب در طول موج ۵۷۰ نانومتر خوانده شد. تمام آزمایشات ۳ بار تکرار شدند.

### بررسی چرخه سلولی


در ابتدا سلول‌های MCF7 مقاوم به تاموکسیفین و فیبروبلاست نرمال پوست (HFSF-PI3) در پلیت ۱۲ خانه‌ای تحت تیمار داروهای نانو (تاموکسیفین + کورکومین)، نانوکورکومین، نانو تاموکسیفین و تاموکسیفین در غلظتی برابر با (۱-۳ میکروگرم بر میلی لیتر) کمتر از غلظت IC<sub>50</sub> به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شدند. در ادامه سلول‌ها ترپسینه شدند و با بافر فسفات دو بار شستشو داده شدند. سپس به منظور فیکس کردن، سلول‌ها در اتانول ۷۵ درصد به مدت ۲۴ ساعت قرار گرفتند. بعد از گذشت این زمان، سلول‌ها دو بار با بافر فسفات شستشو داده شدند. سپس سلول‌ها با ۴۰۰ میکرولیتر محلول رنگی (۲ درصد از محلول پروپیدیوم یدید (۱ میکروگرم بر میلی لیتر)، ۲ درصد RNASA (۱ میکرولیتر بر میلی لیتر) و ۰/۱ درصد تریتون X-100 رنگ آمیزی شدند. در پایان سلول‌ها توسط دستگاه فلوسیتومتر FACSCalibur™ (BD Biosciences, USA)

جدول ۱) بررسی مقادیر IC50 بدست آمده از MTT assay test برای سلول‌های MCF-7 مقاوم به تاموکسی芬 و سلول‌های نرمال فیبروبلاستی HFSF-PI3 تحت تیمارهای دارویی تاموکسی芬، نانو تاموکسی芬، نانو کورکومین و نانو تاموکسی芬+کورکومین در دوره‌های زمانی مختلف						
نام سلول‌های فیبروبلاستی نرمال (درو) نام سلول‌ای فیبروبلاستی نرمال (درو) نام سلول‌ای فیبروبلاستی نرمال (درو) نام سلول‌ای فیبروبلاستی نرمال (درو)	زمانیت ( ساعت) زمانیت ( ساعت) زمانیت ( ساعت) زمانیت ( ساعت)	نام سلول‌های فیبروبلاستی نرمال (درو) نام سلول‌ای فیبروبلاستی نرمال (درو) نام سلول‌ای فیبروبلاستی نرمال (درو) نام سلول‌ای فیبروبلاستی نرمال (درو)	نام سلول‌های فیبروبلاستی نرمال (درو) نام سلول‌ای فیبروبلاستی نرمال (درو) نام سلول‌ای فیبروبلاستی نرمال (درو) نام سلول‌ای فیبروبلاستی نرمال (درو)	نام سلول‌های فیبروبلاستی نرمال (درو) نام سلول‌ای فیبروبلاستی نرمال (درو) نام سلول‌ای فیبروبلاستی نرمال (درو) نام سلول‌ای فیبروبلاستی نرمال (درو)	نام سلول‌های فیبروبلاستی نرمال (درو) نام سلول‌ای فیبروبلاستی نرمال (درو) نام سلول‌ای فیبروبلاستی نرمال (درو) نام سلول‌ای فیبروبلاستی نرمال (درو)	نام سلول‌های فیبروبلاستی نرمال (درو) نام سلول‌ای فیبروبلاستی نرمال (درو) نام سلول‌ای فیبروبلاستی نرمال (درو) نام سلول‌ای فیبروبلاستی نرمال (درو)
۱۳	۱۴/۵	۱۷/۵	۱۹/۵	۲۰	۲۲	تاموکسی芬
۱۵	۱۶	۱۸/۵	۱۱/۵	۱۲	ناموکسی芬	
۱۲	۱۳/۵	۱۵	۳/۵	۶	ناموکسی芬+کورکومین	
۳۷	۴۰	۴۲/۵	۲۰	۲۳	ناموکسی芬	
				۲۷/۵	ناموکسی芬	دارو

تاموکسی芬، نانو کورکومین و نانو (تاموکسی芬+کورکومین) در غلاظت‌های ۱-۳ میکرولیتر بر میلی لیتر) کمتر از IC50 نشان داد که همه داروهای توانایی القای مرگ سلولی و افزایش سلول‌ها با محتوای DNA موجود در فاز subG1 را دارند (نمودار ۱).

### بررسی چرخه سلولی در سلول‌های MCF-7 مقاوم به تاموکسی芬

بررسی چرخه سلولی در سلول‌های MCF-7 مقاوم به تاموکسی芬 تیمار شده با داروهای تاموکسی芬، نانو



نمودار ۱) بررسی چرخه سلولی با استفاده از فلوسایتمتری. چرخه سلولی و درصد سلول‌های با محتوای DNA موجود در فاز G1 برای سلول‌های MCF-7 مقاوم به تاموکسی芬 در تیمارهای نانو کورکومین و نانو (کورکومین + تاموکسی芬) و تاموکسی芬 به ترتیب با غلاظت‌های ۲۰.۵، ۱۱.۲۵ میکرو گرم بر میلی لیتر برای سلول‌های مقاوم به تاموکسی芬-7 (Gلاظت‌های به کار برده شده زیر IC50).

Fig 1) Cell cycle analysis by using Flowcytometry. Cell cycle and the percentage of cells with DNA content for MCF-7 resistant cells to tamoxifen in nano-Tamoxifen (25  $\mu$ g/ml), nano-Curcumin (11  $\mu$ g/ml) and nano-(Tamoxifen+Curcumin) (5  $\mu$ g/ml) and Tamoxifen(20  $\mu$ g/ml) for MCF-7 resistant cells to tamoxifen (concentrations used below the IC50).


کورکومین توانسته آپوپتوز را در ۹۳ درصد سلول‌های MCF-7 مقاوم به تاموکسی芬 القا کند، در حالی که هیچکدام از داروهای تاموکسی芬 یا نانو تاموکسی芬 با غلظت ۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر و نانو کورکومین با غلظت ۱۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر قادر به القای آپوپتوز با مقدار مشاهده شده برای تیمار نانو (تاموکسی芬 + کورکومین) نبودند (نمودار ۲).

در تیمار تاموکسی芬 و نانو تاموکسی芬 سلول‌های MCF-7 مقاوم به تاموکسی芬، علاوه بر آپوپتوز، دچار مرگ سلولی از نوع نکروز شدند که این مرگ به‌دلیل سمتی داروی تاموکسی芬 در غلظت مورد استفاده می‌باشد. میزان نکروز مشاهده شده در تیمار تاموکسی芬 با با سایر تیمارها به صورت معناداری اختلاف داشت. میزان نکروز مشاهده شده در تیمار نانو تاموکسی芬 نیز نسبت به دو تیمار نانو کورکومین و نانو (تاموکسی芬 + کورکومین) با معنادار به نظر می‌رسد (نمودار ۳).

میزان القای مرگ سلولی در تیمارهای نانو (تاموکسی芬 + کورکومین) با غلظت ۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر از تاموکسی芬 و ۱۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر کورکومین توانست ۷۵/۰۶ درصد از سلول‌های MCF-7 مقاوم به دارو را به فاز مرگ وارد کند، در حالی که هیچ‌کدام از داروهای تاموکسی芬 یا نانو تاموکسی芬 با غلظت ۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر و نانو کورکومین با غلظت ۱۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر قادر به القای مرگ سلولی با مقدار مشاهده شده برای تیمار نانو (تاموکسی芬 + کورکومین) نبودند (نمودار ۱).


### آنالیز آپوپتوزی

جهت بررسی آپوپتوز در سلول‌های تیمار شده از کیت Annexin-V-Flus staining (تاموکسی芬 + کورکومین) با غلظت ۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر تاموکسی芬 + ۱۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر استفاده شد. نانو



نمودار ۲) بررسی آپوپتوزی توسط کیت Annexin-V-Flus Staining و دستگاه فلوسایتوメتر. نتایج بررسی آپوپتوزی سلول‌های سرطانی سینه MCF-7 مقاوم به تاموکسی芬 تحت تیمارهای دارویی، نانو تاموکسی芬، نانو کورکومین و نانو (تاموکسی芬 + کورکومین)، تاموکسی芬 با غلظت‌های به ترتیب ۲۰، ۱۱، ۲۵، ۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر علاوه بر تأیید مرگ سلولی آپوپتوزی.

Fig 2) Analysis of apoptosis via Annexin-V-Flus Staining kit and Flow cytometry device. The results of MCF-7 breast cancer apoptosis study resistant to Tamoxifen under Treatment of TR-MCF-7 cells with Tamoxifen (20  $\mu$ g/ml), nano- Tamoxifen (11  $\mu$ g/ml), nano- Curcumin (25  $\mu$ g/ml) and nano (Tamoxifen+ Curcumin (5  $\mu$ g/ml) and Tamoxifen (20  $\mu$ g/ml) in addition to the confirmation of apoptosis cell ceath.



نمودار ۳) میزان وقوع نکروز در سلول‌های مقاوم به تاموکسی芬 MCF-7 تحت تیمارهای دارویی تاموکسی芬، نانو تاموکسی芬، نانو کورکومین و نانو (تاموکسی芬 + کورکومین) با غلظت‌های به ترتیب ۲۰، ۱۱، ۵، ۲۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر.

Fig 3) Rate of necrosis in treatment of TR-MCF-7 cells with all four compounds. Concentrations are 20  $\mu$ g/ml, 11  $\mu$ g/ml, 25  $\mu$ g/ml, and 5  $\mu$ g/ml for Tamoxifen, nanoTam, nanoCur and nanoTC respectively.

### زیست تخریب‌پذیر دارای پایداری بالا و عدم سمیت می‌باشد (۹).

در تحقیقات گذشته سایر محققین به منظور غلبه بر مقاومت دارویی در سلول‌های مقاوم به تاموکسی芬 از ترکیب کورکومین استفاده شده است. تأثیرات مشاهده شده در تحقیقات گذشته اگرچه از لحاظ آماری معنادار بود، ولی به جهت استفاده نکردن از نانو حامل به منظور بسته‌بندی داروی لیپوفیل و زیست تخریب‌پذیر کورکومین، این ترکیب دارویی در فاز *in vivo* کارآمد نمی‌باشد (۱۵). در مطالعه حاضر از نانو حامل پلیمری Diblock استفاده شد و به بررسی تغییرات اثر سمی و آپوپتوزی در سلول‌های تحت تیمار داروی تاموکسی芬 با تغییراتی که به دو صورت بر داروی تاموکسی芬 صورت گرفت، پرداخته شد. یکی از تغییرات بارگذاری داروی تاموکسی芬 در نانو حامل پلیمری Diblock و دیگری بارگذاری همزمان تاموکسی芬 و کورکومین در نانو حامل پلیمری Diblock است. مقاومت ایجاد شده به تاموکسی芬 مهم‌ترین عامل در ناتوانی درمان

### بحث

سرطان سینه شایع‌ترین بدخیمی زنان در سراسر دنیا می‌باشد (۱). امروزه روش‌های درمانی ارائه شده برای این سرطان، استفاده از داروهای ترکیبی هوشمند و چند منظوره می‌باشد. از جمله این داروها می‌توان به کورکومین اشاره نمود که توانایی مهار چندین مسیر پیام رسانی سلولی و همچنین جلوگیری از تکثیر سلولی، متاستاز و تهاجم را دارد (۱۳). کورکومین به عنوان یک ترکیب دارویی در بسیاری از سرطان‌ها از جمله سرطان کولون، سینه، تخمدان و ریه موجب القای مرگ برنامه‌ریزی شده وابسته به p53 می‌شود (۱۴). کاربرد کورکومین به عنوان یک داروی هوشمند به واسطه نامحلول بودن محدود شده است. در این راستا مطالعات زیادی در جهت محلول نمودن آن صورت گرفته است و انواع ناقلین مانند ادجوانات‌ها، لیپوزوم‌ها، میسل‌ها و ذرات نانو جهت انتقال مؤثرتر آن به کار برده شده است. در این مطالعه از دندوزوم‌ها به عنوان ناقل انتقال کورکومین استفاده می‌گردد. نانو حامل پلیمری ترکیبی

وارد مسیر مرگ برنامه‌ریزی شده می‌شوند. با تداوم حضور کورکومین در محیط کشت و ورود بیشتر آن به داخل سلول، نقطه کنترلی G1 فعال شده و مکانیسم‌های مهارکننده عبور سلول از مرحله G1، موجب تجمع تدریجی سول‌ها در این مرحله و توقف در G1/S می‌شود. در ادامه افزایش زمان تیمار و تأثیر کورکومین بر مسیرهای آپوپتوزی موجب القای مرگ برنامه‌ریزی شده در سلول‌های متوقف شده در نقاط کنترلی می‌شود (۱۷ و ۱۸).

بارگذاری داروی تاموکسیفن در نانوحامل پلیمری، IC50 را برای سلول‌های نرمال افزایش می‌دهد. افزایش اختلاف IC50 بین سلول‌های نرمال و سلول‌های سرطانی برای یک دارو بدین معنی می‌باشد که در غلطی که سلول‌های سرطانی با القای دارو می‌میرند، سلول‌های نرمال آسیب نمی‌بینند و دارو به صورت هدفمند فقط سلول‌های سرطانی را از بین می‌برد. بارگذاری تاموکسیفن و کورکومین درون نانو حامل پلیمری ترکیب دارویی را حاصل کرد که تأثیرات سممی بسیار کمتری به نسبت نانو تاموکسیفن و تاموکسیفن داشت.

به علت افزایش IC50 تاموکسیفن در سلول‌های MCF-7 مقاوم به تاموکسیفن، نیاز به دوز بالاتری از تاموکسیفن برای القای آپوپتوز و داشتن سلول‌هایی با محتوای DNA موجود در فاز G1 sub می‌باشد. بررسی‌های آپوپتوزی نشان داد که بخشی از مرگ القا شده در این سلول‌ها ناشی از نوع نکروز می‌باشد. تغییرات اعمال شده بر تاموکسیفن به کمک نانو حامل پلیمری و کورکومین می‌تواند بر مقاومت ایجاد شده در تاموکسیفن غلبه کند. اگرچه افزایش وقوع نکروز در تیمارهای نانو تاموکسیفن نیز مشاهده شد که این میزان کمتر از میزان مشاهده شده در تیمار تاموکسیفن می‌باشد.

اندوکرین این بیماری می‌باشد. مقاومت ایجاد شده در سلول‌های MCF7 باعث می‌شود که این سلول‌های مقاوم به تاموکسیفن نسبت به سلول‌های نرمال رشد و تکثیر سریع‌تر و همچنین خاصیت تومورزاگی بیشتری داشته باشند. در این مطالعه به منظور تولید سلول‌های مقاوم به تاموکسیفن، سلول‌های MCF-7 تحت تیمار طولانی مدت (به تعداد ۱۵ پاساژ (۴ ماه) تاموکسیفن قرار گرفته شدند و به سلول‌ها فرست داده شد تا جمعیت مقاوم به تاموکسیفن جایگزین جمعیت حساس به تاموکسیفن شود، بدین ترتیب که جمعیت حساس به تاموکسیفن از بین می‌روند و سلول‌های مقاوم به تاموکسیفن امکان رشد بیشتری را پیدا می‌کنند. علاوه بر این مکانیسم مقاومت، یک مکانیسم القا شده توسط تاموکسیفن نیز می‌باشد که با گذشت زمان صورت می‌گیرد. بدین معنا که دیگر تاموکسیفن قادر نیست در دوزهای درمانی قبلی، تأثیر ضد توموری داشته باشد و سلول‌های سرطانی در حضور تاموکسیفن به رشدشان ادامه می‌دهند. داروی نانو (تاموکسیفن + کورکومین) و نانو تاموکسیفن می‌توانند بر این مقاومت غلبه کنند، بدین صورت که می‌توانند در همان غلطی که سلول‌های حساس به تاموکسیفن را از بین می‌برند (۱۶).

کورکومین بسیاری از مکانیسم‌های شکل گرفته در سلول‌های مقاوم به تاموکسیفن شامل MAPK, NF-κB, cyclin D, c-Myc, src, PI3K/Akt را تعديل می‌کند و سلول‌های مقاوم به تاموکسیفن را به سلول‌های حساس به تاموکسیفن تبدیل می‌کند (۱۵). در ابتدا مهار رشد سلولی توسط فرمول بنده دندروزومی کورکومین، تنها سلول‌ها را در نقاط کنترل چرخه سلولی متوقف می‌نماید، در حالی که با افزایش زمان تیمار، به تدریج سلول‌های متوقف شده در این نقاط

## سپاس و قدردانی

نویسندهای از کارکنان گروه ژنتیک دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس که در کمکهای مالی همکاری نموده‌اند، کمال تشکر و قدردانی را دارند.

## تضاد منافع

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندهای بیان نشده است.

## نتیجه‌گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که تاموکسیفن و کورکومین وقی در کنار هم در نانو حامل پلیمری بارگذاری می‌شوند، می‌توانند اثر سینزژیستیک داشته باشند و سمیت را بر سلولهای نرمал کاهش دهند. همچنین خاصیت ضد توموری را نسبت به فرم تنها هر دو ترکیب (تاموکسیفن یا نانو تاموکسیفن و نانو کورکومین) افزایش دهند و بر مقاومت ایجاد شده به تاموکسیفن در سلول‌های مقاوم به دارو غلبه کنند.

## References:

- 1.Fisch T, Pury P, Probst N, et al. Variation in survival after diagnosis of breast cancer in Switzerland. *Ann Oncol* 2005; 16(12): 1882-8.
- 2.Bray F, McCarron P, Parkin DM. The changing global patterns of female breast cancer incidence and mortality. *Breast Cancer Res* 2004; 6(6): 229-39.
- 3.Farooq S, Coleman MP. Breast cancer survival in South Asian Women in England and Wales. *J Epidemiol Community Health* 2005; 59(5): 402-6.
- 4.Reeder JG, Vogel VG. Breast cancer prevention. *Cancer Treat Res* 2008; 141: 149-64.
- 5.Petinari L, Kohn L, de Carvalho JE, et al. Cytotoxicity of tamoxifen in normal and tumoral cell lines and its ability to induce cellular transformation in vitro. *Cell Bio Int* 2004; 28(7): 531-9.
- 6.Chen HY, Yang YM, Han R, et al. MEK1/2 inhibition suppresses tamoxifen toxicity on CNS glial progenitor cells. *J Neurosci* 2013; 33(38): 15069-74.
- 7.De Gasperi M, Cavazos D. Curcumin Modulates Tamoxifen Response in Resistant Breast Cancer Cells. *Cancer Res* 2009; 69(24): 3098.
- 8.Ireson CR, Jones DJ, Orr S, et al. Metabolism of the cancer chemopreventive agent curcumin in human and rat intestine. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2002; 11(1): 105-11.
- 9.Moorthi C, Kathiresan K. Curcumin-Piperine/Curcumin Quercetin/Curcumin-Silibinin dual drug-loaded nanoparticulate combination therapy: A novel approach to target and treat multidrug-resistant cancers. *J Med Hypo Ideas* 2013; 7(1): 15-20.
- 10.Hatcher H, Planalp R, Cho J, et al. Curcumin: from ancient medicine to current clinical trials. *Cell Mol Life Sci* 2008; 65(11): 1631-52.
- 11.Grynkiewicz G, Slifirski P. Curcumin and curcuminoids in quest for medicinal status. *Acta Biochim Pol* 2012; 59(2): 201-12.
- 12.Babaei E, Sadeghizadeh M, Hassan ZM, et al. Dendrosomal curcumin significantly suppresses cancer cell proliferation in vitro and in vivo. *Int Immunopharmacol* 2012; 12(1): 226-34.
- 13.Jimeno A, Hidalgo M. Multitargeted therapy: can promiscuity be praised in an era of political correctness. *Crit Rev Oncol Hematol* 2006; 59(2): 150-8.
- 14.Kunnumakkara AB, Anand P, Aggarwal BB. Curcumin inhibits proliferation, invasion, angiogenesis and metastasis of different cancer through interaction with multiple cell signaling proteins. *Cancer Lett* 2008; 269(2): 199-225.
- 15.Jiang M, Huang O, Zhang X, et al. Curcumin induces cell death and restores tamoxifen sensitivity in the antiestrogen-resistant breast cancer cell lines MCF-7/LCC2 and MCF-7/LCC9. *Molecules* 2013; 18(1): 701-20.
- 16.Nass N, Brömmé HJ, Hartig R, et al. Differential response to  $\alpha$ -oxoaldehydes in tamoxifen resistant MCF-7 breast cancer cells. *PloS One* 2014; 9(7): e101473.

17. Chaudhary LR, Hruska KA. Inhibition of cell survival signal protein kinase B/Akt by curcumin in human prostate cancer cells. *J Cell Biochem* 2003; 89(1): 1-5.
18. Bush JA, Cheung KJ Jr, Li G. Curcumin induces apoptosis in human melanoma cells through a Fas receptor/caspase-8 pathway independent of p53. *Exp Cell Res* 2001; 271(2): 305-14.

Original Article

# Nano Packaged Diblock and Curcumin: a New Approach Inorder To Drug Resistance in Breast Cancer

**S. Hajigholami<sup>1</sup>, Z. Vaise Malekshahi<sup>2\*</sup>**

<sup>1</sup> *Genetic group, School of biological sciences, Tarbiat Modares University Tehran, Iran*

<sup>2</sup> *Medical Biotechnology, School of Advanced Technologies in Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran*

(Received 10 Jul, 2015 Accepted 7 Dec, 2015)

## Abstract

**Background:** Breast cancer is one of the causes of mortality in the world. Half of patients with metastatic extend resistance to Tamoxifen and almost all patients eventually become resistant to tamoxifen. Inorder to counteract with the negative effects of tamoxifen, this drug have been placed in combination with the curcumin. Anti-cancer substance which is less toxic than Tamoxifen. In this study, Diblock (Dendrosome) Nano polymer was used in order to tamoxifen packaging along with curcumin. Anti-cancer efficacy of the obtained compound (Diblock, Tamoxifen and Curcumin) was evaluated in Tamoxifen-resistant (TR) MCF-7 cells and Fibroblast cells.

**Material and Methods:** MTT Assay was used to evaluate anti-proliferation effect and drug toxicity. Flow cytometry and Annexin-V-FLUOS were used inorder to assay anti-proliferation effect and induction of apoptosis, respectively.

**Results:** Nano-compound has less toxicity effects on normal cells compared with Tamoxifen and increased apoptosis activity and decreased proliferation in MCF-7 cells which are resistant to tamoxifen. Curcumin and Tamoxifen have more apoptotic potential than Tamoxifen alone, Nano-Tamoxifen or Nano-Curcumin.

**Conclusion:** Results of this study showed that changes in Tamoxifen by curcumin polymeric nanocarrier help to more effective treatment of breast cancer.

**Key words:** Curcumin, Tamoxifen, Polymer Nano-carrier, Breast Cancer

©Iran South Med J. All rights reserved

Cite this article as: Hajigholami S, Vaise Malekshahi Z. Nano Packaged Diblock and Curcumin: a New Approach Inorder To Drug Resistance in Breast Cancer Iran South Med J 2017; 19(6): 951-961.

Copyright © 2017 Hajigholami, et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

\*Address for correspondence: Department of Medical Biotechnology, School of Advanced Technologies in Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. E.mail: zvemalekshahi@yahoo.com

Website: <http://bpums.ac.ir>  
Journal Address: <http://ismj.bpums.ac.ir>