

ارتباط مصرف منابع غذایی فروکتوز با شاخص‌های تن سنجی در بیماری کبد چرب غیرالکلی: مطالعه مورد-شاهدی

ندا یوشاری^۱، مهرانگیز ابراهیمی مقانی^{۲*}، محمد اصغری جعفر آبادی^۳، نویده یوشاری^۴، محمد لطفی پور^۵

- (۱) کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، پردیس بین المللی ارس، تبریز، ایران
- (۲) گروه تغذیه، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
- (۳) مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت‌های ترافیکی جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
- (۴) گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
- (۵) دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهroud، شاهرود، ایران

تاریخ پذیرش: ۹۴/۸/۱۷

تاریخ دریافت: ۹۴/۳/۳۰

چکیده

مقدمه: با توجه به افزایش روز افزون ابتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی(NAFLD) و به سبب توجه ویژه ای که در سال های اخیر به قند فروکتوز به عنوان یکی از عوامل خطر ابتلا به این بیماری و چاقی شده و نیز به دلیل کمبود مقاالتی که به دریافت این قند از منابع طبیعی آن-نه شیرین کننده های مصنوعی- پرداخته اند، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ارتباط مصرف منابع غذایی فروکتوز با عوامل تن سنجی در NAFLD طراحی گردید.

مواد و روش‌ها: مطالعه مورد-شاهدی حاضر بر روی ۵۷ بیمار مبتلا به NAFLD (تایید شده با اولتراسونوگرافی و سطح آنزیم های کبدی) و ۵۷ فرد سالم همسان شده از لحاظ مخدوشگرهای احتمالی چون سن، جنس و نمایه توده بدن(BMI) در کلینیک شیخ الرئیس تبریز صورت گرفت. شاخص های تن سنجی به روش استاندارد اندازه گیری و BMI، دورکمر به دور باسن(WHR) و دور کمر به قد ایستاده(WHtR) محاسبه گردید. با استفاده از پرسشنامه بسامد غذایی، بار مصرف هفتگی میوه ها و سبزی ها و با استفاده از پرسشنامه ثبت غذایی^۳ روزه مقدار فروکتوز دریافتی و سهم آن از انرژی و درشت مغذی ها به دست آمد.

یافته های پژوهش: میانه بسامد هفتگی مصرف میوه ها و سهم فروکتوز از انرژی در کل بیماران و نیز میانه بسامد هفتگی مصرف میوه ها در زنان با چاقی شکمی به طور معنی داری بیشتر از افراد سالم بود. گرچه فروکتوز کل دریافتی با BMI در افراد سالم همبستگی مثبت معنی داری را نشان داد($P=0.040$, $t=0.273$) ولی تفاوت معنی داری از لحاظ میانه بسامد هفتگی مصرف میوه ها و سبزی ها به عنوان منابع طبیعی فروکتوز در سطوح مختلف BMI مشاهده نشد. پس از کنترل عوامل مخدوشگر تنها عامل پیشگوئی کننده این بیماری WHtR یافت شد و سایر عوامل نقشی در بروز NAFLD نداشتند.

بحث و نتیجه گیری: یافته ها حاکی از عدم وجود ارتباط منابع غذایی فروکتوز با عوامل تن سنجی در بیماران NAFLD می باشد.

واژه های کلیدی: فروکتوز، شاخص های تن سنجی، کبد چرب غیرالکلی

*نویسنده مسئول: گروه تغذیه، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

مقدمه

بیماری کبد چرب غیر الکلی (Non-alcoholic Fatty Liver Disease; NAFLD) عین حال شکل خاموش بیماری‌های مزمن کبدی است که به دلیل تجمع تری گلیسیرید در سلول‌های کبدی افراد بدون سابقه مصرف یا با مصرف بسیار کم (کل دیده می‌شود^(۱,۲)). چنین شرایطی طیف وسیعی از جراحت‌های کبدی شامل تجمع ساده چربی در کبد Non-alcoholic (استئاتوز)، استئاتوهپاتیت غیر الکلی (Steatohepatitis; NASH)، التهاب کبدی که می‌تواند تا فیبروز، سیروز و سرطان کبد پیشرفت کند را در بر می‌گیرد^(۳,۴). NAFLD با چاقی به ویژه چاقی شکمی و مقاومت انسولینی ارتباط تنگاتنگی دارد و به عنوان تظاهر کبدی سندروم متابولیک شناخته شده است^(۵). چاقی در ۷۰ تا ۱۰۰ درصد مبتلایان به NAFLD وجود دارد و اغلب بیماران ۱۰ تا ۴۰ درصد بیش از وزن ایده آل خود را دارا هستند^(۶). در این بیماری نحوه تجمع چربی بسیار مهم‌تر از کل توده چربی بدن بوده و چاقی شکمی به طور قوی تری با مقاومت انسولینی در ارتباط است^(۷). شواهد بسیاری افزایش شیوع این بیماری را به غربی شدن الگوهای غذایی به همراه افزایش مصرف قندهای ساده به ویژه فروکتوز نسبت داده اند^(۸-۹). فروکتوز که قند غالب موجود در میوه‌ها و سبزی‌ها می‌باشد قندی لیپوژنیک و محرك سنتز تری گلیسیرید است^(۱۰). به نظر می‌رسد فروکتوز از طریق مسیرهای گلیکولیتیکی و گلوکونئوژن و با افزایش لیپوژن de novo اختلال در خروج چربی‌ها و کاهش تجزیه اسیدهای چرب در کبد در چاقی و استئاتوز کبد نقش داشته باشد^(۱۱). علی‌رغم شواهدی که نقش احتمالی فروکتوز را در پاتوژن این بیماری پیشنهاد می‌کنند، مطالعات محدودی به تحلیل رابطه علیتی آن پرداخته اند که این مطالعات محدود نیز تنها به دریافت این قند از طریق نوشیدنی High Fructose Corn Syrup; HFCS پیشرفت‌هه به عنوان شیرین کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد، اشاره داشته اند^(۱۲, ۱۳). بر اساس دانسته‌های ما مطالعه‌ای که الگوی دریافت فروکتوز از منابع

طبیعی آن شامل میوه‌ها، سبزی‌ها و منابع طبیعی آن و ارتباط آن با بیماری NAFLD و مهم‌ترین عامل خطر آن یعنی چاقی را مورد بررسی قرار داده باشد، یافت نشد. از سوی دیگر میوه‌ها و سبزی‌ها به سبب دارا بودن فیبر و محتوای آنتی اکسیدانی بالا به عنوان بهترین انتخاب‌های غذایی تلقی می‌شوند، لذا به دلیل تناقض در یافته‌های پیشین و نیز محدودیت مطالعات موجود در خصوص نقش فروکتوز به عنوان یک قند لیپوژنیک در پاتوژن چاقی و به تبع آن بیماری کبد چرب غیر الکلی و از سوی دیگر چون در ایران منبع اصلی فروکتوز میوه‌ها و سبزی‌ها بوده و در نوشیدنی‌های ایرانی کمتر از این قند به عنوان شیرین کننده استفاده می‌شود، مطالعه مورد-شاهدی حاضر با هدف ارزیابی ارتباط مصرف منابع طبیعی فروکتوز شامل میوه‌ها و سبزی‌ها با شاخص‌های چاقی در بیماران NAFLD صورت گرفت.

مواد و روش‌ها

مطالعه مورد-شاهدی حاضر بر روی ۵۷ بیمار مبتلا به NAFLD و ۵۷ فرد سالم بزرگسال در محدوده سنی ۲۰ تا ۶۰ سال از مراجعه کنندگان به کلینیک شیخ الرئیس شهر تبریز به روش تصادفی صورت گرفت. جهت تعیین حجم نمونه اطلاعات اولیه شامل نسبت شانس(Odds Ratio, OR)، بر اساس مطالعه Ouyang و همکاران^(۵) عدد ۲ و میزان شیوع NAFLD بر اساس مطالعه سوادکوهی و همکاران^(۱۶) ۹۵/۳۲/۸ درصد به دست آمد. با در نظر گرفتن اطمینان درصد و توان آزمون ۸۰ درصد و با استفاده از نرم افزار G-power حجم نمونه حداقل ۴۵ مورد در هر گروه محاسبه گردید. جهت افزایش توان آزمون به ۹۰ درصد، حجم نمونه به ۵۷ نفر در هر گروه افزایش یافت. افراد سالم از لحاظ عوامل مخدوشگری چون سن(±۵ سال)، جنس و نمایه توده بدن (Body Mass Index; BMI ±۳) (Index; BMI) با افراد بیمار همسان شدند.

به منظور تایید بیماری، آنزیم‌های آلانین آمینو ترانسفراز(Alanine Amino Transferase; ALT)، آسپارتات آمینو ترانسفراز(Ast) و آلkaline Transferase; AST

(World Health Organization; WHO) بهداشت برآورد گردید. نسبت دور کمر به دور باسن (Waist to Hip Ratio; WHR) از تقسیم اندازه دور کمر بر حسب سانتی متر به اندازه دور باسن بر حسب سانتی متر به دست آمد. نسبت بیش از ۰/۸۵ در زنان و بیش از ۱ در مردان به عنوان شاخص چاقی مرکزی تعریف شد(۲۴). Waist to Height (Ratio; WHtR) از تقسیم اندازه دور کمر بر حسب سانتی متر به قد ایستاده در مطالعه حاضر در کمیته اخلاق پژوهشی تبریز مورد تایید بوده است.

جهت ارزیابی بررسی مصرف فروکنوز و ساکاروز و سایر اقلام غذایی از پرسشنامه بسامد غذایی و پرسشنامه ثبت غذایی ۳ روزه استفاده شد. به منظور بررسی عادات و الگوی مصرف مواد غذایی با تأکید بر فروکنوز و ساکاروز از پرسشنامه بسامد غذایی کیفی ۹۷ قلم غذایی استفاده گردید. جهت تعیین اعتبار محتوی پرسشنامه از نظرات ۱۱ متخصص تغذیه و با تجربه در زمینه طراحی ابزار بهره گرفته شد. هم چنین جهت تعیین پایایی همسانی درونی از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ(جدول شماره ۱) برای هر گروه غذایی و کل ابزار برای ۳۰ نفر استفاده گردید. در مطالعات توصیفی مقادیر آلفای بزرگ تر از ۰/۶ مورد قبول می باشد. این پرسشنامه در بردارنده منابع اصلی فروکنوز شامل میوه ها، سبزی ها و نیز منابع اصلی ساکاروز بود. با استفاده از این پرسشنامه، بار مصرف هر یک از مواد غذایی در طول روز، هفته، ماه و سال در طول یک سال گذشته از طریق مصاحبه با افراد مورد مطالعه تعیین گردید و در نهایت پس از تبدیل همه داده ها به شکل بار در هفته گزارش شد. علاوه بر این جهت برآورد میزان انرژی و درشت مغذيه ها و باجزئیات بیشتر میزان فروکنوز و ساکاروز دریافتی از پرسشنامه ثبت غذایی ۳ روزه(۲) روز کاری غیر متوازن و یک روز تعطیل) استفاده گردید. نحوه تکمیل این پرسشنامه در مدت زمان ۱۵ دقیقه به هر یک از افراد آموزش داده شد. هم چنین دستورالعمل تکمیل فرم

(Phosphatase, ALP) در سرم اندازه گیری شده و درجه استئاتوز بر اساس نتایج سونوگرافی کبدی توسط یک سونوگرافیست تعیین شد(۲۰). درجه بندی اکوژنیسیته کبدی در ۴ سطح: «درجه صفر»: وضعیت طبیعی، «درجه یک»: استئاتوز خفیف(اکوژنیسیته مشابه قشر کلیوی)، «درجه دو»: استئاتوز متوسط(ورید پورتال قابل مشاهده) و «درجه سه»: استئاتوز شدید(ورید پورتال غیر قابل مشاهده) صورت گرفت(۲۱).

افراد حائز شرایط با رعایت معیارهای ورود و خروج و در صورت تمایل به شرکت در مطالعه، پس از اخذ فرم رضایت آگاهانه دعوت به همکاری شدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل: نداشتن سابقه خانوادگی چاقی، BMI بزرگ تر یا مساوی ۲۵ کیلو گرم بر مترمربع، نبودن تحت رژیم غذایی خاص، سطح فعالیت متوسط بودند که میزان فعالیت بدنی با استفاده از پرسشنامه بین المللی فعالیت(IPAQ) که روایی و پایایی آن قبل از تعیین شده بود، مورد بررسی قرار گرفت(۲۲). افراد با مصرف الكل، سیگار و قلیان، بارداری، شیردهی، یائسگی و یا هورمون درمانی در زنان، ابتلا به بیماری های حاد کبدی، مصرف برخی داروها از جمله داروهای ضدبارداری، داروهای کاهنده قند و لیپید وارد مطالعه نشدنند.

پس از تکمیل پرسشنامه اطلاعات فردی توسط پژوهشگر، وزن بدون کفش با حداقل لباس توسط ترازوی شاقولی Seca (کشور آلمان) با دقت ۰/۱ کیلوگرم سه بار اندازه گیری شد و متوسط آن ها ثبت گردید. قد با رعایت شرایط استاندارد(بدون لباس سنگین، بدون کفش، دست ها در حالت آزاد و با رعایت نقاط تماس با دیوار) توسط قدستنجر دیواری با دقت ۰/۱ سانتی متر اندازه گیری شد. دور کمر(۲۳) و دور باسن(۲۴) توسط متر نواری با دقت ۰/۱ سانتی متر در حالت ایستاده به ترتیب در ناحیه بین پایین ترین دندنه و ستیغ ایلیاک و در محل بزرگ ترین محیط استخوان لگن اندازه گیری شدند. جهت طبقه بندی دور کمر از طبقه بندی Action Level I, II استفاده گردید(۲۳). BMI با استفاده از معادله m^2 / Kg (وزن m^2) محاسبه و بر اساس طبقه بندی سازمان جهانی

تحصیلات، وزن، WHtR و AST، متغیرهای بیوشیمیایی شامل ALT و داده‌های بسامد غذایی شامل گروه میوه‌ها و آبمیوه‌ها و داده‌های دریافت غذایی شامل انرژی، چربی، فروکتوز، قند ساده صورت گرفت. کلیه داده‌ها با توجه به پشتوانه نظری موجود، با استراتژی Enter در مدل وارد شدند. هم چنین برای بررسی کفایت مدل منطقی از آزمون Hosmer-Lemeshow استفاده شد. P کمتر از ۰/۰۵ به عنوان سطح معنی داری در کلیه آزمون‌های آماری در نظر گرفته شد.

یافته‌های پژوهش

در مطالعه حاضر اکثربیت(۹۵/۶ درصد) را زنان تشکیل می‌دادند. ۷۲ درصد(۴۱ نفر) دارای استئاتوز درجه یک و به ترتیب ۲۶ درصد(۱۴ نفر) و ۲ درصد(۲ نفر) افراد استئاتوز درجه دو و سه داشتند. جدول شماره ۱ مقادیر آلفا کرونباخ برای گروه‌های غذایی پرسش نامه بسامد غذایی را نشان می‌دهد که این مقدار برای گروه میوه‌ها به عنوان اصلی ترین منبع فروکتوز ۰/۸۱۳ بود. جدول شماره ۲ میانگین و انحراف معیار داده‌های تن سنجی(سن، وزن، قد، دور کمر، دور باسن، BMI، WHtR، WtHR، AST) و داده‌های بیوشیمیایی شامل آنژیم‌های کبدی(AST, ALP, ALT و نسبت AST به ALT) را در دو گروه نشان می‌دهد. دو گروه از لحاظ وزن، دور کمر، دور باسن، WHtR، AST و ALT اختلاف آماری معنی داری داشتند. میانه و صدک‌های ۲۵ و ۷۵ بسامد هفتگی مصرف میوه‌ها، سیزی‌ها، آبمیوه‌های طبیعی و تجاری، کنسانتره‌ها و نوشابه‌ها و دریافت روزانه انرژی، کربوهیدرات‌ها، قد های ساده شامل فروکتوز، چربی‌ها و درصد آن‌ها را در دو گروه در جدول شماره ۳ نشان داده شده است. میانه بسامد هفتگی مصرف گروه میوه‌ها در بیماران به طور معنی داری بالاتر از افراد سالم بود(۷۵/۴۹ در برابر ۶۳/۳۷ و P=0.004). دو گروه از لحاظ دریافت انرژی تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. به غیر از درصد فروکتوز از انرژی کل ۱/۵ در برابر ۱/۲ و (P=0.045)، در سایر عوامل اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. ارتباط فروکتوز کل دریافتی با متغیرها و شاخص‌های تن

شامل نکات لازم جهت تکمیل فرم، یک فرم پرشده نمونه و مقیاس‌ها و پیمانه‌های متدالوی نیز به صورت مکتوب در اختیار افراد قرار گرفت.

از افراد شرکت‌کننده در مطالعه به صورت نشسته و پس از ۱۲-۱۴ ساعت ناشتایی، ۷ سی سی خون وریدی از وریدهای جلوی آرنج راست با استفاده از سرنگ یک بار مصرف توسط کارشناس علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه شیخ الرئیس شهر تبریز اخذ شد و به آرامی در لوله‌های اسیدواش شده ریخته شد. بعد از خونگیری، جداسازی سرم از نمونه‌ها با استفاده از دستگاه سانتریفوژ انجام گردید. سپس سرم جدا شده با استفاده از سمپلر در دو میکروتیوب کدگذاری شده ریخته شد و به فریزر آزمایشگاه با درجه حرارت -۲۴ درجه سانتی گراد منتقل گردید. بعد از اتمام مطالعه آنژیم‌های کبدی توسط آزمایشگاه شیخ الرئیس اندازه گیری شد.

پرسش نامه‌های ثبت غذایی توسط نرم افزار آنالیز غذایی Nutritionist IV(First Databank, Hearts Corp, San Bruno, CA) که اقلام غذایی آن از لحاظ مقادیر فروکتوز با استفاده از جدول ترکیبات مواد غذایی تصحیح گردید، مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. آنالیز آماری داده‌ها توسط نرم افزار SPSS vol.16 (SPSS Inc. Chicago, IL, USA) انجام گرفت. نتایج به صورت میانگین و انحراف معیار در جداول بیان شدند. برای مقایسه میانگین‌های متغیرهای کمی نرمال بین دو گروه بیمار و سالم از آزمون t مستقل و برای داده‌های غیر نرمال از آزمون من ویتنی استفاده شد. هم چنین جهت مقایسه میانگین سه یا چند گروه مستقل از داده‌های غیر نرمال و با مقایس رتبه ای از آزمون کروسکال-والیس استفاده گردید. جهت بررسی ارتباط بین داده‌های کمی نرمال با هم از ضریب همبستگی پرسون و به منظور شناسایی عوامل خطر احتمالی در بروز NAFLD، (عوامل غذایی، شاخص‌های تن سنجی و یافته‌های بیوشیمیایی) از General Linear Model (GLM) با کنترل عوامل مخدوشگر استفاده و نسبت شانس تطبیق داده شده(Adjusted OR) برآورد گردید. تطبیق یا کنترل بر اساس ویژگی‌های فردی، اقتصادی، اجتماعی و عوامل تن سنجی شامل میزان

مردان مبتلا به NAFLD و میانه بسامد هفتگی مصرف سبزی ها در سطوح مختلف دور کمر در زنان مبتلا به NAFLD اختلاف معنی داری را نشان داد (به ترتیب $P=0.007$ و $P=0.045$). علاوه بر این بسامد هفتگی مصرف میوه ها در کلیه افراد بر اساس WHtR بیش از ۵٪ نیز در بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت ($P=0.004$) در حالی که بسامد هفتگی مصرف سبزی ها اختلاف معنی داری در بین دو گروه NAFLD نداشت. جدول شماره ۶ عوامل موثر در بروز NAFLD unadjusted را نشان می دهد. گرچه در مدل خام (OR) عواملی نظیر وزن، WHtR، WHR، AST و ALT ارتباط معنی داری با NAFLD نشان دادند اما پس از تطبیق سازی (Adjusting) بر اساس این عوامل تنها ارتباط WHtR معنی دار بود ($OR=0.001$) و سایر عوامل نقشی در بروز NAFLD نداشتند.

سنجدی در کل افراد و به تفکیک دو گروه در جدول شماره ۴ نشان داده شد که تنها حاکی از وجود همبستگی مثبت معنی داری بین فروکتوز کل با BMI در افراد سالم می باشد. جدول شماره ۵ مقایسه میانه بسامد هفتگی مصرف میوه ها و سبزی ها با شاخص های چاقی در بیماران NAFLD و افراد سالم را نشان می دهد. میانه بسامد هفتگی مصرف میوه ها و سبزی ها در سطوح مختلف BMI در دو گروه اختلاف آماری معنی داری نداشت در حالی که میانه بسامد هفتگی مصرف میوه ها در زنان با چاقی شکمی (بر اساس دور کمر بیش از ۸۸ سانتی متر و WHR کمتر از ۰.۸۵) به ترتیب با $P=0.039$ و $P=0.012$ میانه بسامد هفتگی مصرف سبزی ها در زنان در معرض خطر چاقی (دور کمر ۸۰-۸۸ سانتی متر با $P=0.012$) اختلاف معنی داری در بین دو گروه داشت. میانه بسامد هفتگی مصرف میوه ها در سطوح مختلف WHR در

جدول شماره ۱. مقادیر آلفای کرونباخ برای گروه های غذایی پرسشنامه بسامد غذایی

آلفای کرونباخ n=۳۰	گروه های غذایی	آلفای کرونباخ n=۳۰	گروه های غذایی
۰/۳۳۹	گوشت ها	۰/۸۱۳	میوه ها
۰/۴۷۷	حبوبات	۰/۵۶۸	سبزیجات
۰/۳۲۹	مغز ها	-۰/۵۸۷	نان و غلات
-۱/۴۱۰	چربی ها	۰/۳۴۰	فند ها
۰/۰۷۲	سایر	۰/۰۹۶	لبنیات

جدول شماره ۲. مقایسه میانگین و انحراف معیار اندازه ها و شاخص های تن سنجدی و بیوشیمیابی در دو گروه NAFLD و سالم

P	سالم (n=۵۷) Mean ± SD	NAFLD (n=۵۷) Mean ± SD	متغیر
۰/۰۵۶	۳۳/۲۵ ± ۱۰/۲۱	۳۶/۹۳ ± ۱۰/۱۲	سن (سال)
۰/۰۰۱	۸۳/۸۸ ± ۱۶/۱۳	۹۳/۴۹ ± ۱۴/۵۶	وزن (kg)
۰/۶۵۹	۱۶۱/۶۰ ± ۵/۱۹	۱۶۰/۲۳ ± ۷/۴۰	قد (cm)
۰/۰۹۴	۳۳/۶۲ ± ۵/۷۶	۳۵/۴۵ ± ۵/۷۶	† (kg/m ²) BMI
<۰/۰۰۱	۱۰۳/۵۱ ± ۱۲/۲۴	۱۱۴/۷۰ ± ۱۱/۹۴	دور کمر (cm)
<۰/۰۰۱	۱۱۵/۶۴ ± ۱۱/۲۸	۱۲۳/۹۴ ± ۹/۶۲	دور باسن (cm)
۰/۰۰۷	۰/۸۹ ± ۰/۰۶	۰/۹۲ ± ۰/۰۵	† WHR
<۰/۰۰۱	۰/۶۴ ± ۰/۰۸	۰/۷۲ ± ۰/۷۹	† WHtR
<۰/۰۰۱	۱۹/۰/۹ ± ۵/۱۶	۲۴/۵۳ ± ۸/۲۶	† (IU/L) AST
<۰/۰۰۱	۲۰/۱۲ ± ۶/۷۰	۳۰/۹۴ ± ۱۸/۴۸	‡ (IU/L) ALT
۰/۶۳۸	۱۹۲/۰/۰ ± ۱۰/۸/۹۹	۱۸۰/۲۸ ± ۳۹/۱۰	آلkalin فسفاتاز (IU/L)
۰/۱۱۶	۱/۰/۱ ± ۰/۳۳	۰/۹۱ ± ۰/۳۴	‡ ALT به AST نسبت

NAFLD: Non-alcoholic Fatty Liver Disease, BMI: Body Mass Index, WHR: Waist to Hip Ratio, WHtR: Waist to Height Ratio, ALT: Alanine Amino Transferase, AST: Aspartate Amino Transferase.

† Independent Sample T Test, ‡ Mann-Whitney U Test

ارتباط مصرف منابع غذایی فروکتوز با شاخص‌های تن سنجی ... مهرانگیز ابراهیمی ممقانی و همکاران

جدول شماره ۳. مقایسه میانه (صد ک ۲۵ و ۷۵) بسامد هفتگی مصرف گروه‌های غذایی حاوی فروکتوز و مقدار دریافت روزانه انرژی و مواد مغذی در دو گروه NAFLD و سالم

P ^t	سالم (n=۵۷) Median (25 th , 75 th)	NAFLD (n=۵۷) Median (25 th , 75 th)	متغیر
داده‌های بسامد غذایی (بار در هفته)			
•/•۰۴	۶۳/۴ (۳۸/۵, ۷۸/۸)	۷۵/۵ (۵۶/۵۵, ۹۰/۵۵)	میوه‌ها
•/۴۳۲	۲۲/۰ (۱۴/۹, ۳۳/۹)	۲۵/۵ (۱۸/۸, ۱۳۶/۳۹)	سبزی‌ها
•/۱۵۱	•/۲ (۰/۲, ۰/۹)	•/۴۶ (۰/۲, ۰/۹)	آبمیوه‌های طبیعی (آب طالبی و...)
•/۰۷۴	•/۲ (۰/۲, ۰/۹)	•/۴۶ (۰/۲, ۰/۹)	آبمیوه‌های تجاری (ساندیس)
•/۸۷۰	•/۲ (۰/۲, ۰/۹)	•/۲۳ (۰/۰, ۴۰/۹)	کنسانتره میوه‌ها (سن ایچ و...)
•/۶۲۶	•/۹۷ (۰/۲۳, ۱/۹۴)	•/۹۷ (۰/۰, ۱۳۳/۹۴)	ما الشعیر، دلستر، ایستک
•/۶۶۴	•/۴۶ (۰/۲۳, ۱/۹۳)	•/۹۷ (۰/۰, ۲۳/۹۷)	کولا، نوشابه، لیموناد
داده‌های ثبت غذایی (روزانه)			
•/۳۶۹	۲۰۱۵/۰ (۱۵۰/۸, ۲۰۰/۱)	۱۸۶۵/۱ (۱۵۸۰/۲۰۰/۳)	انرژی (kcal)
•/۹۸۴	۲۱۸/۷ (۱۸۱/۳, ۴/۳)	۲۳۸/۶ (۱۹۴/۳۸/۷)	کربوهیدرات (g)
•/۴۶۸	۴۷/۰ (۴۱/۵, ۵/۰)	۴۹/۰ (۴۳/۵, ۰/۵)	کربوهیدرات (%)
•/۵۶۹	۵۵/۶ (۴۰/۸, ۵/۸)	۵۸/۸ (۳۵/۷, ۴/۰)	قند ساده (g)
•/۱۸۸	۲/۶ (۱/۳, ۸/۵)	۲/۸ (۲/۳, ۱/۸)	قند ساده از انرژی (%)
•/۳۰۱	۲۲/۳ (۱۵/۳, ۰/۷)	۲۴/۰ (۱۶/۳, ۷/۶)	قند ساده از کربوهیدرات (%)
•/۹۵۷	۱۷/۹ (۱۲/۳, ۵/۴)	۱۹/۱ (۱۲/۳, ۵/۸)	ساکاروز (g)
•/۳۹۴	۱۷/۹ (۹/۲, ۴/۰)	۱۸/۲ (۹/۲, ۸/۵)	فروکتوز (g)
•/۱۰۰	۲۷/۸ (۱۶/۳, ۴/۷)	۳۱/۶ (۲۰/۴, ۱/۲)	فروکتوز کل (g)
•/۰۴۵	۱/۲ (۰/۱, ۰/۶)	۱/۵ (۰/۲, ۰/۰)	فروکتوز کل از انرژی (%)
•/۲۹۸	۹/۶ (۷/۱, ۱/۰/۶)	۱۱/۹ (۵/۲, ۹/۸)	فروکتوز کل از کربوهیدرات (%)
•/۱۲۴	۴۷/۲ (۲۶/۷, ۰/۰)	۵۷/۲ (۳۶/۹, ۰/۵/۶)	فروکتوز کل از قند ساده (%)
•/۴۷۷	۹۵/۵ (۱۱۸/۰, ۵۸/۶)	۸۹/۵ (۱۰۹/۴, ۵۶/۵)	چربی (g)
•/۵۳۴	۴۲/۰ (۴۵/۵, ۳۶/۰)	۴۰/۰ (۴۵/۰, ۳۵/۵)	چربی از انرژی کل (%)
•/۷۹۹	۱۷۲/۸ (۲۴۵/۵, ۰, ۰/۵/۱)	(۲۶۵/۹, ۰, ۰/۳/۶)	کلسترون (mg)
•/۸۷۶	۱۸/۵ (۲۲/۴, ۱۲/۸)	۱۶۱/۳	SFA (g)
•/۷۸۶	۲۵/۰ (۳۱/۲, ۱۷/۱)	۱۷/۹ (۲۲/۸, ۱۲/۳)	MUFA (g)
•/۳۰۴	۳۶/۷ (۴۵/۸, ۲۷/۷)	۲۶/۹ (۳۴/۱, ۱۷/۴)	PUFA (g)
۳۵/۵ (۴۰/۴, ۳۰/۹)			

NAFLD: Non-alcoholic Fatty Liver Disease , SFA: Saturated Fatty Acids, MUFA: Mono Unsaturated Fatty Acids, PUFA: Poly Unsaturated Fatty Acids. ^tMann-Whitney U Test.

جدول شماره ۴. ارتباط فروکتوز کل دریافتی با متغیرها و شاخص‌های تن سنجی در کل افراد و در دو گروه

کل افراد r (p*)	گروه سالم r (p*)	NAFLD r (p*)	متغیر
•/•۰۴ (•/۹۶۹)	-•/۱۰• (•/۴۲۴)	•/۱۱۳ (•/۴۰۴)	(kg) وزن
-•/۰۱۷ (•/۸۵۷)	•/••• (•/۹۹۴)	-•/۰۲۷ (•/۸۴۱)	(cm) قد
•/۰۷ (•/۰۳۰۷)	•/۲۷۳ (•/۰۴۰)	-•/۰۲۲ (•/۸۷۲)	(kg/m ²) BMI
-•/۰۷۳ (•/۴۴۲)	-•/۰۹۸ (•/۴۶۹)	-•/۰۴۳ (•/۷۴۹)	(cm) دور کمر
•/۰۳۲ (-/۷۳۱)	-•/۰۵۴ (•/۶۹۱)	•/۱۳۶ (•/۳۱۲)	(cm) دور بابن
-•/۱۷۱ (•/۰۶۹)	-•/۰۹۸ (•/۴۶۸)	-•/۲۴۳ (•/۰۶۹)	WHR
-•/۰۶۷ (•/۴۷۶)	-•/۰۹۸ (•/۴۶۹)	-•/۰۳۴ (•/۸۰۳)	WHTR

NAFLD: Non-alcoholic Fatty Liver Disease, BMI: Body Mass Index, WHR: Waist to Hip Ratio, WHTR: Waist to Height Ratio.

*Pearson Correlation Coefficient

جدول شماره ۵. مقایسه بسامد هفتگی مصرف میوه ها و سبزی ها با شاخص های چاقی در دو گروه NAFLD و سالم

سبزی ها		میوه ها		افراد		طبقه بندی	جنس	شاخص
P‡	سالم (n=۵۷) Median (25 th ,75 th)	NAFLD (n=۵۷) Median (25 th ,75 th)	P‡	سالم (n=۵۷) Median (25 th ,75 th)	NAFLD (n=۵۷) Median (25 th ,75 th)	سالم (n=۵۷) n (%)	NAFLD (n=۵۷) n (%)	
.۰/۵۹۱	۲۷/۶	۲۲/۱	.۰/۴۷۸	۵۹/۱	۶۶/۸	۱۹	۱۱	اضافه وزن
	(۱۶/۷-۳۹/۵)	(۲۰/۵-۳۶/۴)		(۳۸/۱-۸۳/۵)	(۵۰/۲-۹۰/۸)	(۳۳/۳)	(۱۹/۳)	کلیه افراد
.۰/۵۷۱	۱۸/۱	۲۵/۵	.۰/۰۹۹	۵۴/۸	۷۲/۶	۲۱	۲۱	چاقی نوع اول
	(۱۴/۳-۳۵/۵)	(۱۴/۷-۳۴/۱)		(۲۱/۲-۷۸/۸)	(۵۶/۵-۸۶/۸)	(۳۶/۹)	(۳۶/۹)	
.۰/۹۴۹	۲۷/۶	۲۴/۶	.۰/۰۷۱	۵۹/۴	۸۱/۹	۸	۱۵	چاقی نوع دوم
	(۲۳/۲-۱۵/۱)	(۱۹/۷-۳۲/۰)		(۵۴/۶-۷۷/۷)	(۵۸/۱-۱۱۳/۹)	(۱۴/۰)	(۱۶/۳)	(۳۵-۳۹/۹)
.۰/۲۷۰	۲۱/۶	۲۸/۲	.۰/۰۲۱	۵۹/۶	۷۳/۱	۹	۱۰	چاقی نوع سوم (≥ ۴۰)
	(۱۴/۹-۲۸/۸)	(۱۶/-۰-۴۰/۰)		(۴۶/۴-۷۴/۵)	(۵۸/۸-۱۰۹/۲)	(۱۵/۸)	(۱۷/۵)	
.۰/۵۷۰		.۰/۹۵۹		.۰/۷۷۵	.۰/۴۹۰			P* بین گروهی
-	-	-	-	-	-	-	-	مرد دور کمر (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-	پیش آگهی چاقی < ۹۴
-	-	-	-	-	-	-	-	پیش آگهی چاقی ۹۴-۱۰۲
.۰/۱۵۷	۴۹/۴	۲۱/۵	.۰/۴۸۰	۶۷/۰	۵۹/۳	۱	۴	چاقی
	(۴۹/۴-۴۹/۴)	(۱۲/۰-۳۶/۶)		(۶۷/۰-۶۷/۰)	(۳۴/۶-۲۰۹/۶)			> ۱۰۲
.۰/۰۹۲	۱۹/۵	۴۰/۰	.۰/۳۲۵	۵۶/۱	۷۱/۲	۱۶	۲	طبیعی زن
	(۹/۹-۲۹/۵)	(۳۶/۴-۴۳/۵)		(۲۴/-۷۵/۷)	(۶۶/۸-۷۵/۵)			< ۸۰
.۰/۰۱۲	۲۳/۸	۴۴/۸	.۰/۱۵۹	۶۳/۴	۹۷/۰	۱۱	۶	پیش آگهی چاقی
	(۱۸/۲-۲۹/۹)	(۲۸/-۰-۵۵/۴)		(۳۳/۶-۱۰۷/۲)	(۶۰/۸-۱۲۰/۳)			۸۰-۸۸
.۰/۶۱۸	۲۳/۷	۲۳/۷	.۰/۰۳۹	۶۴/۱	۷۷/۳	۲۹	۴۵	چاقی
	(۱۶/۰-۳۲/۵)	(۱۶/-۰-۳۲/۵)		(۳۹/۲-۷۹/۷)	(۵۶/۵-۸۹/۰)			> ۸۸
.۰/۳۵۷		.۰/۰۰۷		.۰/۵۴۵	.۰/۴۸۶			P* بین گروهی
.۰/۱۸۰	۴۹/۴	۲۱/۳	.۰/۱۸۰	۶۷/۰	۵۸/۶	۱	۳	طبیعی مرد
	(۴۹/۴-۴۹/۴)	(۸/۸-۲۱/۸)		(۶۷/۰-۶۷/۰)	(۲۶/۵-۵۹/۹)			< ۱
	۴۱/۶				۲۵۹/۴		۱	چاقی
	(۴۱/۶-۴۱/۶)				(۲۵۹/۴-۲۵۹/۴)			> ۱
	.۰/۱۳۳			.۰/۰۴۵				P* بین گروهی
.۰/۲۱۰	۲۲/۹	۳۰/۲	.۰/۱۰۲	۶۳/۸	۷۴/۰	۴۴	۳۴	طبیعی زن
	(۱۵/۸-۳۴/۰)	(۲۰/۲-۳۶/۴)		(۳۸/۳-۷۹/۰)	(۶۱/۴-۹۵/۴)			< ۰/۸۵
.۰/۷۳۰	۱۸/۹	۲۲/۲	.۰/۱۲۳	۵۶/۳	۸۳/۰	۱۲	۱۹	چاقی
	(۱۳/۲-۳۰/۶)	(۱۵/۴-۳۱/۸)		(۳۸/۲-۷۸/۶)	(۵۶/۴-۹۰/۳)			> ۰/۸۵
.۰/۱۲۴		.۰/۱۹۳		.۰/۸۱۷	.۰/۰۹۹			P* بین گروهی
.۰/۴۳۲	۲۲/۰	۲۴/۶	.۰/۰۰۴	۶۳/۴	۷۵/۵	۵۷	۵۷	چاق (۰/۵) کلیه افراد
	(۱۴/۹-۳۴/۰)	(۱۸/۸-۳۵/۳)		(۳۸/۴-۷۸/۸)	(۵۷/۶-۹۱/۲)	(۱۰۰)	(۱۰۰)	WHR

NAFLD: Non-alcoholic Fatty Liver Disease , BMI: Body Mass Index, WHR: Waist to Hip Ratio, WHtR: Waist to Height Ratio.

‡ Mann-Whitney U Test, *Kruskal Wallis Test

ارتباط مصرف منابع غذایی فروکتوز با شاخص‌های تن سنجی ... مهرانگیز ابراهیمی ممقانی و همکاران

جدول شماره ۶. عوامل موثر در بروز NAFLD

P	Adjusted OR‡ (CI 95%)	P	Unadjusted OR (CI 95%)	متغیرها
.۰/۷۵۴	.۰/۹۰ (.۰/۱۹-۴/۲۵)	.۰/۰۳۶	.۰/۵۹ (.۰/۳۸-۰/۹۷)	میزان تحصیلات
.۰/۳۳۸	.۰/۹۸ (.۰/۹۴-۱/۰۲)	.۰/۰۰۲	.۱/۰۴ (.۱/۰۱-۱/۰۲)	وزن (kg)
.۰/۳۵۳	.۰/۰۷ (.۰/۰۰-۰/۲۵)	.۰/۰۰۹	.۱/۲۷ (.۱/۰۹-۱/۵۱)	WHR
.۰/۰۰۱	.۰/۰۷ (.۰/۰۵-۰/۱۰)	.۰/۰۰۱	.۱/۴۱ (.۱/۳۹-۳/۳۱)	WHtR
.۰/۳۹۷	.۱/۰۵ (.۰/۹۴-۱/۱۶)	.۰/۰۰۱	.۱/۱۳ (.۰/۰۶-۱/۲۰)	(IU/L) AST
.۰/۱۰۱	.۱/۰۵ (.۰/۹۹-۱/۱۱)	.۰/۰۰۱	.۱/۰۸ (.۱/۰۳-۱/۱۳)	(IU/L) ALT
.۰/۷۱۵	.۰/۹۸ (.۰/۸۶-۱/۱۱)	.۰/۰۰۹	.۱/۰۲ (.۱/۰۱-۱/۰۳)	میوه‌ها (بار در هفته)
.۰/۴۶۲	.۱/۰۶ (.۰/۹۱-۱/۲۲)	.۰/۷۰۹	.۱/۰۳ (.۰/۰۰-۱/۰۶)	آبمیوه‌ها (بار در هفته)
.۰/۳۶۰	.۱/۰۶ (.۰/۹۳-۱/۲۱)	.۰/۷۰۲	.۱/۰۱ (.۰/۹۸-۱/۰۳)	چربی‌ها (بار در هفته)
.۰/۷۶۴	.۱/۰۲ (.۰/۸۹-۱/۱۷)	.۰/۱۶۲	.۱/۰۰ (.۰/۹۹-۱/۰۰)	انرژی (kcal)
.۰/۴۹۵	.۰/۹۹ (.۰/۹۹-۱/۰۱)	.۰/۲۶۵	.۱/۱۵ (.۰/۹۲-۱/۴۴)	قد ساده (g)
.۰/۱۲۵	.۰/۶۵ (.۰/۳۷-۱/۱۳)	.۰/۰۹۰	.۰/۷۰ (.۰/۴۵-۱/۰۸)	فروکتوز کل از انرژی (%)

NAFLD: Non-alcoholic Fatty Liver Disease, WHR: Waist to Hip Ratio, WHtR: Waist to Height Ratio, ALT: Alanin Amino Transferase, AST: Aspartate Amino Transferase.

‡کنترل شده برای ویژگی‌های فردی، اقتصادی و اجتماعی و عوامل تن سنجی و بیوشیمیایی، داده‌های بسامد غذایی و دریافت غذایی

می باشد(۲۶،۲۷). مطالعات محدود اخیر(۲۸-۳۱) حاکی از ارتباط چربی احشایی با خطر NAFLD بوده اما ارتباط فروکتوز مصرفی با تغییر در توده چربی هنوز نیازمند مطالعات بیشتر است(۳۲-۳۴). اکثر این مطالعات به ارزیابی فروکتوز در قالب نوشیدنی‌های حاوی HFCS پرداخته اند اما مصرف این شیرین‌کننده و نوشیدنی‌های حاوی آن در ایران رایج نبوده از این رو منبع عمده فروکتوز در الگوی غذایی ایران را میوه‌ها و سبزی‌ها به خود اختصاص می دهند. اگر چه مطالعاتی وجود دارد که ارتباط منابع طبیعی فروکتوز یعنی میوه‌ها و سبزی‌ها را با شاخص‌های چاقی مورد ارزیابی قرار داده اند ولی هیچ یک از این ارتباط‌ها به طور اختصاصی در بیماران NAFLD نبوده است.

در مطالعاتی که همسان سازی از لحاظ BMI صورت نگرفته شواهد حاکی از شیوع بیشتر اضافه وزن و چاقی در بیماران NAFLD نسبت به افراد سالم می باشد(۳۵) و بیان شده که BMI بالا با خطر ابتلا به NAFLD در ارتباط است(۳۶-۳۹). به همین منظور در مطالعه حاضر جهت نشان دادن اثر عوامل دیگر در بروز NAFLD، دو گروه از لحاظ BMI همسان سازی شده و کلیه افراد بیمار و شاهد آن‌ها از میان افراد چاق و دارای اضافه وزن انتخاب شدند. هم چنین در دو گروه اختلاف معنی داری در دور کمر، دور باسن، WHR و

بحث و نتیجه گیری

در مطالعه مورد-شاهدی حاضر که بر روی بیماران NAFLD و افراد سالم انجام گرفت، میانه بسامد هفتگی مصرف میوه‌ها و سهم فروکتوز از انرژی در کل بیماران و نیز میانه بسامد هفتگی مصرف میوه‌ها در زنان با چاقی شکمی (بر اساس دور کمر و WHtR) به طور معنی داری بیشتر از افراد سالم بود. اگر چه فروکتوز کل دریافتی با BMI در افراد سالم همبستگی مثبت معنی داری را نشان داد ولی تفاوت معنی داری از لحاظ میانه بسامد هفتگی مصرف میوه‌ها و سبزی‌ها به عنوان منابع طبیعی فروکتوز در سطوح مختلف BMI مشاهده نشد. با وجود این که در ابتدا وزن، ALT، WHtR و WHR ارتباط معنی داری را با بیماری NAFLD نشان دادند اما پس از کنترل عوامل مخدوشگر تنها عامل پیشگوئی کننده این بیماری در نمونه‌های مورد مطالعه WHtR یافت شد و سایر عوامل نقشی در بروز NAFLD نداشتند. یکی از مهم‌ترین عوامل خطر بیماری NAFLD چاقی و اضافه وزن است. نتایج مطالعات پیشین حاکی از آن است که چربی احشایی یا شکمی از نظر متابولیکی بسیار بدتر از چربی زیرجلدی بوده(۲۵) و همین شدت چاقی شکمی عامل پیش گویی کننده قوی در بیماری‌های کبدی پیش‌رفته چون NAFLD

ها و سبزی ها ارتباط معکوسی با دور کمر داشت(۴۷). علاوه بر این مطالعات اخیری(۲۸-۳۱) که به ارتباط میان چاقی شکمی با خطر NAFLD پرداخته اند شواهد متناقضی برای اثر مصرف فروکتوز در تغییر چاقی شکمی و در نتیجه خطر NAFLD گزارش نموده اند(۳۲-۳۴). به نظر میرسد مصرف بالای میوه ها به دلیل افزایش در مصرف قندهای ساده به ویژه فروکتوز که قندی لیپوژنیک و محرك سنتز تری گلیسیرید می باشد در افزایش وزن و چاقی شکمی و به تبع آن در بروز NAFLD نقش داشته باشد(۱۴). این قند پس از جذب از طریق روده وارد ورید پورت می شود که مقادیر قابل ملاحظه ای از آن توسط کبد برداشت می شود. فروکتوز به صورت مداوم و غیرقابل کنترل وارد مسیرهای گلیکولیتیکی و گلوکونوژنر شده و در نهایت منجر به تولید گلوكز، گلیکوژن، لاكتات و پیروات-پیش سازهای آسیل گلیسرول-شده و منجر به تولید مقادیر زیاد تری گلیسیرید و به دنبال آن لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین می گردد. به نظر می رسد افزایش لیپوژنر de novo، اختلال در خروج چربی ها و کاهش تجزیه ای اسیدهای چرب در کبد از سایر مکانیسم هایی باشد که فروکتوز به واسطه این عوامل در چاقی و استئاتوز کبد نقش داشته باشد(۱۵). اما این که چه مقدار فروکتوز و از چه نوعی(طبیعی یا صنعتی) می تواند چنین اثراتی داشته و منجر به نارسایی یا صدمه به کبد شود و یک فرد مجاز به افزایش میوه ها و سبزی ها تا چه حدی می باشد هنوز به درستی مشخص نشده و نیاز به انجام مطالعات بیشتر در این زمینه احساس می شود.

اگر چه مطالعه حاضر به دلیل ماهیت گذشته نگر آن قادر به اثبات رابطه علیتی میان دریافت فروکتوز و بیماری NAFLD نبوده و علی رغم تلاش زیاد جهت عدم سوگیری در ثبت گزارشات دریافت غذائی، باز هم خطا در به یادآوردن و گزارش دهی وجود داشت. اما این مطالعه نقاط قوت متعددی هم چون توان مطالعه بالا(۹۰ درصد) و سطح اطمینان مطلوب(۹۵ درصد)- و نیز حجم نمونه زیاد با توجه به قالب مطالعه مورد- شاهدی نیز داشت. به علاوه کنترل و حذف اثر مخدوشگرهای احتمالی هم چون سن، جنس و BMI

WHTR یافت شد که پس از کنترل کلیه عوامل مخدوشگر تنها WHTR به عنوان مهم ترین پیشگویی کننده ابتلا به NAFLD شناسایی شد. در بسیاری از مطالعات همسو با مطالعه حاضر، چاقی مرکزی نسبت به چاقی عمومی ارتباط بیشتری با NAFLD داشته(۴۰-۴۷،۴۳) و به نظر می رسد در گروه های مختلف نژادی WHTR به دلیل حذف اثر قد در مقایسه با دور کمر پیشگویی کننده قوی تری در شناسایی عوامل خطر بروز بسیاری از بیماری ها از جمله NAFLD در بزرگسالان باشد(۴۴).

از سویی دیگر با وجود مزایای متعدد شناخته شده برای رژیم های غذایی غنی از میوه و سبزی به سبب محتوای فیبر، ویتامین ها و مواد آنتی اکسیدانی بالا و با وجود حمایت از ترویج مصرف میوه ها و سبزی ها به جای تقلات به عنوان وسیله ای جهت پیشگیری از افزایش وزن به عنوان یکی از عوامل خطر NAFLD، در مطالعه حاضر اگر چه مصرف میوه ها در زنان مبتلا به NAFLD با WHTR بالا به عنوان اصلی ترین پیشگویی کننده NAFLD و نیز بسامد مصرف هفتگی میوه ها و به تبع آن سهم فروکتوز دریافتی از انرژی در بیماران به طور معنی داری بیش از افراد گروه کنترل آن ها بود اما همبستگی معنی داری میان کل فروکتوز دریافتی با BMI در افراد سالم مشاهده شد. در تعدادی از مطالعات که بر روی افراد سالم چاق یا دارای اضافه وزن و یا افراد دارای سندروم متابولیک صورت گرفت، همسو با مطالعه حاضر ارتباط معکوسی بین مصرف میوه و سبزی با سندروم متابولیک، چاقی، افزایش وزن و دور کمر گزارش شد(۴۵-۴۸). هم چنین در مطالعه ای دیگر افزایش مصرف میوه و سبزی سبب کاهش وزن معنی دار در والدین و فرزندان چاق آن ها شد(۴۵). نتایج مطالعه کوهورت آینده نگر در مردان ارتباط معکوسی بین مصرف میوه ها و سبزی ها و افزایش وزن در طی ۵ سال را نشان داد اما این شواهد تنها در کسانی که دریافت فیبر بالایی داشتند صادق بود(۴۶). Halkjaer و همکاران در مطالعه کوهورت ارتباط مشبی بین دور کمر و کربوهیدرات در شکل غلات تصفیه شده، سبب زمینی ها و غذاهای حاوی قند های ساده نشان داد در حالی که کربوهیدرات حاصل از میوه

در مقادیر توصیه شده(بدون دریافت شیرین کننده های مصنوعی چون HFCS) با بیماری NAFLD بوده و انجام مطالعات آینده نگر در خصوص مصرف مقادیر بیش از حد توصیه شده فروکتوز با این بیماری پیشنهاد می گردد.

سپاسگزاری

بدین وسیله از همکاری کلیه شرکت کنندگان در این تحقیق تشکر و قدردانی می گردد.

References

- Law K, Brunt EM. Nonalcoholic fatty liver disease. *Clin Liver Dis* 2010; 14:591-604.
- Angulo P. GI epidemiology nonalcoholic fatty liver disease. *Aliment Pharmacol Ther* 2007; 25:883-9.
- Ludwig J, Viggiano T, McGill D, Oh B. Nonalcoholic steatohepatitis: Mayo clinic experiences with a hitherto unnamed disease. *Mayo Clin Proc* 1980; 55:434-8.
- Smith BW, Adams LA. Non-alcoholic fatty liver disease. *Crit Rev Clin Lab Sci* 2011;48:97-113.
- Ouyang X, Cirillo P, Sautin Y, et al. Fructose consumption as a risk factor for non-alcoholic fatty liver disease. *J Hepatol* 2008; 48:993-9.
- Angulo P. Nonalcoholic fatty liver disease. *N Engl J Med* 2002; 364:1221-31.
- Grattagliano I, Portincasa P, Palmieri VO, Palasciano G. Managing nonalcoholic fatty liver disease recommendations for family physicians. *Can Fam physician* 2007; 53:857-63.
- Fan JG, Saibara T, Chitturi S, Kim BI, Sung JJ, Chutaputti A. What are the risk factors and settings for non-alcoholic fatty liver disease in Asia-Pacific? *J Gastroenterol Hepatol* 2007;22:794-800.
- Dekker MJ, Su Q, Baker C, Rutledge AC, Adell K. Fructose a highly lipogenic nutrient implicated in insulin resistance, hepatic steatosis, and the metabolic syndrome. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 2010; 299:685-94.
- Collison KS, Saleh SM, Bakheet RH, Alrabiah RK, Inglis AL, Makhoul NJ, et al. Diabetes of the liver the link between nonalcoholic fatty liver disease and HFCS-55. *Obesity* 2009;17:2003-13.
- Nomura K, Yamanouchi T. The role of fructose-enriched diets in mechanisms of nonalcoholic fatty liver disease. *J Nutr Biochem* 2012; 23:203-8.
- Anania FA. Non-alcoholic fatty liver disease and fructose bad for us better for Mice. *J Hepatol* 2011; 55:218-20.
- Lim JS, Mietussnyder M, Valente A, Schwarz JM, Lustig RH. The role of fructose in pathogenesis of NAFLD and the metabolic syndrome. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol* 2010;7:251-64.
- Mayes PA. Intermediary metabolism of fructose. *AM J Clin Nutr* 1993; 58:754-765.
- Castello A, Guma A, Sevilla L, Furriols M, Testar X, Palacin M, Zorzano A. Regulation of GLUT5 gene expression in rat intestinal mucosa regional distribution circadian rhythm perinatal development and effect of diabetes. *Biochem J* 1995; 309:271-7.
- Abdelmalek MF, Suzuki A, Guy C, Unalparida A, Colvin R, Johnson RJ, et al. Increased fructose consumption is associated with fibrosis severity in patients with nonalcoholic fatty liver disease. *Hepatology* 2010; 51:1961-71.
- Assy N, Nasser G, Kamayse I, Nseir W, Beniashvili Z, Djibre A, et al. Soft drink consumption linked with fatty liver in the absence of traditional risk factors. *Can J Gastroenterol Hepatol* 2008; 22:811.
- Abid A, Taha O, Nseir W, Farah R, Grosovski M, Assy N. Soft drink consumption is associated with fatty liver disease independent of metabolic syndrome. *J Hepatol* 2009;51:918-24.
- Savadkouhi F, Hosseinitabatabaei SMT, Shahabinezhad S. [The frequency of fatty liver in sonography of patients without liver disease background and its correlation with

در ابتلا به NAFLD در دو گروه از مهم ترین نقاط قوتی است که پیش از این در مطالعات محدودی صورت گرفته تا به این ترتیب بتوان اثر عوامل دیگری نظیر عوامل غذایی دخیل در این بیماری را مشخص نموده و NAFLD جنبه های جدیدی از عوامل خطر را در بروز معرفی نماید. در مجموع یافته های مطالعه مورد شاهدی حاضر حاکی از عدم وجود ارتباط میان دریافت فروکتوز از منابع طبیعی در شکل میوه ها و سبزی ها

- blood cholesterol and triglyceride]. Tabibshargh J 2004; 5:177-183. (Persian)
- 20.Paschos P, Paletas K. Nonalcoholic fatty liver disease and metabolic syndrome. Hippokratia 2009; 13:9-19.
- 21.Vehmas T, Kaukiainen A, Luoma K, Lohman M, Nurminen M, Taskinen H. Liver echogenicity measurement or visual grading? Comput Med 2004; 28:289-93.
- 22.Baghianimoghaddam MH, Bakhtariaghdam F, Asgharijafarabadi M, Allahverdipour H, Dabaghnikookheslat S, Safarpour SH. The Iranian version of international physical activity questionnaire in Iran: Content and construct validity, factor structure, internal consistency and stability. World Appl Sci J 2012; 18:1073-80.
- 23.Lean MJ, Han TS. Waist worries. Am J Clin Nutr 2002; 76:699-700.
- 24.Hsieh S, Yoshinaga H, Muto T. Waist-to-height ratio, a simple and practical index for assessing central fat distribution and metabolic risk in Japanese men and women. Int J Obes 2003; 27:610-6.
- 25.Rodriguez A, Catalan V, Gomezambrosi J, Fruhbeck G. Visceral and subcutaneous adiposity are both potential therapeutic targets for tackling the metabolic syndrome? Curr Pharm Des 2007;13:2169-75.
- 26.Toshimitsu K, Matsuura B, Ohkubo I, Niiya T, Furukawa S, Hiasa Y, et al. Dietary habits and nutrient intake in non-alcoholic steatohepatitis. Nutr J 2007; 23:46-52.
- 27.Kim CH, Kallman JB, Bai C, Pawloski L, Gewa C, Arsalla A, et al. Nutritional assessments of patients with non-alcoholic fatty liver disease. Obes Surg 2010; 20:154-60.
- 28.Sogabe M, Okahisa T, Hibino S, Yamanoi A. Usefulness of differentiating metabolic syndrome into visceral fat type and subcutaneous fat type using ultrasonography in Japanese males. J Gastroenterol 2012; 47:293-9.
29. Eguchi Y, Mizuta T, Sumida Y, Ishibashi E, Kitajima Y, Isoda H, et al. The pathological role of visceral fat accumulation in steatosis, inflammation, and progression of nonalcoholic fatty liver disease. J Gastroenterol 2011; 46:70-8.
- 30.Jun DW, Han JH, Kim SH, Jang EC, Kim NI, Lee JS, et al. Association between low thigh fat and non-alcoholic fatty liver disease. J Gastroenterol Hepatol 2008; 23:888-93.
- 31.O'Connell J, Lynch L, Cawood TJ, Kwasnik A, Nolan N, Geoghegan J, et al. The relationship of omental and subcutaneous adipocyte size to metabolic disease in severe obesity. PloS One 2010;5:9997.
- 32.Stanhope KL, Havel PJ. Fructose consumption considerations for future research on its effects on adipose distribution, lipid metabolism and insulin sensitivity in humans. J Nutr 2009; 139:1236-41.
- 33.Silbernagel G, Machann J, Unmuth S, Schick F, Stefan N, Haring HU, et al. Effects of 4-week very-high-fructose/glucose diets on insulin sensitivity visceral fat and intrahepatic lipids an exploratory trial. Br J Nutr 2011;106:79-86.
- 34.Odegaard AO, Choh AC, Czerwinski SA, Towne B, Demerath EW. Sugar-sweetened and diet beverages in relation to visceral adipose tissue. Obes J 2012; 20:689-91.
- 35.Fan JG, Zhu J, Li XJ, Chen L, Li L, Dai F, et al. Prevalence of and risk factors for fatty liver in a general population of Shanghai China. J Hepatol 2005; 43:508-14.
- 36.Powell EE, Cooksley WGE, Hanson R, Searle J, Halliday JW, Powell W. The natural history of nonalcoholic steatohepatitis a follow-up study of forty-two patients for up to 21 years. Hepatol 1990;11:74-80.
- 37.Bacon BR, Farahvash MJ, Janney CG, Neuschwandertetri BA. Nonalcoholic steatohepatitis an expanded clinical entity. Gastroenterol 1994;107:1103-9.
- 38.Mccullough AJ. Update on nonalcoholic fatty liver disease. J Clin Gastroenterol 2002; 34:255-62.
- 39.Wanless IR, Lentz JS. Fatty liver hepatitis (steatohepatitis) and obesity an autopsy study with analysis of risk factors. Hepatology 1990; 12:1106-10.
- 40.Vilar L, Oliveira CP ,Faintuch J, Mello ES, Nogueira MA, Santos TE, et al. High-fat diet a trigger of non-alcoholic steatohepatitis? Preliminary findings in obese subjects. Nutrition 2008; 24:1097-102.

- 41.Zelbersagi S, Nitzankaluski D, Halpern Z, Oren R. Prevalence of primary non-alcoholic fatty liver disease in a population-based study and its association with biochemical and anthropometric measures. *Liver Int* 2006; 26:856-63.
- 42.Chan D, Watts G, Ng T, Hua J, Song S, Barrett P. Measurement of liver fat by magnetic resonance imaging: relationships with body fat distribution, insulin sensitivity and plasma lipids in healthy men. *Diabetes Obes Metab* 2006; 8:698-702.
- 43.Capristo E, Miele L, Forgione A, Vero V, Farnetti S, Mingrone G, et al. Nutritional aspects in patients with non-alcoholic steatohepatitis (NASH). *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2005; 9:265-9.
- 44.Ashwell M, Gunn P, Gibson S. Waist-to-height ratio is a better screening tool than waist circumference and BMI for adult cardiometabolic risk factors systematic review and metaanalysis. *Obes Rev* 2011; 1-12.
- 45.Epstein LH, Gordy CC, Raynor HA, Beddome M, Kilanowski CK, Paluch R. Increasing fruit and vegetable intake and decreasing fat and sugar intake in families at risk for childhood obesity. *Obes Res* 2001; 9:171-8.
- 46.Besrastrollo M, Martinezgonzalez MA, Sanchezvillegas A, Fuentearrillaga C, Martinez JA. Association of fiber intake and fruit/vegetable consumption with weight gain in a Mediterranean population. *Nutrition* 2006; 22:504-11.
- 47.Halkjaer J, Tjønneland A, Thomsen BL, Overvad K, Sorensen TI. Intake of macronutrients as predictors of 5-y changes in waist circumference. *Am J Clin Nutr* 2006; 84:789-97.

◆ Association between Dietary Sources of Fructose and Anthropometric Indices in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Case-Control Study

Youshari N¹, Ebrahimimamaghani M^{2}, Asgharijafarabadi M³, Youshary N⁴, LotfiPoor M⁵*

(Received: June 20, 2015)

Accepted: November 8, 2015)

Abstract

Introduction: Regarding the increased risk of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) and due to the special attention to fructose as a risk factor for developing NAFLD and obesity in recent years and also due to the lack of papers that have worked on fructose from its natural sources -no artificial sweeteners-, this study was designed to determine the association between dietary sources of fructose and anthropometric indices in NAFLD.

Materials & methods: This case-control study was carried out on 57 patients with NAFLD (confirmed by ultrasonography and elevated liver enzyme levels) and 57 healthy subjects matched for age, sex and body mass index in Sheykh-ol-rais clinic in Tabriz. Anthropometric indices were measured by standard method and BMI, Waist to hip ratio (WHR) and waist to height ratio (WHtR) were calculated. Using a food frequency questionnaire, weekly consumption of fruit and vegetables were estimated and using 3-day food records the amount of fructose intake and its proportion of energy and macronutrients was estimated.

Findings: The median frequency of weekly fruit consumption and total fructose from energy intake in all participants and the median frequency of weekly fruit consumption in women with abdominal obesity were significantly higher than healthy ones. Although the total fructose intake and BMI in healthy subjects showed a significant positive correlation ($p=0.040$, $r=0.273$), but there was no significant difference between weekly median frequency of fruits and vegetables consumption as natural sources of fructose and different BMI levels. After adjusting for confounders, only WHtR was a predictor and other factors have no role in the pathogenesis of NAFLD.

Discussion & Conclusions: The findings suggest no association between dietary sources of fructose and anthropometric indices in patients with NAFLD.

Keywords: Fructose, Anthropometric Indices, Non-alcoholic fatty liver disease

1. Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Aras International University, Tabriz, Iran

2. Dept of Nutrition, Faculty of Nutrition, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

3. Road Traffic Injury Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

4. Dept of Nutrition, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

5. Faculty of Medicine, Shahrood University of Medical Sciences, Shahrood, Iran

* Corresponding author Email: ebrahimimamaghani@tbzmed.ac.ir