

## ORIGINAL ARTICLE

**Bioaccumulation of Cadmium, Lead, Chromium, Copper, and Zinc in Freshwater Fish Species in Gharasou River in Kermanshah Province, Iran, 2014**

Borhan Mansouri<sup>1</sup>,  
 Afshin Maleki<sup>2</sup>,  
 Behroz Davari<sup>3</sup>,  
 Jamal Karimi<sup>4</sup>,  
 Vahid Momeneh<sup>5</sup>

<sup>1</sup> PhD Student in Ecotoxicology, Student Research Committee, Faculty of Health, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

<sup>2</sup> Professor, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

<sup>3</sup> Associate Professor, Department of Entomology, Faculty of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

<sup>4</sup> BSc in Biology, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran

<sup>5</sup> BSc in Biology, Kermanshah Regional Water Authority, Kermanshah, Iran

(Received December 26, 2015 Accepted March 6, 2016)

### Abstract

**Background and purpose:** There is an increasing interest towards consumption of aquatic products, therefore, the health of aqua ecosystems is highly important. Heavy metal pollution in fish is a global concern due to its bioaccumulation potential, toxicity and persistence in food chain. This study investigated the concentration of heavy metals (cadmium, lead, chromium, copper, and zinc) in the gill, liver, and muscle tissue of *Cyprinus carpio*, *Capoeta trutta*, and *Ctenopharyngodon idella* in Gharasou River, Kermanshah province, Iran.

**Materials and methods:** Sampling was done in Gharasou River and the gill, liver, and muscle tissues were prepared. The concentrations of heavy metals were measured using an ICP.

**Results:** The average concentrations of Cd, Pb, Cr, Cu, and Zn in the muscle tissue of *Cyprinus carpio* and *Capoeta trutta* were 0.001 and 0.001, 0.016 and 0.008, 0.14 and 0.14, 0.53 and 0.33, and 0.51 and 0.51 µg/g wet weight, respectively. The metals with highest and lowest concentrations were zinc and cadmium that were found in different tissues of the fishes, respectively. The accumulation of metals in the tissues of liver and gills was found to be higher than that in the muscles. Moreover, the Hazard Quotients (HQ) index of all heavy metals was less than 1.

**Conclusion:** The concentrations of heavy metals were lower than the levels permitted by World Health Organization, hence, the fish species studied are considered healthy to use.

**Keywords:** Bioaccumulation, heavy metals, fish

J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26(137): 150-158 (Persian).

## تجمع زیستی فلزات کادمیوم، سرب، کروم، مس و روی در گونه‌های ماهیان آب شیرین رودخانه قره‌سو استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۳

برهان منصوری<sup>۱</sup>

افشین ملکی<sup>۲</sup>

بهروز داوری<sup>۳</sup>

جمال کریمی<sup>۴</sup>

وحید مومنه<sup>۵</sup>

### چکیده

**سابقه و هدف:** به موازات افزایش مصرف منابع خوراکی آبزی، اهمیت بهداشتی و سلامت ماهیان نیز بیشتر شده است که در این میان فلزات سنگین به عنوان تجمع زیستی، سمیت و ماندگاری بالا در آبزیان، اهمیت زیادی پیدا کرده است. بنابراین، این تحقیق به منظور بررسی غلظت فلزات سنگین (کادمیوم، سرب، کروم، مس و روی) در بافت‌های آبشنی، کبد و ماهیچه ماهیان کپور معمولی، شیرماهی و آمور در رودخانه قره‌سو در استان کرمانشاه انجام شد.

**مواد و روش‌ها:** نمونه برداری از ماهیان رودخانه قره‌سو در سال ۱۳۹۳ صورت گرفت و بافت‌های آبشنی، کبد و ماهیچه ماهیان جهت بررسی جداسازی شد. اندازه گیری غلظت فلزات با کمک دستگاه ICP انجام گردید.

**یافته‌ها:** میانگین غلظت فلزات کادمیوم، سرب، کروم، مس و روی در بافت ماهیچه ماهی کپور معمولی و شیرماهی به ترتیب ۰/۰۰۱ و ۰/۰۰۱۶، ۰/۰۰۸ و ۰/۰۱۴، ۰/۰۰۳ و ۰/۰۱۴، ۰/۰۵۳ و ۰/۰۵۱ و ۰/۰۳۳ میکرو گرم بر گرم وزن تر به دست آمد. فلزات روی و کادمیوم به ترتیب بیشترین و کمترین غلظت را در بافت‌های مختلف سه گونه ماهیان داشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان تجمع فلزات سنگین در بافت‌های آبشنی و کبد بالاتر از بافت ماهیچه بوده است. هم‌چنین شاخص HQ به دست آمده در این مطالعه برای تمامی فلزات سنگین کم تر از ۱ بوده است.

**استنتاج:** نتایج این مطالعه نشان داد که توزیع فلزات سنگین در بافت ماهیچه ماهیان از نظر آماری اختلاف معنی‌داری ندارد و هم‌چنین در مقایسه با استاندارد سازمان جهانی بهداشت، از حد مجاز کم تر بوده است و نشان دهنده سالم بودن مصرف این ماهیان می‌باشد.

### واژه‌های کلیدی: تجمع زیستی، فلزات سنگین، ماهی

### مقدمه

رودخانه‌ها وارد دریا و از طریق زنجیره غذایی در بدن آبزیان تجمع می‌یابند<sup>(۱)</sup>. آلدگی بوم سازگان‌های آبی

فلزات سنگین از جمله آلاینده‌های مهم در محیط زیست به شمار می‌روند که از طریق مناطق ساحلی و

E-mail: maleki43@yahoo.com

**مؤلف مسئول: افشین ملکی-ستندج:** دانشگاه علوم پزشکی کردستان، مرکز تحقیقات بهداشت محیط

۱. دانشجوی دکترای سم شناسی محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ستندج، ایران

۲. استاد، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ستندج، ایران

۳. دانشیار، گروه حشره شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی همدان، همدان، ایران

۴. کارشناس زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

۵. کارشناسی زیست شناسی، شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۱۰/۵ تاریخ ارجاع چهت اصلاحات: ۱۳۹۴/۱۰/۶

تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

که در بالای زنجیره غذایی قرار دارند و قابلیت تجمع غلظت بالایی از فلزات سنگین در بافت‌های خود را دارند<sup>(۹)</sup>. هم‌چنین این موجودات بخش مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل می‌دهند، از این رو می‌توانند به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های زیستی در اکوسیستم‌های آب شیرین جهت تخمین سطح آلودگی مورد استفاده قرار گیرند<sup>(۱۰، ۱۱)</sup>. هم‌چنین ماهیان به دلیل تحرک بالا در یک منطقه خاص و دارا بودن تنوع و تراکم زیاد، می‌توانند آلودگی‌های چند ساله یک منطقه را نشان دهند و از این طریق می‌توان در مورد آلودگی‌هایی که ناشی از فلزات سنگین بوده است، اظهار نظر کرد<sup>(۱۲)</sup>. معمولاً ماهیان، فلزات سنگین را از طرور مختلفی جذب می‌کنند، به طوری که میزان جذب و تجمع فلزات سنگین در آن‌ها به عواملی هم‌چون شرایط بوم‌شناختی، فیزیکی، شیمیایی و زیستی آب، نوع عنصر، رفتار تغذیه‌ای و فیزیولوژی بدن وابسته می‌باشد<sup>(۱۳)</sup>. در طی سال‌های اخیر، مطالعات متعددی در رابطه با تجمع زیستی فلزات سنگین در بافت‌های مختلف ماهیان در اکوسیستم‌های آبی داخل کشور انجام گرفته شده است. به طوری که در طی تحقیقی سلگی<sup>(۱۴)</sup>، مقادیر غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم را در بافت ماهیچه گونه ماهی کفال پوزه باریک در سواحل شرقی خزر به ترتیب  $0.08 \pm 0.02$  و  $0.03 \pm 0.03$  میکروگرم بر گرم گزارش نمود و بیان داشت که این مقادیر از حد مجاز سازمان جهانی بهداشت پایین‌تر بوده است. در طی تحقیقی مشابه، ابراهیمی سیریزی و همکاران<sup>(۱۵)</sup>، میانگین غلظت فلزات کادمیوم، سرب، مس و روی را در بافت ماهیچه اردک ماهی تالاب ارزلی به ترتیب  $0.06 \pm 0.02$ ،  $0.02 \pm 0.02$ ،  $0.07 \pm 0.02$  و  $0.02 \pm 0.02$  میکروگرم بر گرم وزن خشک به دست آورده و بیان داشتند که به استثناء فلز کادمیوم، دیگر فلزات کمتر از حد استانداردهای تعیین شده توسط سازمان‌های جهانی بهداشت و سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد بوده است. رودخانه قره‌سو به عنوان یکی از رودخانه‌های بزرگ استان

توسط فلزات سنگین یک مشکل جهانی محسوب می‌گردد. افزایش غلظت فلزات سنگین در بوم سازگان‌های آبی موجب مشکلات جدی زیست محیطی شده و بر زنجیره غذایی و در نتیجه بر سلامت ارگانیسم‌ها تاثیر گذار می‌باشد<sup>(۲)</sup>. یکی از اساسی‌ترین مسائل در ارتباط با فلزات سنگین، عدم تجزیه پذیری زیستی آن‌ها در بدن موجودات زنده می‌باشد. در واقع فلزات سنگین پس از ورود به بدن موجود زنده، در بافت‌های نظیر چربی، عضلات، استخوان‌ها و مفاصل رسوب می‌کند و با گذشت زمان و انباست فلزات در بدن، موجب بروز بیماری‌ها و عوارض متعددی در بدن موجود زنده می‌گردد<sup>(۳، ۴)</sup>. بعضی از فلزات سنگین تقریباً در هر غلظتی سمی هستند و بعضی دیگر هنگامی که غلظت آن‌ها از یک آستانه تحمل بالاتر رود، سمیت ایجاد می‌کنند. برخی از فلزات سنگین نظیر مس و روی در مقادیر پایین مورد نیاز ارگانیسم‌های زنده می‌باشند، به طوری که هموگلوبین (مولکول انتقال دهنده اکسیژن) از فلز آهن استفاده می‌کند و بسیاری از آنزیم‌های موجود در بدن برای داشتن فعالیت منظم، دارای فلز روی می‌باشند<sup>(۵، ۶)</sup>. برخی دیگر از فلزات سنگین حتی در غلظت‌های کم برای انسان و دیگر موجودات زنده سمی می‌باشند. از جمله این فلزات سنگین سمی می‌توان به فلزات سنگین کادمیوم و سرب اشاره نمود که خطرات بهداشتی مختلفی نظیر سرطان، جهش و یا سقط جنین را به دنبال خواهند داشت. فلز کادمیوم به آسانی در سیستم‌های زنده بدن تجمع می‌یابد و در ایجاد آسیب‌های بدن هم‌چون اختلالات کلیوی، نارسایی ریه، ضایعات استخوان، سرطان و فشار خون بالا نقش دارد<sup>(۷)</sup>. این فلزات تاثیرات متعددی بر روی آبیزیان از جمله کاهش رشد، تغییر رفتار، تغییر اسکلت بدن، تغییر در عوامل خونی و صدمات به سیستم ایمنی را دارند، هم‌چنین به دلیل قابلیت تجمع زیستی در زنجیره غذایی در اکوسیستم‌های آبی، بررسی غلظت این فلزات قابل اهمیت می‌باشد<sup>(۸)</sup>. ماهیان از موجودات مهم آبی در زنجیره غذایی هستند

مجهز به پودر یخ جاسازی شد و پس از انتقال به آزمایشگاه و شستشو با آب، کدگذاری و بیومتری آنها انجام شد. بافت‌های مورد مطالعه در این تحقیق شامل آبشش، کبد و ماهیچه است. اندام‌های فوق توسط تیغ اسکالپر بدون آلودگی جدا گردید و نمونه‌های ماهیچه از زیر باله پشتی برداشت گردید(۱۶). اندام‌های استخراج شده ابتدا وزن گردید و بر اساس وزن‌تر ماهی مورد بررسی قرار گرفت. برای هضم شیمیایی نمونه‌ها محلول اسیدنیتریک ( $HNO_3$ ) و اسید پرکلریک ( $HClO_4$ ) استفاده شد. جهت هضم، به یک گرم از هر یک از بافت‌های تر تهیه شده، مقدار ۱۰ میلی لیتر اسید نیتریک (۶۵ درصد) اضافه گردید و در دمای محیط هضم انجام شد(۱۷). سپس ۵ میلی لیتر اسید پرکلریک (۷۰ درصد) به نمونه‌ها اضافه گردید و نمونه‌ها در دمای ۸۰ درجه سلسیوس به مدت ۵ ساعت در حمام بن ماری قرار گرفت تا کاملاً هضم گردند. پس از سرد شدن نمونه‌ها در دمای محیط، به کمک آب مقطر به حجم ۵۰ میلی لیتر رسانده و فیلتر شدند (فیلتر ۴۵/۰ میکرومتر). در نهایت پس از آماده‌سازی، میزان فلزات سنگین با استفاده از روش اسپکترومتری نشر اتمی با پلاسمای جفت شده القایی قرائت شد.

#### تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها

آنالیز داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ صورت گرفت. هم چنین جداول در محیط Excel رسم گردید. برای بررسی وجود تفاوت معنی‌داری بین میانگین غلظت فلزات سنگین در بافت‌های مختلف از آزمون واریانس یک طرفه استفاده شد.

#### تعیین شاخص خطر

برای به دست آوردن میزان خطر بالقوه ناشی از مصرف هر یک از گونه‌های ماهی برای انسان، از شاخص خطر استفاده شد. بدین صورت که این شاخص از نسبت تماس یک آلاینده (دوز جذب روزانه آلاینده) به دوز مرجع آن، از طریق فرمول زیر محاسبه شد(۱۸):

$$HQ = [(MCC \times CR)/BW]/RFD$$

کرمانشاه به دلیل گذر از مناطق روستایی و شهری مانند شهر کرمانشاه، پذیرنده آلاینده‌های مختلفی از جمله فلزات سنگین، مواد معدنی حاصل از رواناب‌های کشاورزی و فاضلاب صنعتی می‌باشد. هم چنین وجود پالایشگاه نفت و گاز کرمانشاه و مجاورت آن با این رودخانه، احتمال آلودگی آن را دو چندان می‌کند. بنابراین همواره زندگی کلیه موجودات آبزی از جمله ماهیان با خطرات مواجه می‌باشد(۱۶). از این رو در این مطالعه، جهت پایش رودخانه قره‌سو در ارتباط با فلزات سنگین، به بررسی میزان تجمع‌زیستی فلزات سنگین کadmium، سرب، کروم، مس و روی در بافت‌های آبشش، کبد و ماهیچه ماهیان کپور معمولی، شیرماهی و آمور در رودخانه قره‌سو واقع در استان کرمانشاه پرداخته شده است.

## مواد و روش‌ها

رودخانه قره‌سو یکی از رودخانه‌های مهم استان کرمانشاه است که سرچشمه اصلی آن سراب روانسر واقع در ۵۰ کیلومتری شمال غرب کرمانشاه می‌باشد. این رودخانه در جهت شمال غربی به جنوب شرقی جریان دارد و در ۱۵ کیلومتری شهر کرمانشاه پذیرای رودخانه رازآور و شاخه‌های فرعی آن می‌باشد که طی مسیری پر پیچ و خم در نزدیکی روستای قرانچی رودخانه مرگ به آن متصل می‌شود. این رودخانه با یک شب آرام از داخل شهر کرمانشاه عبور کرده و در نزدیکی فرمان به رودخانه گاماسیاب می‌پیوندد.

نمونه‌برداری از رودخانه قره‌سو در طی ماه‌های آبان تا دی ۱۳۹۳ انجام شد. در این مطالعه، تعداد ۴۵ نمونه از سه گونه ماهی کپور معمولی (۲۰ عدد)، شیرماهی (۱۵ عدد) و آمور (۱۰ عدد) بالغ با متوسط وزن  $20.4 \pm 2.5$  گرم، طول کل  $25 \pm 4$  سانتی‌متر و طول چنگالی  $23 \pm 2$  سانتی‌متر در طول مسیر رودخانه قره‌سو به وسیله تورهای گوشگیر رودخانه‌ای انجام گردید. نمونه‌های ماهی صید شده، در داخل کیسه‌های پلاستیکی در داخل فلاسک‌های

فلزات سنگین رودخانه قره سو برسلامت انسان  
مصرف کنند گان و پذیرنده گان نهایی) از رابطه زیر استفاده شد (۱۸).

$$DI = C_m \times IR$$

که در اینجا DI میزان جذب فلز در بدن در روز از طریق مصرف آبزی (میکروگرم بر گرم) و IR میزان مصرف ماهی در منطقه مورد مطالعه بر حسب گرم در روز است.

ساخته ها

نتایج غلط فلزات سنگین کادمیم، سرب، کروم، روی و مس در بافت‌های مختلف ماهیچه، آبشش و کبد ماهیان کپور معمولی، شیرماهی و آمور در رودخانه قفسو در جدول شماره ۱ ارائه شده است.

نتایج ارزیابی ریسک مصرف ماهیان کپور معمولی،  
شیرماهی، و آمور رودخانه قره سو در جدول شماره ۲  
ارائه شده است. بر این اساس، شاخص خطر فلزات  
سنگین برای ماهیان رودخانه قره سو از  $0/00006$  تا  $0/02$  به دست آمد. براساس یافته های این مطالعه، حد مجاز  
مصرف روزانه ماهیان رودخانه قره سو رنجی از  $1/5$  گرم  
در روز برای کروم در ماهی کپور معمولی و  $1000$  گرم  
در روز برای ماهی آمور می باشد. همچنین شاخص  
خطر (HQ) برای ماهیان رودخانه قره سو کمتر از  $1$  به  
دست آمد. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه بر روی

که در این جا HQ نسبت خطر (بدون واحد)؛ میانگین استاندارد مصرف روزانه ماهی برای بزرگسالان (۰/۰۳) کیلوگرم در روز؛ MCC میانگین غلظت عنصر اندازه گیری شده در بافت هر گونه ماهی (میکروگرم بر گرم یا میلی گرم بر کیلوگرم)؛ BW وزن بدن (۷۰ کیلوگرم برای یک فرد بالغ)؛ RFD دوز مرجع (میلی گرم در کیلوگرم) می باشد.

حد مجاز مصرف روزانه آبزی  
مقدار مجاز مصرف روزانه هر یک از گونه‌های  
ذکر شده بر اساس میانگین غلظت فلزات سنگین  
اندازه‌گیری شده در بخش خوراکی ماهی (ماهیچه)  
با استفاده از رابطه معروفی شده توسط سازمان حفاظت  
محیط زیست محاسبه شد (۱۹).

$$CR_{lim} = (RFD \times BW) / C_m$$

که در اینجا  $\text{Cr}_{\text{lim}}$  حداقل میزان مجاز مصرف در روز (گرم یا کیلو گرم در روز)؛ RFD دوز مرجع یا مجموع مجاز جذب روزانه آلاینده که برای کادمیوم و سرب ۰/۰۱ میلی گرم بر کیلو گرم، برای روی ۰/۳ برای مس ۰/۰۲ و کروم ۰/۰۰۳ میلی گرم بر کیلو گرم در روز است و Cm غلظت عنصر در گونه (میکرو گرم بر گرم یا میلی گرم بر کیلو گرم) می باشد.

میزان جذب روزانه و هفتگی قابل قبول فلزات  
جهت ارزیابی خطر بالقوه مصرف آبزیان آلوده به

**جدول شماره ۱: غلط فلزات سنگن (میکر و گرم بر گرم) در بافت های مختلف ماهان کبور معمولی، شیر ماهی و آمور رودخانه فره سو در استان کرمانشاه**

بافت										ماهی
روی	مس	کروم	سرپ	کادمیوم	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	
حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	کپور معمولی
۳/۱	۰/۰۵	۰/۹۲	۰/۴۵	۰/۲۳	۰/۱۲	۰/۰۳	۰/۰۱۶	۰/۰۰۲	۰/۰۰۰۴	آبشش
۲/۷	۰/۶۴	۰/۸۵	۰/۶۳	۰/۳۲	۰/۱۹	۰/۰۵	۰/۰۱۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۰۵	کبد
۰/۹۵	۰/۳۵	۰/۶۰	۰/۴۳	۰/۲۴	۰/۱۳	۰/۰۲	۰/۰۱۲	۰/۰۰۳	۰/۰۰۰۷	ماهیچه
										شیرماهی
۱/۲	۰/۵۹	۰/۹۵	۰/۷۴	۰/۲۲	۰/۱۲	۰/۰۱۵	۰/۰۱۰	۰/۰۰۷	۰/۰۰۱	آبشش
۲/۲	۰/۵۹	۰/۸۰	۰/۶۳	۰/۲۸	۰/۲۳	۰/۰۲۷	۰/۰۱۳	۰/۰۰۸	۰/۰۰۰۶	کبد
۰/۵۶	۰/۴۵	۰/۴۵	۰/۲۵	۰/۱۸	۰/۱۲	۰/۰۱۱	۰/۰۰۶	۰/۰۰۲	۰/۰۰۰۴	ماهیچه
										آمور
۲/۳	۰/۵۴	۱/۳	۰/۵۶	۰/۳۴	۰/۲۱	۰/۰۱۵	۰/۰۱۲	۰/۰۰۲	۰/۰۰۰۴	آبشش
۱/۶	۰/۵۹	۰/۹۲	۰/۴۹	۰/۲۶	۰/۲۲	۰/۰۲۳	۰/۰۱۵	۰/۰۰۳	۰/۰۰۱	کبد
۰/۵۵	۰/۵۲	۰/۵۱	۰/۳۸	۰/۲۲	۰/۱۵	۰/۰۰۳	۰/۰۰۲	۰/۰۰۳	۰/۰۰۲	ماهیچه

سنگین ضروری مانند مس و روی، بیشتر از فلزات سنگین غیرضروری کادمیوم، سرب و کروم بوده است. میانگین غلظت فلزات مس و روی در کپور معمولی بیشتر از شیرماهی و آمور بود، در مقابل، میانگین غلظت فلزات کادمیوم، سرب و کروم بیشتر از کپور معمولی به دست آمد. در کل می‌توان بیان کرد که میانگین غلظت فلزات مذکور در سه گونه متفاوت بود، اما این مقدار تفاوت غلظت فلزات، اختلاف معنی‌داری در سه گونه نداشته است ( $p > 0.05$ ). موسوی-ندوشن و همکاران (۲۳) در طی تحقیقی بیان کردند که اختلاف معنی‌داری بین میزان تجمع فلز سرب و کادمیوم در بافت‌های ماهیچه و آبشش ماهی شیربنت رودخانه دز وجود دارد، ولیکن این مقادیر کمتر از میزان استاندارد سازمان جهانی بهداشت بوده است. در طی مطالعه‌ای مشابه، اردکانی و جعفری (۱۱) میانگین غلظت فلزات سرب، کادمیوم، مس و روی را در بافت ماهیچه ماهی کپور به ترتیب برابر با ۴۸، ۵۴ و ۴۲ میکروگرم بر گرم گزارش کردند و این مقادیر در مقایسه با استانداردهای سازمان‌های خواروبار و کشاورزی ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت کمتر از حد مجاز بوده است. بررسی شاخص خطر (HQ)، حد مجاز مصرف روزانه آبزی (CR) و میزان جذب روزانه و هفتگی قابل قبول فلزات (DI) تخمینی از مقدار ارزیابی خطر بالقوه آبزیان آلوده به فلزات سنگین یا آلاندنه‌ای است که می‌تواند در طی دوره زندگی، بدون ایجاد خطر در بدن مصرف کننده جذب گردد. سازمان حفاظت محیط زیست امریکا در رابطه با حد مجاز میزان ورود روزانه فلزات کادمیوم، سرب، مس و روی ناشی از مصرف ماهی به ترتیب استاندارد ۱، ۲۵، ۴۰ و ۳۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم وزن

متوجه غلظت فلزات اندازه‌گیری شده در بافت‌های مختلف این ماهیان در جدول شماره ۳ ارائه شده است، این نتایج نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین تجمع فلزات سنگین در بافت‌های سه گونه ماهی وجود ندارد ( $p > 0.05$ ).

جدول شماره ۲: نتایج ارزیابی ریسک مصرف ماهیان کپور معمولی، شیرماهی و آمور رودخانه قره سو استان کرمانشاه

HQ	DI براساس نرخ مصرف محاسبه شده (میکروگرم)	CR (گرم)	ماهی	کپور معمولی
				کپور معمولی
۰/۰۰۷	۱۰/۵	۴۰/۶	روی	
۰/۰۱۴	۱۰/۸	۲/۶	مس	
۰/۰۲	۲/۸	۱/۵	کروم	
۰/۰۰۰۶	۰/۰۲	۷۰۰	کادمیوم	
۰/۰۰۰۶	۰/۳۲	۴۳/۷	سرب	
			شیرماهی	
۰/۰۰۰۷	۱۰/۴	۴۱/۱	روی	
۰/۰۰۷۲	۶/۹	۴/۱	مس	
۰/۰۲۱	۳/۱	۱/۴	کروم	
۰/۰۰۰۵	۰/۰۲	۷۰۰	کادمیوم	
۰/۰۰۰۳	۰/۳۲	۸۷/۵	سرب	
			آمور	
۰/۰۰۱۸	۱۱/۱	۳۸/۷	روی	
۰/۰۰۹۶	۹/۱	۳/۱	مس	
۰/۰۲۶	۳/۸	۱/۱	کروم	
۰/۰۰۰۳	۰/۰۱۴	۱۰۰	کادمیوم	
۰/۰۰۰۱۲	۰/۰۶۱	۲۳۳/۳	سرب	

## بحث

پژوهش‌های متعددی نشان داده است که تجمع‌زیستی فلزات سنگین در بافت‌های مختلف ماهیان متفاوت می‌باشد، به طوری که در بیشتر تحقیقات، میانگین غلظت فلزات ضروری نظیر مس و روی بیشتر از فلزاتی نظیر کادمیوم و سرب می‌باشد (۱۷، ۲۱، ۲۰). این تفاوت‌ها به عوامل مختلفی نظیر طول و وزن ماهی، فصل صید، رژیم غذایی، جنسیت و وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب بستگی دارد (۲۲، ۸). در این مطالعه نیز غلظت فلزات

جدول شماره ۳: آنالیز واریانس یکطرفه فلزات در بافت‌های سه گونه ماهی، شیرماهی و آمور در رودخانه قره سو

روی		مس		کروم		سرب		کادمیوم		فلز‌سنگین	
p value	F value	p value	ماهی								
۰/۰۲	NS	۰/۳۸	NS	۰/۸۳	NS	۰/۹۵	NS	۰/۰۵	NS	کپور معمولی	
۰/۸۵	NS	۰/۴۱	NS	۰/۵۱	NS	۰/۰۶	NS	۰/۱۸	NS	شیرماهی	
۰/۰۶	NS	۰/۵۵	NS	۰/۸۸	NS	۰/۲۵	<۰/۰۵	۰/۰۵	NS	آمور	

p significance level, NS= not significant

گرم بوده است که از استانداردهای سازمان هایی نظری سازمان جهانی بهداشت (کادمیوم ۰/۲، مس ۱۰ و روی ۱۰۰ میکرو گرم بر گرم) و انجمن تحقیقات پزشکی و بهداشت ملی استرالیا (کادمیوم ۰/۵، سرب ۱/۵، مس ۱۰ و روی ۱۵۰ میکرو گرم بر گرم) و وزارت کشاورزی، شیلات و غذاي انگلستان (کادمیوم ۰/۲، سرب ۲، مس ۲۰ و روی ۵۰ میکرو گرم بر گرم) کمتر می باشد (۲۸). همچنین میانگین غلظت فلزات سنگین اندازه گیری شده در این پژوهش در مقایسه با نتایج حاصل از بررسی های انجام شده توسط امینی رنجبر و ستوده (۲۸) با عنوان تجمع فلزات سنگین در بافت ماهیچه ماهی کفال طلای دریای خزر، منصوری و همکاران (۲۹) بر روی بافت ماهیچه سیاه ماهی قنات های شرق کشور و برآمکی و همکاران (۱) بر روی بافت ماهیچه ماهیان کپور تالاب انزلی کمتر بوده است. براساس یافته های این پژوهش، بافت ماهیچه در مقایسه با دیگر بافت های ماهیان، کمترین میزان تجمع زیستی فلزات سنگین را داشته است. به طور کلی میزان تجمع فلزات در بافت ماهیچه، به دلیل پایین بودن فعالیت های متابولیکی نسبت به کبد و آبشن، کمتر می باشد؛ در نتیجه غلظت کمتری از فلزات سنگین در این بافت تجمع می یابد (۱). ضمناً با توجه به شاخص ریسک مصرف ماهیان برای تمامی فلزات سنگین (کمتر از ۱)، به نظر می رسد مصرف ماهیان مذکور برای مصرف کنندگان مشکل بهداشتی به همراه نداشته باشد.

### سپاسگزاری

این تحقیق با استفاده از حمایت مالی شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه با کد KRSE-92089 و کد ملی ۷۵۹۷-۱۲۸۶۰ انجام شده است. نگارندهان مراتب تقدير و تشکر خود را از کميته تحقیقات اين شرکت اعلام می دارند.

### References

- Baramaki Yazdi R, Ebrahimpour M, Mansouri B, Rezaei MR, Babaei H. Contamination of

بدن در روز را اعلام کرده است (۲۴). بنابراین مقایسه نتایج این مطالعه (جدول شماره ۲) با استاندارد مذکور گویای این واقعیت است که تمامی نتایج به دست آمده، کمتر از حد مجاز تعیین شده می باشد. همچنین شاخص خطر به دست آمده از این پژوهش، کمتر از ۱ به دست آمده است. از این رو می توان نتیجه گیری کرد که میزان ورود فلزات سنگین ناشی از مصرف این سه گونه ماهی صید شده در رودخانه قره سو خطر حادی برای سلامت مصرف کنندگان در برخواهد داشت. در طی تحقیقی، نصراله زاده و همکاران (۲۵) میزان ریسک غذایی فلزات کادمیوم، سرب، روی و مس را در ماهی کپور دریایی مازندران کمتر از حداقل میزان قابل قبول مجاز گزارش کردند، در حالی که غلظت فلز جیوه را بیشتر از حد مجاز سازمان جهانی بهداشت اعلام کردند، و در ادامه نیز میزان شاخص خطر (HQ) را کمتر از ۱ گزارش نمودند. در مطالعه دیگری، چراغی و همکاران (۲۶) میزان HQ برای فلز کادمیوم در بافت ماهی شیربت را کمتر از ۱ محاسبه کردند و بیان داشتند که مصرف ماهی مذکور خطر حاد بهداشتی برای سلامتی مصرف کنندگان در پی نخواهد داشت. همچنین مشرووفه و همکاران (۲۷) گزارش کردند که با توجه به پایین بودن غلظت فلزات سنگین کادمیوم و روی در بافت ماهیچه دو گونه ماهی ازون برون و فیل ماهی مربوط به حوضه جنوبی دریای خزر نسبت به استانداردهای سازمان جهانی بهداشت و سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحده، مصرف ماهیچه این ماهیان خطر جدی برای سلامتی مصرف کنندگان نخواهد داشت. در این پژوهش، بافت ماهیچه به دلیل نقش مهم در تغذیه انسان و لزوم اطمینان از سلامت آن مورد بررسی قرار گرفته است. میانگین غلظت فلزات کادمیوم، سرب، مس و روی اندازه گیری شده در این مطالعه به ترتیب برابر با ۰/۰۰۱، ۰/۰۰۵، ۰/۰۰۴ و ۰/۰۵ میکرو گرم بر

metals in tissues of *Ctenopharyngodon idella* and *Perca fluviatilis*, from Anzali Wetland,

- Iran. Bull Environ Contam Toxicol 2012; 89(4): 831-835.
2. Majnoni F, Mansouri B, Rezaei MR, Hamidian AH. Contaminations of metals in tissues of Common crap, *Cyprinus carpio* and Silver crap, *Hypophthalmichthys molitrix* from Zarivar wetland, western Iran. Archives of Polish Fisheries 2013; 21(1): 11-18.
  3. Ebrahimi R, Maleki A, Shahmoradi B, Daraei H, Mahvi AH, Barati AH, Eslami A. Elimination of arsenic contamination from water using chemically modified wheat straw. Desalination and Water Treatment 2013; 51 (10-12): 2306-2316.
  4. Mansouri B, Babaei H, Hoshayari E, Khodaparast SH. Assessment of trace-metal concentrations in western reef heron (*Egretta gularis*) and Siberian gull (*Larus heuglini*) from southern Iran. Arch Environ Contam Toxicol 2012; 63(2): 280-287.
  5. Mansouri B, Pourkhabbaz A, Ebrahimpour M, Babaei H. Bioaccumulation and elimination rate of cobalt in *Capoeta fusca* under controlled conditions. Chemical Speciation Bioavailability 2013; 25(1): 52-56.
  6. Zazouli MA, Mohseni Bandpei A, Maleki A, Saberan M, Izanloo H. Determination of cadmium and lead contents in black tea and tea liquor from Iran. Asian Journal of Chemistry 2010; 22(2): 1387-1393.
  7. Zazouli MA, Mohseni Bandpei A, Ebrahimi M, Izanloo H. Investigation of cadmium and lead contents in Iranian rice cultivated in Babol region. Asian Journal of Chemistry 2010; 22(2): 1369-1376.
  8. Hassanpour M, Rajaei G, SinkaKarimi M, Ferdosian F, Maghsoudloorad R. Determination of heavy metals (Pb, Cd, Zn and Cu) in Caspian kutum (*Rutilus frisii kutum*) from Miankaleh International Wetland and human health risk. J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24(113): 163-170.
  9. Mansour SA, Sidky MM. Heavy metals contaminating water and fish from Fayoum Governorate, Egypt. Food Chem 2002; 78(1): 15-22.
  10. Rashed MN. Monitoring of environmental heavy metals in fish from Nasser Lake. Environ Int 2001; 27(1): 27-33.
  11. Sobhanardakani S, Jafari SM. Investigation of As, Hg, Zn, Pb, Cd and Cu concentrations in muscle tissue of *Cyprinus carpio*. J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24(116): 184-195 (Persian).
  12. Van Geast J. Bioaccumulation of sediment-associated contaminants in freshwater organism: development and standardization of a laboratory method, PhD thesis, University of Guelph, Canada, 2010:1-232.
  13. Zhang Z, He L, Li J, Wu Z. Analaysis of heavy metals of muscle and intestine tissue in fish- in Banan section of chongqing from three Gorges reservoir, China. Polish J Environ Stud 2007; 16(6): 949-958.
  14. Solgi E. Estimation of Daily Intake and Potential Risk of Cadmium and Lead in Consumers of Liza salines in the Eastern Coast of the Caspian Sea. J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 25(122): 382-388 (Persian).
  15. Ebrahimi Sirizi Z, Sakizadeh M, Esmaili Sari A, Bahramifar N, Ghasempouri SM, Abbasi K. Survey of Heavy Metals (Cd, Pb, Cu and Zn) Contamination in Muscle tissue of *Esox lucius* from Anzali International Wetland: Accumulation and Risk Assessment. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 22(87): 57-63 (Persian).
  16. Ariayee M, Azadi N, Majnoni F, Mansouri B. Comparison of metal concentrations in organs of two fish species from the Zabol

- Chahnameh reservoirs, Iran. Bull Environ Contamin Toxicol 2015; 94(6): 715-721.
17. Mansouri B, Majnoni F, Maleki A, Azadi N, Rezaei Z. Health risk assessment of trace elements in two fish species from the Sanandaj Gheshlagh Reservoir, Iran. Toxicology and Environtal Health Sciences 2015; 7(1): 43-49.
  18. Cheraghi M, Pourkhabbaz H, Javanmardi S. Determination of Mercury Concentration in Liza abu from Karoon River. J Mazandaran Univ Med Sci 2013; 23(103): 105-113 (Persian).
  19. Raissy M, Ansari M. Health risk assessment of mercury and arsenic associated with consumption of fish from the Persian Gulf. Environ Monit Assess 2014; 186(2): 1235-1240.
  20. Canli M, Atli G. The relationships between heavy metal (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn) levels and the size of six Mediterranean fish species. Environ Pollut 2003; 121(1): 129-136.
  21. Mortazavi MS, Sharifian S. Mercury bioaccumulation in some commercially valuable marine organisms from Mosa Bay, Persian Gulf. Inter J Environ Res 2001; 5(3): 757-762.
  22. Mansouri B, Baramaki R. Influence of water hardness and pH on acute toxicity of Hg on fresh water fish *Capoeta fusca*. World Journal of Fish and Marine Sciences 2011; 3(2): 132-136.
  23. Musavi-Nadushan R, Salimi L, Zaheri-Abdehvand L. Determining the concentrations of nickel, lead and cadmium in *Barbus grypus* of Dez River, Iran. J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 23(110): 232-236 (Persian).
  24. United States Environmental Protection Agency (USEPA). Guidance for assessing chemical contaminant data for use in fish advisories. Volume 2. Risk assessment and fish consumption limits; 3<sup>rd</sup> Ed. Washington DC (EPA). 2000.
  25. Nasrollahzadeh Saravi H, Pourgholam R, Pourang N, Rezaei M, Makhloogh A, Unesipour H. Heavy Metal Concentrations in Edible Tissue of *Cyprinus Carpio* and Its Target Hazard Quotients in the Southern Iranian Caspian Sea Coast, (2010). J Mazandaran Univ Med Sci 2013; 23(103): 34-45 (Persian).
  26. Cheraghi M, Espergham A, Nprani MH. Health risk assessment of cadmium in consumption of *Barbus grypus* in Arvand River. Journal of Wetland Ecobiology 2012; 13(13): 1-8 (Persian).
  27. Mashroofeh A, Riyahi Bakhtiari A, Pourkazemi M. Evaluation of Cadmium, Vanadium, Nickel and Zink Concentrations in Different Tissues of Beluga and Stellate Sturgeon and Risk Assessment Regarding Consuming Their Muscle Tissue in South Caspian Sea. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 22(96): 89-96 (Persian).
  28. Amini Ranjbar Gh, Sotoudehnia F. Investigation of heavy metals accumulation in muscle tissue of *Mugil auratus* in relation to standard enghth, weight, age and sex. Iranian scientific fisheries Journal 2005; 14(1):1-18 (Persian).
  29. Mansouri B, Ebrahimpour M, Babaei H. Determine of heavy metals in different tissues of black fish (*Capoeta fusca*) in central part qanats of Birjand. Veterinary Journal (Pajouhesh-VA-Sazandegi) 2011; 24(4) (89): 45-52 (Persian).