

ORIGINAL ARTICLE

Anti-diabetic Effect of Methanol Extract of *Trametes versicolor* on Male Mice

Mohammad Shokrzadeh¹,
 Sadaf Azdo²,
 Mohammad Amirahmadi²,
 Emran Habibi³

¹ Associate Professor, Department of Toxicology and Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

² Doctorate of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Ramsar International Unit, Mazandaran University of Medical Sciences, Ramsar, Iran

³ Assistant Professor, Department of Pharmacognosy and Biotechnology, Pharmaceutical Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

(Received September 24, 2016 ; Accepted December 24, 2016)

Abstract

Background and purpose: Diabetes mellitus is a metabolic disorder caused by deficiency of insulin secretion (type I) or dysfunction of insulin (Type II). Investigating the efficacy of natural compounds in treatment of various diseases such as diabetes could be so useful. So, we studied the anti-diabetic effects of methanol extract of *Trametes versicolor* on male mice.

Materials and methods: *T. versicolor* was collected from jungles of Neka (Mazandaran, Iran) and extracted with methanol. Thirty male mice were randomly divided into 6 groups ($n=5$ per group) as following: group I: nondiabetic (normal), group II, III, and IV were diabetic groups that received *T. versicolor* extract at 500, 1000, and 1500 mg/kg. Group V and VI were also diabetic groups that received 6 U/Kg insulin (Biphasic Isophane) and 0.9% normal saline, respectively. Diabetes was induced by intraperitoneal administration of streptozotocin (50 mg/kg body weight). Blood samples were taken 24 hr after the last injection. After centrifugation, the serum was isolated for measuring the levels of glucose, ALT, AST, ALP, cholesterol, triglycerides, BUN, creatinine, and HDL. Homogenized liver tissue (0.1 g) were also prepared for histological examination.

Results: Compared with the control group, significant reductions were seen in serum glucose, triglycerides and ALT levels in treatment groups receiving the methanolic extract of *T. versicolor* ($P<0.05$). Moreover, pathology studies showed lower destruction of liver tissue in these groups.

Conclusion: The results showed that the methanol extract of *T. versicolor* might be effective in prevention of diabetes and have a protective effect on liver tissue.

Keywords: *Trametes versicolor*, diabetes, mice, liver, streptozotocin

J Mazandaran Univ Med Sci 2017; 26(145): 165-175 (Persian).

ارزیابی اثر ضد دیابتی عصاره مтанولی قارچ ترامتس ورسیکالر بر روی موش سوری نر

محمد شکرزاده^۱

صف آزادو^۲

محمد امیر احمدی^۲

عمران حبیبی^۳

چکیده

سابقه و هدف: دیابت از بیماری‌های متابولیکی غدد درون ریز است که با فقدان انسولین (نوع ۱) یا نقص عملکرد انسولین (نوع ۲) مشخص می‌شود. بررسی اثر بخشی ترکیبات طبیعی در درمان بیماری‌های مختلف از جمله دیابت از اهمیت زیادی برخوردار است لذا، در این مطالعه اثر ضد دیابتی عصاره مтанولی قارچ ترامتس ورسیکالر بر روی موش سوری بررسی شد.

مواد و روش‌ها: قارچ از جنگل اطراف نکاء (مازندران) جمع آوری و با متانول عصاره گیری شد. ۳۰ موش سوری نر به طور تصادفی به ۶ گروه ۵ تایی تقسیم شدند. گروه ۱: غیر دیابتی (نرمال)، گروه‌های ۲، ۳ و ۴ دیابتی به ترتیب عصاره مтанولی قارچ با دوز ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، گروه ۵: دیابتی + انسولین (ایزوافان) به میزان ۶ واحد بر کیلوگرم و گروه ۶: دیابتی + حلال عصاره (نرمال سالین ۰/۹ درصد) می‌باشند. برای ایجاد دیابت از استرپتوزوسین با دوز ۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده شد و تزریقات به صورت درون صفاقی انجام گرفت. ۲۴ ساعت پس از آخرین تزریق، خونگیری انجام و پس از ساتر فیوژ، سرم جهت سنجش میزان گلوكز، ALT، AST، ALP، کلسترول، تری گلیسرید، BUN، کراتینین و HDL جدا شده و ۰/۱ گرم بافت کبدی نیز جهت مطالعه هیستوپاتولوژی هموژئزه گردید.

یافته‌ها: نتایج حاکی از کاهش معنی دار میزان گلوكز، تری گلیسرید و آنزیم ALT در گروه‌های تیمار شده با عصاره مтанولی قارچ ترامتس ورسیکالر نسبت به گروه شاهد دیابتیک دریافت کننده حلال حامل عصاره می‌باشد ($p < 0.05$). در مطالعات پاتولوژی مشاهده شد که تخریب در بافت کبد در گروه‌های دریافت کننده عصاره نسبت به گروه شاهد کمتر بوده است.

استنتاج: با توجه به یافته‌های حاصل، عصاره مтанولی قارچ ترامتس ورسیکالر ممکن است در درمان و پیشگیری از دیابت و محافظت کبدی در فاز بالینی داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: ترامتس ورسیکالر، دیابت، موش سوری، کبد، استرپتوزوسین

مقدمه

شیوع آن به طور چشمگیری در سراسر جهان در حال افزایش می‌باشد. مانند هیر گلیسمی، پراداری، پرنوشی، کاهش وزن، تاخیر در التیام زخم‌ها، تاری دید، افزایش

افزایش میزان قندخون به علت نقص عملکرد انسولین یا عدم ترشح آن سبب بروز مهم ترین بیماری متابولیکی غده درون ریز بدن به نام دیابت می‌گردد که

- مولف مسئول: عمران حبیبی - ساری: جاده دریا، مجتمع پیامبر اعظم(ص) دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده داروسازی دانشیار، گروه سم شناسی داروشناسی، دانشکده دارو سازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
۱. دانشیار، گروه سم شناسی داروشناسی، دانشکده دارو سازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 ۲. دکترای حرفه ای، دانشکده دارو سازی، واحد پردازی خود گردان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، رامسر، ایران
 ۳. استادیار، گروه فارماکوگنوژی و بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشکده دارو سازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
- تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۷/۱۲ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۵/۷/۱۲ تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۱۰/۴

میزان قند خون حیوانات دیابتی شده را کاهش می‌دهند. عصاره آبی حاصل از قارچ *Ganoderma lucidum* متعلق به خانواده پلی پوراسه از دسته بازیدیومیست‌ها، میزان قند خون موش‌های دیابتی شده با استفاده از استرپتوزوین و آلوكسان را به میزان قابل توجهی کاهش داده است (۱۱، ۱۲). هم‌چنین عصاره‌های آبی و متابولی قارچ‌های دیگر متعلق به دسته بازیدیومیست‌ها نظیر *Calvatia cyathiformis*, *Lentinus lepideus* و *Ganoderma appplanatum*, اثر ضد دیابتی معنی‌داری بر روی موش‌های دیابتی شده با آلوكسان داشته‌اند (۱۳). در پژوهشی که از اگریوپلیمرهای حاصل از گونه‌های مختلف قارچی جهت سنجش میزان کاهش قند خون موش‌ها استفاده شد، تنها بیوپلیمر قارچ ترامیس ورسیکالر، بیشترین اثر را در کاهش میزان گلوکز خون داشته است (۱۴). عده‌ای از محققین با توانایی جداسازی و خالص‌سازی پلی ساکارید خارج سلولی EPS-F4-1 حاصل از قارچ ترامیس ورسیکالر متوجه اثر مهاری این پلی ساکارید روی آنزیم آلفا گلوکوزیداز شده‌اند (۱۵). از آنجایی که تاکنون اثرات ضد دیابتی عصاره متابولی قارچ ترامیس ورسیکالر بررسی نشده، لذا در تحقیق حاضر اثر ضد دیابتی عصاره متابولی قارچ مذکور با نگرش بیوشیمیایی و پاتولوژی روی موش‌های سوری نر مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها

گلوتاتیون استاندارد، دی‌تیوبیس نیتروبنزوئیک اسید (DTNB)، بافتریس (تری کلرواستیک اسید EDTA، PH=۸/۹) (اتیلن دی آمین ترا استیک اسید) از شرکت مرک، اتانول از شرکت نور زکریای رازی و نرمال سالین از شرکت داروسازی ثامن خردباری شد. قرائت میزان جذب توسط دستگاه اسپکتوفوتومتر Shimadzu mini 1240 ساخت ژاپن و عملیات سانتریفیوژ به کمک دستگاه Hettich universal ساخت آلمان انجام شد.

گلوکز در ادرار و برخی علائم دیگر مشخص می‌شود و در صورت عدم درمان مناسب ممکن است آسیب‌های قلبی، عروقی، عصبی، کلیوی و نوروپاتی در بیمار بروز نماید. از جمله اقدامات مهم کنترل دیابت تغییر در سبک زندگی مانند رژیم غذایی صحیح و ورزش به همراه استفاده از داروها می‌باشد (۱، ۲). آزمایشات خونی متعددی جهت بررسی تعیین عملکرد کبد انجام می‌شود که در آن‌ها میزان سرمی آنزیم‌های مهم کبدی اندازه‌گیری می‌گردد. از جمله مهم رین این آنزیم‌ها آلانین آمینو ترنسفراز (ALT)، آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP) می‌باشد که به عنوان شاخص‌های آسیب بافت کبدی می‌باشند و در دیابت تیپ ۲ میزان آن‌ها افزایش پیدا می‌کند (۳، ۴). استرس اکسیداتیو نقش بسیار مهمی در تعیین پاتوژن بیماری دیابت تیپ ۲ دارد که به دنبال آن میزان کلسترول خون افزایش می‌یابد. تعیین سطح سرمی گلوتاتیون احیا (GSH) میزان استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت را به خوبی نشان می‌دهد (۵). بررسی ترکیبات طبیعی در درمان بیماری‌های مختلف از جمله دیابت از اهمیت زیادی برخوردار است. قارچ ترامیس ورسیکالر که کوریولوس ورسیکالر نیز نامیده می‌شود، متعلق به خانواده Polyporaceae، راسته Polyporales و از دسته بازیدیومیست (Macrofungi) می‌باشد. این قارچ در چین مشهور به یون ژی (قارچ ابری) می‌باشد و به طور گسترده در جنگل‌های معتدل در نیمکره شمالی زمین پراکندگی دارد که به عنوان ساپروفتیت روی تنه درختان پوسیده رشد می‌کند (۶-۸). قارچ‌های دارویی بسیاری به طور سنتی جهت درمان بیماری‌های گوناگونی استفاده می‌شود و اثرات درمانی آن‌ها بر دیابت، سرطان، کلسترول و فشار خون، کبد، التهاب و عوامل میکروبی مورد مطالعه قرار گرفته است (۹). علاوه بر آن نقش مهمی در تنظیم کنندگی سیستم ایمنی را بر عهده دارند (۱۰). آزمایش‌های متعدد انجام گرفته روی عصاره‌ها و ترکیبات خالص حاصل از گونه‌های متعدد بازیدیومیست‌ها نشان می‌دهد که این قارچ‌ها

قارچ ترامتس و رسیکالر در ماه آبان از جنگل های شهرستان نکا روستای چلمردی استان مازندران در ارتفاع ۵۰۰ متری از سطح دریا جمع آوری گردید. سپس نام علمی آن توسط آقای مهندس سعید علی موسی زاده کارشناس ارشد علوم گیاهی عضو مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی مازندران مربوطه تایید شد. جهت از بین رفتن حشرات موذی، چوب خوار و کپک ها، نمونه قارچ به مدت ۷۲ ساعت در فریزر -۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری شد. نمونه قارچ پس از تمیز شدن و خشک شدن در سایه و دمای اتاق با استفاده از آسیاب برقی در اندازه مناسب پودر گردید (نمونه قارچی در یخچال برای طولانی مدت قابل نگهداری می باشد). دو کیلو گرم از قارچ پودر شده با متابول مطلق به روش خیساندن چند باره (۳ بار و هر بار حداقل ۷۲ ساعت) عصاره گیری شد. عصاره حاصله با استفاده از دستگاه روتاری تحت شرایط خلاء تغليظ گردید و در دستگاه فریز درایر به صورت پودر خشک تهیه شد. جهت انجام مطالعه حیوانی، ۳۰ مous سوری نر با سن ۴ تا ۵ هفته، در محدوده وزنی 20 ± 5 گرم به طور تصادفی به ۶ گروه (۵ تایی) تقسیم شدند. حیوانات در حیوان خانه دانشکده داروسازی رامسر تحت شرایط طبیعی تاریکی، غذا و آب قرار گرفتند و به مدت یک هفته به منظور عادت کردن به محیط جدید بدون هیچ گونه تزریق نگهداری شدند.

به موش ها استرپتوز توسین با دوز ۵۰ میلی گرم بر کیلو گرم (به جز گروه اول که به عنوان گروه نرمال در نظر گرفته شدند) داخل صفاقی تزریق شد. جهت اندازه گیری میزان قندخون ناشتا، خونگیری در روز چهارم انجام شد و میزان قندخون بالاتر از 11 mmol/L دیابتی شدن موش ها را تایید کرد (۱۶). گروه اول گروه غیر دیابتی (نرمال)، گروه دوم به عنوان گروه کنترل، با تزریق دوز معینی از انسولین (بایفارازیک ایزوافان) به میزان ۶ واحد بر کیلو گرم، گروه سوم تا پنجم با تزریق دوزهای مختلفی از عصاره متابولی ترامتس و رسیکالر (۱۰۰۰، 500 ، 100)

۱۵۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم) و گروه ششم به عنوان گروه شاهد، با تزریق حامل عصاره (نرمال سالین 0.9 درصد آماده شدند (مدت تیمار با عصاره ۲۱ روز بوده است) (۱۷). با رعایت اصول اخلاقی، ۲۴ ساعت پس از آخرین تزریق، موش ها کاملا بی هوش شدند و مورد جراحی قرار گرفتند. بلافاصله پس از شکافتن شکم و سینه حیوان، 2 الی $1/5$ میلی لیتر خون با سرنگ انسولین (هپارینه شده) از قلب حیوان اخذ و سپس به مدت ۳۰ دقیقه در محیط آزمایشگاه گذاشته شده تا انکوبه شود و پس از سانترفیوژ کردن به مدت ۱۵ دقیقه در دمای 4 درجه سانتی گراد، حدود 1 میلی لیتر سرم از آن ها جدا شد و از کیت شرکت Elitek جهت اندازه گیری میزان آنزیمهای ALT,AST,ALP استفاده و از روش UV Test آنزیمهای ALT,AST استفاده آوردن مقادیر آنزیمهای ALT,AST استفاده گردید. همچنین برای اندازه گیری آنزیم آalkalan فسفاتاز از آزمون فتو متري کينتیك استفاده شد (۱۸). جهت اندازه گیری گلوکز از روش گلوکز اکسیداز، BUN از روش بر تلول، کراتینین از روش رنگ سنجی (روش ژافه) (۱۹)، میزان کلسترول و تری گلیسیرید سرمی با استفاده از کیت شرکت درمان کاو (ایران) از طریق روش رنگ سنجی تعیین گردید و میزان HDL کلسترول با روش رسوبی اندازه گیری شد (۲۰،۲۱). بلافاصله پس از خون گیری، $1/10$ گرم از بفت کبد حیوان برای اندازه گیری گلوتاتیون خارج و به وسیله سرم فیزیولوژی شستشو داده شد و در فرمالین 10 درصد برای ثبت بافت و انجام مطالعات هیستوپاتولوژیک قرار گرفت. در مرحله بعد از بافت های آبگیری شده، برش هایی تهیه و به روش هماتو کسیلین- انسوزین رنگ آمیزی گردید (۲۲). برداشت نمونه کبدی جهت اندازه گیری سطح گلوتاتیون احیا به روش المان انجام شد. بدین منظور $1/10$ گرم از کبد موش را به لوله هموژنایزر منتقل، 1 میلی لیتر EDTA به آن افزوده و چند بار عمل هموژن کردن صورت گرفت تا مخلوط یکنواختی به دست آید. سپس محتويات آن به لوله

گروه شاهد با عصاره مтанولی ۱۰۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم وجود دارد. اندازه گیری میزان کلسترول و تری گلیسرید حاکی از آن است که کمترین میزان آنها مربوط به موش‌های گروه نرمال به ترتیب برابر با $۶۰/۶۷ \pm ۲۸/۴۵$ و $۹۱/۳۳ \pm ۳/۵۲$ میلی مول بر لیتر و بیشترین میزان آنها مربوط به گروه شاهد به ترتیب برابر با $۱۲۲/۰۰ \pm ۲/۶۴$ و $۱۳۰/۰۰ \pm ۲/۰۰$ میلی مول بر لیتر می‌باشد. آنالیز آماری نیاز اختلاف معنی‌داری را ($p < 0.05$) در میزان کلسترول و تری گلیسرید بین گروه‌های دیابتی حامل عصاره با گروه دیابتی+عصاره مтанولی $۱۵۰۰, ۱۰۰۰$ میلی گرم بر کیلو گرم نشان می‌دهد. همچنین این اختلاف معنی‌دار بین گروه‌های دیابتی+حامل عصاره با گروه دیابتی+انسولین نیز ($p < 0.05$) وجود دارد. کمترین میزان HDL نیز متعلق به گروه دیابتی+انسولین $۲۳/۶۷ \pm ۳/۰۵$ میلی مول بر لیتر و بیشترین مربوط به گروه دیابتی+حامل عصاره $۳۵/۳۳ \pm ۴/۰۴$ میلی مول بر لیتر می‌باشد. از لحاظ آماری اختلاف معناداری ($p < 0.05$) بین گروه‌های دیابتی+حامل عصاره با گروه دیابتی+عصاره مтанولی $۵, ۰۰۰$ و $۱۵۰۰, ۱۰۰۰$ میلی گرم بر کیلو گرم وجود دارد که این اختلاف معنی‌دار بین گروه‌های دیابتی+حامل عصاره با گروه دیابتی+انسولین نیز ($p < 0.05$) وجود دارد.


نتایج حاصل از تعیین میزان آنزیم‌های AST و ALT نشان می‌دهد که بیشترین میزان این آنزیم‌ها مربوط به گروه دیابتی حامل عصاره به ترتیب برابر با $۹۶/۰۰ \pm ۴/۵۸$ و $۸۳/۶۷ \pm ۸/۰۸$ واحد بر لیتر و کمترین میزان ALT مربوط به گروه دیابتی دریافت کننده عصاره مтанولی ۱۵۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم به میزان $۱۶/۱۶ \pm ۴/۱۶$ واحد بر لیتر و برای آنزیم AST کمترین میزان مربوط به گروه نرمال به میزان $۷۵/۳۳ \pm ۵/۵۰$ واحد بر لیتر می‌باشد. با توجه به آنالیز آماری صورت گرفته برای آنزیم ALT با توجه به آنالیز آماری صورت گرفته برای آنزیم دیابتی معنی‌داری ($p < 0.05$) بین گروه‌های شاهد با گروه دیابتی+عصاره مtanولی ۱۵۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم و در آنزیم AST اختلاف آماری معنی‌داری بین گروه شاهد با سایر گروه‌ها وجود ندارد (جدول شماره ۲).

سانتریفیوژ منتقل و $۰/۵$ میلی لیتر دیگر EDTA به آن اضافه شد. در مرحله بعد، به لوله سانتریفیوژ $۱/۵$ میلی لیتر TCA با خلوص ۱۰ درصد اضافه شد. سپس لوله‌ها در دور ۳۰۰۰ به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوژ و سپس یک میلی لیتر از محلول رویی به لوله سانتریفیوژ دیگر منتقل گردید و به آن $۲/۵$ میلی لیتر با فتریس $۰/۴$ مولار ($\text{PH}=۸/۹$) و $۰/۵$ میلی لیتر DTNB اضافه شد. لوله به آرامی تکان داده شد تا رنگ زرد یکنواختی در آن پدیدار گردد. در نهایت جذب محلول حاصل در طول موج ۴۲۱nm قرائت گردید. با مقایسه جذب حاصل با منحنی استاندارد، غلظت گلوتاتیون محاسبه و براساس میکرومول بر هر گرم وزن کبد ارائه شد (۲۳). پس از تجزیه و تحلیل آماری نتایج به صورت $\text{Mean} \pm \text{SD}$ ارائه شده است. برای بررسی نتایج بیوشیمیابی و بافت شناسی و مقایسه میانگین گروه‌های آزمایشی از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه (One-Way ANOVA) استفاده شد و $p < 0.05$ به عنوان سطح معنی‌داری تلقی گردید. تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش ۱۶ انجام پذیرفت.

یافته‌ها

مطابق جدول شماره ۱، کمترین میزان گلوكز متعلق به گروه نرمال $۱۶۲/۳۳ \pm ۱۷/۵$ میلی مول بر لیتر و بیشترین میزان مربوط به گروه دیابتی دریافت کننده حلال عصاره (شاهد) $۲۷۵/۳۳ \pm ۲۲/۱۴$ میلی مول بر لیتر می‌باشد. با توجه به آنالیز آماری صورت گرفته اختلاف معنی‌داری ($p < 0.05$) بین گروه‌های شاهد با گروه دیابتی+عصاره مtanولی $۱۰۰, ۵, ۰۰۰$ و ۱۵۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم وجود دارد. بیشترین مقدار گلوتاتیون مربوط به گروه دیابتی+انسولین به میزان $۰/۰۲ \pm ۰/۵۴$ میکرومول بر گرم و کمترین مربوط به گروه دیابتی+عصاره مtanولی ۱۰۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم به میزان $۰/۰۳ \pm ۰/۲۸$ میکرومول بر گرم می‌باشد. با توجه به آنالیز آماری صورت گرفته اختلاف معناداری ($p < 0.05$) بین

دريافت كننده انسولين ساختار لبولي فوكال بهم ريخته و گرفتگى متوسط سنترا وين دارييم در سينوزوئيدها ديلاته مختصر منتشر دиде شد. التهاب پورتال خفيف پراكنده و التهاب بين هپاتوسيتي مختصر پراكنده بود در لام نکروز تک هپاتوسيتي پراكنده دиде شد و آپوپتوز سلول هپاتوسيتي بسيار پراكنده وجود داشت و واکوئل دار شدن هستهها (دزناسيون) پديدار گشت (تصوير شماره ۱). در گروههای ديايتي دريافت كننده عصاره مтанولي ۱۵۰۰ و ۱۰۰۰ ميلي گرم بر کيلو گرم ساختار لبولي متوسط، التهاب متوسط و منتشر فضاي پورت، التهاب متوسط و پراكنده بين هپاتوسيت ها وجود داشته است و همچنان نکروز گروهي و تکي هپاتوسيتي، آپوپتوز تکي، سينوزوئيدها مختصر متراكم و هسته منتشر بزرگ شده و سلول ها فوكال هييدروپيك هم مشاهده شد (تصوير شماره ۲).



تصوير شماره ۱: سترال وين (قرمز)- سينوزوئيدها
ديلاته (سفید)- دزناسيون (زرد)

بيش ترين ميزان افزایش سطح آنزيم ALP نيز مربوط به گروه ديايتي+انسولين ۵۸/۶۷±۳/۵۱ واحد بر ليتر و کم ترين ميزان مربوط به گروه گروه نرمال به ميزان ۴۹/۳۳±۱/۵۲ واحد بر ليتر بدون وجود اختلاف آماري معنی دار بين گروههای شاهد با سایر گروههای می باشد. کراتينين و BUN در گروه ديايتي+انسولين بالاترین ميزان به ترتيب برابر با ۵۶/۰۰±۷/۰۰ و ۵۶/۰۰±۵/۱۳ ميلي گرم بر دسي ليتر می باشد و کم ترين ميزان کراتينين متعلق به گروه نرمال ۴۰/۰۰±۱/۰۰ ميلي گرم بر دسي ليتر با اختلاف معنی داری ($p < 0.05$) بين گروههای ديايتي+حاملي عصاره با گروه ديايتي+عصاره مtanولي ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ ميلي گرم بر کيلو گرم می باشد. همچنان اين اختلاف معنی دار بين گروههای نرمال با گروه ديايتي+انسولين نيز ($p < 0.05$) نيز وجود دارد. پايان ترين ميزان BUN نيز مربوط به گروه ديايتي+عصاره مtanولي ۱۵۰۰ ميلي گرم بر کيلو گرم به مقدار ۴۳/۰۰±۴/۳۶ ميلي گرم بر دسي ليتر می باشد و اختلاف معنی داری ($p < 0.05$) بين گروههای ديايتي+حاملي عصاره با گروه ديايتي+عصاره مtanولي ۱۵۰۰، ۱۰۰۰ ميلي گرم بر کيلو گرم وجود دارد. همچنان اين اختلاف معنی دار بين گروههای ديايتي+حاملي عصاره با گروه ديايتي+انسولين نيز ($p < 0.05$) وجود دارد (جدول شماره ۲). در بافت كبد گروه ديايتي تيمار با عصاره قارچي تغييرات پاتولوژيک قابل توجهی مشاهده نشد. نتایج پاتولوژي نشان می دهد که در گروه ديايتي


جدول شماره ۱: ميانگين و انحراف معيار گلوتاتيون كيدی($\mu\text{mol/g}$) و گلوكر، كلسترون، تري گليسيريد و HDL بر حسب mg/dL در حيوان مورد مطالعه

گلوتاتيون	HDL	تري گليسيريد	كلسترون	گلوكر	گروه ها
۰/۴۸±۰/۰۱	۲۵/۵۹±۲/۰۸	۹۱/۳۳±۲/۵۲	۶۰/۵۷±۲/۴۵	۱۶۲/۲۳±۱۷/۵۰	نرمال
۰/۵۴±۰/۰۲	۳۵/۳۳±۴/۴	۱۳۰±۲/۲	۱۲۲±۲/۶۴	۲۷۵/۳۳±۲۲/۱۴	ديايتی+حاملي عصاره
۰/۵۴±۰/۰۲	۳۰/۴۷±۹/۳	۱۱۲/۶۹±۲/۰۸	۱۱۹/۶۷±۲/۱	۲۳۶/۶۷±۸/۵	ديايتی+عصاره مtanولي ۵۰۰ ميلي گرم بر کيلو گرم
۰/۲۸±۰/۰۳	۳۰/۳۳±۰/۵۷	۱۱۸/۶۷±۱/۰۵	۱۰۹/۶۷±۱/۵۳	۲۱۸/۳۳±۱۰/۰۲	ديايتی+عصاره مtanولي ۱۰۰ ميلي گرم بر کيلو گرم
۰/۵۳±۰/۰۷	۲۶/۳۳±۰/۰۴	۱۱۳/۳۳±۴/۷۲	۱۰۹/۶۷±۹/۲۴	۱۹۴/۳۳±۹/۲۳	ديايتی+عصاره مtanولي ۱۵۰۰ ميلي گرم بر کيلو گرم
۰/۵۴±۰/۰۲	۲۲/۶۷±۳/۰۵	۱۰۷±۲/۶۴	۱۰۰/۳۳±۵/۶۸	۱۷۷/۳۳±۷/۷۶	ديايتی+انسولين

جدول شماره ۲: ميانگين و انحراف آنزيم های ALP,ALT,AST mg/dL در حيوان مورد مطالعه

Cr	BUN	AST	ALT	ALP	گروه ها
۴۰±۱/۱	۴۵/۳۳±۱/۵۳	۷۵/۳۳±۵/۵	۸۵/۶۷±۶/۲	۴۹/۳۳±۱/۵۲	نرمال
۵۱/۶۷±۲/۵۱	۴۹/۶۷±۱/۵۳	۸۳/۶۷±۸/۰۸	۹۶±۴/۵۸	۵۳±۲/۱	ديايتی+حاملي عصاره
۴۴/۶۷±۳/۲۱	۴۸±۳/۶	۸۱/۶۷±۸/۰۲	۹۲±۲/۳	۵۷/۶۷±۵/۵	ديايتی+عصاره مtanولي ۵۰۰ ميلي گرم بر کيلو گرم
۴۳±۲/۱	۴۴/۳۳±۲/۰۸	۷۹/۶۷±۷/۵۷	۸۸/۳۳±۷/۰۵	۵۷/۳۳±۴/۷۲	ديايتی+عصاره مtanولي ۱۰۰۰ ميلي گرم بر کيلو گرم
۴/۵۸±۲/۷۸	۴۳/۴/۳۶	۸۲/۳۳±۲/۶۲	۸۰/۶۷±۴/۱۶	۵۳/۳۳±۲/۸۸	ديايتی+عصاره مtanولي ۱۵۰۰ ميلي گرم بر کيلو گرم
۵۶±۷/۳	۵۹/۳۳±۵/۱۳	۸۱/۶۷±۵/۰۵	۹۵±۶/۷	۵۸/۶۷±۳/۵۱	ديايتی+انسولين

گلوتاتیون اس-ترانسفراز در بافت‌هایی از موش که در معرض استرپتو佐سین بوده‌اند نسبت به گروه کنترل مشاهده می‌شود (۲۷). تحقیقات مختلف درباره بیماری دیابت نشان می‌دهد که القای دیابت با تزریق STZ سبب افزایش معنی‌دار در سطح سرمی گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، فاکتورهای کلیوی (اوره، اسید اوریک، کراتینین)، آنزیم‌های کبدی (ALT,AST,ALP) در موش‌های دیابتی نسبت به گروه نرمال می‌شود (۲۸). قارچ ترامتس ورسیکالر از انواع قارچ‌های دارویی است که از زمان‌های قدیم در چین به عنوان ترمیم کننده زخم و محافظت اینمی بدن در مقابل بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. این قارچ دارویی که به وفور در ایران نیز یافت می‌شود غنی از ماده‌ای از جنس پلی ساکارید-پپتید به نام PSP می‌باشد که کارایی آن در درمان سرطان به اثبات رسیده و به طور عملده مورد استفاده قرار می‌گیرد. هم‌چنین پلی ساکاریدی دیگر نیز از این قارچ قابل استخراج می‌باشد که به نام PSK (پلی ساکارید K) معروف است که یک آنتی اکسیدانت قوی بوده و رادیکال‌های آزاد را مهار می‌کند. تا به حال PSK از نظر بالینی موثرترین داروی سرطان‌های معده، مری، مقعد و ریه بوده است. ماده دیگر استخراج شده از قارچ، پلی ساکارید ورسیکالر یا VPS می‌باشد که اخیراً به صورت جامد به عنوان مکمل غذایی در ایالات متحده مورد مطالعه قرار گرفته است. مکانیزم مولکولی دقیق عمل PSK و PSP هنوز کشف نشده است. با اینحال این ترکیبات بیشتر از طریق پیشرفت سیستم اینمی می‌زبان عمل می‌کند و حضور ترکیبات دیگری از جمله تری‌لینولین، ارگوسترون پراکساید، مشتق‌های ارگوستا، سرامیدی و فنولیک در این قارچ گزارش شده است (۲۹,۳۱). نتایج حاصل از مطالعه ما در دوز‌های مختلف عصاره مтанولی قارچ ترامتس ورسیکالر، نشان‌دهنده تاثیر عصاره‌های مذکور بر فاکتورهای دخیل دیابت در موش سوری نر می‌باشد و با توجه به مطالعه Byang و همکارانش بر روی اگزوبیولیمرهای استخراج



تصویر شماره ۲: التهاب بین هپاتوسیت‌ها (قرمز) و ناحیه نکروز کوچک (سفید)

بحث

امروزه پژوهش‌های متعددی در زمینه بیماری دیابت صورت گرفته است که در همه آن‌ها مسئله سمتیت داروهای مورد استفاده و کشف و توسعه داروهای با اثر بخشی بالا که توانایی کاهش قندخون و هم‌کنترل عوارض ثانویه بیماری اعم از نفropاتی، آسیب کبدی، استرس اکسیداتیو را داشته باشد، مورد توجه است. اخیراً استفاده از گیاهان و قارچ‌های خوراکی و دارویی به علت دارا بودن ترکیبات موثره بالقوه، به طور گسترده در درمان بیماری‌ها از جمله دیابت مورد پذیرش جهانی قرار گرفته است. جهت القای دیابت میتوس در مدل‌های حیوانی از استرپتوزوستین به عنوان عامل دیابتی کننده استفاده می‌شود که اغلب سبب آسیب کلیوی، سمتیت کبدی و استرس اکسیداتیو و افزایش میزان کلسترول خون همراه است (۲۵,۲۶). استرپتوزوستین یک آنالوگ ان-استیل گلوکزآمین می‌باشد که سبب رهایش نیتریک اکساید، افزایش گلیکوزیله شدن پروتئین‌های پانکراس و افزایش تولید رادیکال‌های آزاد اکسیژن می‌شود که یکی از دلایل تخریب سلول‌های بتای پانکراس می‌باشد (۲۶). استرس اکسیداتیو نتیجه ناهماهنگی پراکسیدانت‌ها و آنتی اکسیدانت‌ها در ارگانیسم بوده و افزایش استرس اکسیداتیو در بیماری دیابت تیپ ۱ مشاهده شده است. افزایش رادیکال آزاد اکسیژن و استرس اکسیداتیو بر متابولیسم گلوتاتیون سیتوزول و میتوکندری اثر می‌گذارد و افزایش ۵ تا ۸ برابری

(درصد) و تری گلیسیرید (۲۲/۷ و ۲۵/۵ درصد) نسبت به گروه کنترل از خود نشان دادند و سطح ALT و AST هم در نمونه های دیابتی کاهش پیدا کرد که نتایج با مطالعه ما همخوانی دارد (۳۵). مطالعه دیگری توسط Byung و همکاران بر آگزوپلیمرهای تولید شده توسط میسلیوم های *Lentinus edodes* روشی اثرات کاهنده گی قندخون موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین انجام گرفت که تجویز میزان ۲۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم آگزوپلیمر به موش های دیابتی میزان قند سرم خون را به میزان ۲۱/۵ درصد، میزان کلسترول ۲۱/۱ درصد و میزان تری گلیسیرید را ۴۴/۵ درصد نسبت به گروه کنترل کاهش داده است که هم راستا به نتایج مطالعه ما می باشد (۳۶). در تحقیقی که بر آگزوپلیمرهای بهست آمده از میسلیوم های محیط کشت قارچ *Ganoderma lucidum* با میزان ۱۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم روی موش های دیابتی شده توسط استرپتوزوسین انجام شد اثرات کاهنده گی گلوکز سرم خون و همچنین کاهش کلسترول و تری گلیسیرید به ترتیب ۱۴/۷ درصد و ۳۱/۴ درصد و افزایش HDL به میزان ۳۷/۷ درصد نسبت به گروه کنترل مشاهده شد و میزان ALT و AST در گروه های دریافت کننده عصاره قارچ نسبت به کنترل کاهش معنی دار داشت که با نتایج مطالعه ما قرابت دارد (۳۷).

مطابق نتایج فوق، قارچ مورد مطالعه ما نیز توابی قابل توجهی در کاهش میزان قند خون موش سوری و در نتیجه کنترل بیماری دیابت را داشته است به طوری که سطح سرمی تری گلیسیرید، آنزیم ALT کاهش قابل قبولی داشته است و از مطالعات هیستوپاتولوژیکی مشخص گردیده است که تجویز و افزایش دوز عصاره متابولی، سبب بهبودی در وضعیت بافتی کبد شده است. در نهایت پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی به شناسایی اختصاصی ترکیبات موثر موجود در قارچ ترامتس و رسیکالر که بر فاکتورهای دخیل در دیابت تاثیر گذار هستند پرداخته شود.

شده از پنج قارچ دارویی (*Coriolus versicolor* , *Cordyceps sinensi* , *Paecilomyces japonica*, *Armillariella mellea*, *Fomes fomentarius*) بر روی اثرات کاهنده گی قندخون در موش های دیابتی شده توسط استرپتوزوسین دریافتند که آگزوپلیمرهای استخراج شده از قارچ *Coriolus versicolor* (ترامتس و رسیکالر) نسبت به چهار قارچ دیگر اثرات کاهنده گی قند خون بهتری از خود نشان داده است به طوری که حدود ۲۹ درصد نسبت به نمونه شاهد بیشتر قند خون را کاهش داده است (۳۲). در مطالعه ای دیگر که از عصاره آب داغ حاصل از قارچ *Ganoderma lucidum* بروی اثرات کاهنده گی قندخون در موش های دیابتی شده توسط آلوکسان صورت گرفته، گزارش شده است که تجویز عصاره آبی آن با غلظت ۱۰۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم اثرات بارزی از کاهنده گی خون در موش های دیابتی شده دریافت کننده عصاره در مقایسه با موش های دیابتی عدم دریافت عصاره از خود نشان داد (۱۲). در بررسی که همکارانش با خوراندن عصاره آبی (*Grifola frondosa* KK-A') به موش های دیابتیک نجام دادند دریافتند که این عصاره با تاثیر روی رسپتورهای انسولینی سبب کاهش قند خون در بدن موش های دیابتی شده دریافت کننده عصاره در مقایسه با موش های که عصاره دریافت نکردن، گردید (۳۳). در مطالعاتی که در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳ روی پلی ساکاروبیتید (PSP) حاصل از قارچ ترامتس و رسیکالر انجام شد دریافتند که این پلی ساکاروبیتیدها می توانند به عنوان کمکی در درمان هپاتیت کبدی و همچنین محافظت کبد در مقابل سرم های کبدی استفاده گردد (۳۴). طی مطالعه Byung و همکاران در کشور کره جنوبی بر آگزوپلیمرهای *Ganoderma applanatum* استخراج شده از قارچ های *Collybia confluens* و کیلو گرم روی موش های دیابتی شده توسط استرپتوزوسین، اثرات کاهنده گی قند خون به ترتیب به نسبت ۲۲ و ۲۵/۹ درصد و همچنین سبب کاهش سطح کلسترول (۲۰/۳ و

سپاسگزاری

دانشگاه علوم پزشکی مازندران- رامسر می باشد. از تمام کسانی که ما را در انجام این پژوهه یاری کردند کمال تقدیر و تشکر را داریم.

این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بخشی از پایان نامه خانم صدف آزدو دانشجوی دکتری داروسازی واحد پردیس

References

- Whiting DR, Guariguata L, Weil C, Shaw J. IDF diabetes atlas: global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. *Diabetes Res Clin Pract* 2011; 94(3): 311-321.
- Piero M, Nzaro G, Njagi J. Diabetes mellitus-a devastating metabolic disorder. *Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences* 2014; 4(40): 1-7.
- Ni H, Soe HHK, Htet A. Determinants of abnormal liver function tests in diabetes patients in Myanmar. *International Journal of Diabetes Research* 2012; 1(3): 36-41.
- Khokhar ZU, Ismail A. Investigation of Association Between Severity of Diabetes and Alkaline Phosphatase in Human. 2014. *American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences* 2014; 6(4): 136-141.
- Rahimi R, Nikfar S, Larijani B, Abdollahi M. A review on the role of antioxidants in the management of diabetes and its complications. *Biomed Pharmacother* 2005; 59(7): 365-373.
- Chen J, Jin X, Zhang L, Yang L. A study on the antioxidant effect of Coriolus versicolor polysaccharide in rat brain tissues. *Afr J Tradit, Complement Altern Med* 2013; 10(6): 481-484.
- NgW J WC, SzeMY D. The Use of Medicinal Mushroom or Herb as Effective Immunomodulatory Agent. *Herbal Medicine: Open Access* 2016; 2(1): 1-13.
- Yu Z-T, Liu B, Mukherjee P, Newburg DS. Trametes versicolor extract modifies human fecal microbiota composition in vitro. *Plant Foods Hum Nutr* 2013; 68(2): 107-112.
- Vazirian M, Dianat S, Manayi A, Ziari R, Mousazadeh A, Habibi E, et al. Anti-inflammatory effect, total polysaccharide, total phenolics content and antioxidant activity of the aqueous extract of three basidiomycetes. *Research Journal of Pharmacognosy* 2014; 1(1): 15-21.
- Tripathy SS, Rajoriya A, Mahapatra A, Gupta N. Biochemical & antioxidant properties of wild edible mushrooms used for food by tribal of eastern india. *Int J Pharm Pharm Sci* 2016; 8(4): 194-149.
- Oluba OM, Onyeneke EC, Ojieh GC, Idonije BO. Evaluation of the hypoglycemic effect of aqueous extract of Ganoderma lucidum on STZ-induced diabetic wistar rats. *Ann Biol Res* 2010; 1(3): 41-49.
- Mohammed A, Adelaiye A, Abubakar M, Abdurahman E. Effects of aqueous extract of Ganoderma lucidum on blood glucose levels of normoglycemic and alloxan-induced diabetic wistar rats. *Journal of Medicinal Plants Research* 2007; 1(2): 034-037.
- Tamez EJ GL, Calderan MT, Rangel R, Ocans F, Castaneda C, Gomes X. hypoglycemic and hypocholesterolemic effects of aqueous and methanolic extracts of Lentinus lepideus, Calvatia cyathiformis and Ganoderma applanatum, from northeastern Mexico, in wister rat. *Journal of Medicinal plant*

- Research 2013; 7(11): 661-668.
14. Yang BK, Kim GN, Jeong YT, Jeong H, Mehta P. Hypoglycemic effects of exobiopolymers produced by five different medicinal mushrooms in STZ-induced diabetic rats. *Mycobiology* 2008; 36(1): 45-49.
 15. Yang JP, Hsu T, Lin F, Hsu W, Chen Y. Potential antidiabetic activity of extracellular polysaccharides in submerged fermentation culture of *Coriolus versicolor* LH1. *Carbohydr Polym* 2012; 90(1): 174-180.
 16. Jia J, Zhang X, Hu YS, Wu Y, Wang QZ, Li NN, et al. Evaluation of in vivo antioxidant activities of *Ganoderma lucidum* polysaccharides in STZ-diabetic rats. *Food Chem* 2009; 115(1): 32-36.
 17. Azadbakht M, Safapour SH, Ahmadi AH, Ghasemi M, Shokrzadeh M. Anti diabetic effects of aqueous fruits extract of *Diospyros lotus* L. on streptozotocin-induced diabetic rats and the possible morphologic changes in the liver, kidney and heart. *Journal of Pharmacognosy Phytother* 2010; 2(2): 10-16.
 18. Shokrzadeh M, Azadbakht M, Abadean S, Abotorabi M. The Effect of *Diospyros lotus* on Liver Glutathione Level in Mice Administered by *Senecio vulgaris* Extract. *J Mazandaran Univ Med Sci* 2013; 23(98): 200-206 (Persian).
 19. Nematbakhsh M, Hajhashemi V, Ghannadi A, Talebi A, Nikahd M. Protective effects of the *Morus alba* L. leaf extracts on cisplatininduced nephrotoxicity in rat. *Res Pharm Sci* 2013; 8(2): 71-77.
 20. Oyedemi S, Bradley G, Afolayan A. Antidiabetic Activities of Aqueous Stem Bark Extract of *Strychnos henningsii* Gilg in Streptozotocin-nicotinamide Type 2 Diabetic Rats. *Iran J Pharm Res* 2012; 11(1): 221-228.
 21. Zarei A, Ashtiyani SC, Rasekh F, Mohammadi A, Jabary A. The effects of *Physalis Alkekengi* extract on lipids concentrations in rats. *Arak Med Univ J* 2011; 14(2): 36-42.
 22. Atangwho IJ, Ebong PE, Eyong EU, Asmawi MZ, Ahmad M. Synergistic antidiabetic activity of *Vernonia amygdalina* and *Azadirachta indica*: Biochemical effects and possible mechanism. *J of Ethnopharmacol* 2012; 141(3): 878-887.
 23. Shokrzadeh M, Pakravan N, Sheikholeslamian S. The protective effect of N-acetyl cysteine on glutathione levels and serum cholinesterase in acute poisoning of diazinon, in mice. *J Mazandaran Univ Med Sci* 2013; 22(2-3): 2-11 (Persian).
 24. Adisa RA CM, Olorunsogo OO. Hypoglycemic activity of *Buchholzia coriacea* (Capparaceae) seeds in streptozotocin-induced diabetic rats and mice. *Experimental and Toxicologic Pathology* 2011; 63(7): 619-625.
 25. Cho EJ, Hwang HJ, Kim SW, Oh JY, Baek YM, Choi JW, et al. Hypoglycemic effects of exopolysaccharides produced by mycelial cultures of two different mushrooms *Tremella fuciformis* and *Phellinus baumii* in ob/ob mice. *Appl Microb Biotechnol* 2007; 75(6): 1257-1265.
 26. Donner H, Rau H, Walfish PG, Braun J, Siegmund T, Finke R, et al. CTLA4 Alanine-17 Confers Genetic Susceptibility to Graves' Disease and to Type 1 Diabetes Mellitus 1. *J Clin Endocrinol Metab* 1997; 82(1): 143-146.
 27. Baynes JW. Role of oxidative stress in development of complications in diabetes. *Diabetes* 1991; 40(4): 405-412.
 28. El-Demerdash F, Yousef M, El-Naga NA. Biochemical study on the hypoglycemic effects of onion and garlic in alloxan-induced

- diabetic rats. *Food Chem Toxicol* 2005; 43(1): 57-63.
29. Lovy A, Knowles B, Labbe R, Nolan L. Activity of edible mushrooms against the growth of human T4 leukemic cancer cells, HeLa cervical cancer cells, and Plasmodium falciparum. *Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants* 2000; 6(4):49-57.
30. Chu KK, Ho SS, Chow AH. *Coriolus versicolor: A Medicinal Mushroom with Promising Immunotherapeutic Values*. *J Clin Pharmacol* 2002; 42(9): 976-984.
31. Habibi E, Sadat-Ebrahimi SE, Mousazadeh SA, Amanzadeh Y. Mycochemical Investigation of the Turkey Tail Medicinal Mushroom *Trametes versicolor* (Higher Basidiomycetes): A Potential Application of the Isolated Compounds in Documented Pharmacological Studies. *Int J Med Mushrooms* 2015; 17(3): 255-265.
32. Yang BK, Kim GN, Jeong H, Mehta P, Song Ch. Hypoglycemic Effects of Exobiopolymers Produced by Five Different Medicinal Mushrooms in STZ-induced Diabetic Rats. *Mycobiology* 2008; 36(1): 45-49.
33. Kubo K, Nanba H. Anti-diabetic mechanism of maitake (*Grifola frondosa*): Mushroom Biology and Mushroom Products University Park. Japan: Penn State University. 1996.
34. Cheng KF, Leung PC. General review of polysaccharopeptides (PSP) from *C. versicolor*: pharmacological and clinical studies. *Cancer Therapy*. 2008; 6: 117-130.
35. Yang BK, Jung YS, Song CH. Hypoglycemic Effects of *Ganoderma applanatum* and *Collybia confluens* Exo-polymers in Streptozotocin-induced Diabetic Rats. *Phytother Res* 2007; 21(11): 1066-1069.
36. Yang BK, Kim DH, Jeong SC, Choi YS, Shin JS, Song Ch, et al. Hypoglycemic Effect of a *Lentinus edodes* Exopolymer Produced from a Submerged Mycelial Culture. *Bioscience Biotechnology Biochemistry* 2002; 66(5): 937-942.
37. Byung KY, Wilson AM, Cho KY, Hyun SCh. Hypoglycemic effect of Exo- and Endobiopolymers produced by submerged mycelial Culture of *Ganoderma lucidum* in streptozotocin-induced Diabetic Rats. *J Microbiol, Biotechnol* 2004; 14(5): 972-977.