

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا (*Brassica napus* L.) در واکنش به کاشت تأخیری

- حمیدرضا فنایی، استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان (نویسنده مسئول)
- غلامعلی کیخا، کارشناسان بخش تحقیقات آب و خاک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
- نورالله داوطلب، کارشناس اسبق بخش تحقیقات دانه های روغنی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
- فرحناز سراوانی، کارشناسان بخش تحقیقات آب و خاک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

تاریخ دریافت: آبان ماه ۱۳۹۰ تاریخ پذیرش: مهر ماه ۱۳۹۳
پست الکترونیک نویسنده مسئول: fanay52@yahoo.com

چکیده

به منظور بررسی اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا در واکنش به کاشت تأخیر، آزمایشی طی دو سال زراعی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک-زابل اجراء گردید. فاکتورهای مورد مطالعه شامل تاریخ کاشت در چهار سطح (۱۰ آبان، ۲۵ آبان، ۱۰ آذر و ۲۵ آذر) به عنوان فاکتور اصلی و ژنوتیپ در چهار سطح (رقم آرچی اس، هیبرید هایولا ۴۰۱، لاین های PP-308/8 و PP-401/15E) به عنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج حاصل از تجزیه مرکب نشان داد که اثر تاریخ کاشت، بجز درصد روغن و ژنوتیپ، بجز تعداد خورجین در بوته بر عملکرد دانه و سایر صفات مورد بررسی از لحاظ آماری معنی دار بودند. اما اثر سال تنها بر درصد روغن، عملکرد روغن و روز تا شروع گلدهی در سطح احتمال ($p < 0/01$) معنی دار بود. با تأخیر در کاشت، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، عملکرد روغن و عملکرد دانه کاهش نشان دادند. بیشترین عملکرد دانه به میزان ۲۹۸۹ کیلوگرم در هکتار، در تاریخ کاشت اول (۱۰ آبان) و کمترین عملکرد دانه با ۳۹ درصد کاهش تولید در تاریخ کاشت چهارم (۲۵ آذر) تولید شد. در بین ژنوتیپ های مورد بررسی، هیبرید هایولا ۴۰۱ با تولید ۲۷۰۱ کیلوگرم در هکتار و رقم آرچی اس با ۲۴۵۳ کیلوگرم در هکتار، نسبت به ژنوتیپ های دیگر بیشترین عملکرد دانه را داشتند. نتایج همبستگی ساده میان صفات مورد بررسی نشان داد که از بین اجزای عملکرد، تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین به ترتیب با ضرایب همبستگی ($r = 0/82^{**}$) و ($r = 0/62^{**}$) و در بین دیگر صفات، عملکرد روغن و تعداد روز تا شروع گل دهی به ترتیب با ضرایب ($r = 0/98^{**}$) و ($r = 0/59^*$)، بیشترین همبستگی مثبت را با عملکرد دانه داشتند. بر اساس نتایج بدست آمده می توان نتیجه گیری کرد که تاریخ کاشت اوایل آبان و استفاده از هیبرید هایولا ۴۰۱ و رقم اوپی آرچی اس در شرایط منطقه قابل توصیه باشد.

کلمات کلیدی: ژنوتیپ، عملکرد دانه، کاشت تأخیری، کلزا

Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No:108 pp: 65-73

Evaluation of seed yield and yield components of canola (*Brassica napus* L.) genotypes in response to delay planting

By:

- H. R. Fanaei, (Corresponding Author), Prof. Assistant, Agricultural and Natural Resources Research Center of Siستان, Zabol, Iran
- Gh.kakha, Experts of soil and water Research Department, Siستان Agricultural and Natural Resources Research and Education
- N. Davtalab, Former Expert of oil seeds Research Department Siستان Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
- F. Sarananie, Experts of soil and water Research Department, Siستان Agricultural and Natural Resources Research and Education

Received: October 2012

Accepted: September 2014

In order to study response of the seed yield and yield components of canola genotypes to delay in planting, an experiment was conducted as split-plot in randomized complete block design with three replications, during two cropping seasons in zahak Agricultural Research station. Study factors were consisted four sowing dates (Nov 1st, Nov 16th, Dec 1st and Dec 16th as main-plots, and four spring rapeseed genotypes (RGS003, Hyloa401, pp-308/8 and pp-401/15E) as the sub-plots. The Results of combined analysis indicated that planting date and genotype had significant effect on seed yield and traits other, but the effect of year only was significant on oil percent, oil yield and day to initial flowering. With delay in planting, showed decreasing significantly the number of silique in plant, number of seed in silique, weight of 1000 grain, plant height, oil yield and seed yield. The first planting date (Nov 1st) with mean 2989 kg/ha had the highest seed yield and the lowest seed yield obtained with 39 percent decreasing in fourth planting date (Dec 16th). Hybrid Hyloa 401 with mean 2701 kg/ha and RGS003 with mean 2453 kg/ha produced maximum seed yield between genotypes. The results of simple correlation of measured traits showed that between yield components, number of silique in plant and number of seed in silique with coefficients ($r=0.82^{**}$ and $r=0.62^{**}$) and between other traits, oil yield and day to initial flowering with coefficients ($r=0.98^{**}$ and $r=0.59^{**}$) had most positive correlation with seed yield, respectively. Based on the results, it can be concluded that planting in early Nov and use of hybrid Hyloa401 and RGS003 cultivar was recommendable in Siستان region.

key Words: Canola, Delay planting, Genotype Seed yield,

مقدمه

عملکرد دانه و روغن را در رقم زرفام ایجاد کرد. (Mirzaei, Dashti, Absalan, Siadat and Fathi., 2010) گزارش کردند که در بین پنج رقم کلزای بهاره، بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب در هیبرید هایولا ۳۰۸ (۲۷۳۷ کیلوگرم در هکتار) و ساری گل (۲۱۷۳ کیلوگرم در هکتار) بدست آمد. (Lunn et al., 2001)، طی بررسی تاریخ کاشت‌های پاییزه (اول سپتامبر و آخر سپتامبر) طی چهار سال آزمایش، گزارش نمودند که به طور متوسط در همه سال‌ها، در کاشت تأخیری، اندازه کانوبی کمتر از حد مطلوب و بهینه بود و در نتیجه عملکرد دانه کاهش نشان داد. (Shiranirad and Ahamadie 1997) گزارش کردند که با تأخیر در کاشت ارتفاع بوته، وزن خشک کل گیاه، و عملکرد دانه کاهش یافت و در بین ارقام مورد بررسی، رقم سرز عملکرد دانه بیشتری نسبت به رقم بلیندا داشت که ناشی از تعداد دانه در غلاف و طول دوره رشد بیشتر آن بود.

(Mahmmod Abadie, Azizi and Gazachian 2008)، اعلام داشتند که در کاشت تأخیری، طول دوره قبل از گل‌دهی، تعداد غلاف در بوته و وزن هزار دانه کاهش یافت، اما تعداد دانه در غلاف تحت تأثیر قرار نگرفت. (Faraji 2005) گزارش نمود، با تأخیر در تاریخ کاشت، ارتفاع بوته، تعداد روز تا گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیکی و طول دوره گلدهی به طور معنی‌داری کاهش یافت، اما تعداد غلاف در بوته از روند خاصی پیروی نکرد.

کلزا به عنوان یکی از مهمترین گیاهان روغنی در سطح جهان مطرح می‌باشد (Koocheki and Khajehossini, 2008). پایین بودن درصد اسیدهای چرب اشباع آن نسبت به روغن‌های گیاهی دیگر سبب گردیده تا روغن کلزا به عنوان یک روغن خوراکی مفید مورد پذیرش عمومی قرار گیرد (Scarath and Tang, 2006). کلزا، پس از سویا، مقام دوم تولید روغن بین دانه‌های روغنی را به خود اختصاص داده است (FAO, 2007).

از بین تمام جنبه‌های مدیریت زراعی، تاریخ کاشت بیشتر از همه در معرض تغییر می‌باشد و اغلب عامل تعیین‌کننده موفقیت در تولید محصول می‌باشد. هدف از تعیین تاریخ کاشت، پیدا نمودن بهترین زمان کاشت، به گونه‌ای که مجموعه عوامل محیطی حادث در آن زمان برای سبز شدن، استقرار و بقای گیاهچه مناسب بوده و هر مرحله از رشد گیاه از شرایط مطلوب برخوردار گشته و با شرایط محیطی نامساعد روبرو نگردد (Khajepour, 2001).

(Adamsen and Coffelt 2005)، اعلام داشتند که ارقام مختلف، نسبت به تاریخ کاشت، عکس‌العمل‌های متفاوتی نشان می‌دهند، به طوری که هر رقم کلزا می‌تواند پتانسیل تولید بالایی را در تاریخ کاشت مطلوب خود داشته باشد.

(Fallah Heki, Yadavi, Movahhedi Dehnavi and Balou-) (chi 2010)، گزارش کردند که در بین چهار رقم کلزای پاییزه (زرفام، اکاپی، الایت و اس ال ام ۰۴۶)، تأخیر در کاشت کمترین کاهش

هزار دانه با توزین ۴ نمونه ۲۵۰ تایی با ترازوی حساس ۰/۱/۰ گرم تعیین گردید. پس از حذف دو خط کاشت از طرفین و حذف نیم متر از ابتدا و انتهای خطوط هر کرت به عنوان اثرات حاشیه‌ای، برداشت نهایی جهت تعیین عملکرد دانه از سطح ۴ مترمربع به صورت دو مرحله‌ای انجام گرفت. وزن دانه ۱۰ بوته برداشت شده، برای دستیابی به اجزای عملکرد به عملکرد دانه کرت اضافه گردید. برای تعیین درصد روغن نمونه‌ها به صورت غیر تخریبی، از دستگاه NMR^۱ استفاده شد. پس از تعیین درصد روغن، از حاصل ضرب آن در عملکرد دانه، عملکرد روغن محاسبه شد (Fanaie, Ghanbari, Akbarimoghadam, Souloki and Narouirad, 2008). جهت اطمینان از تجانس واریانس‌ها بر روی داده‌های دو سال، آزمون یکنواختی واریانس‌های آزمایشی از طریق آزمون بارتلت انجام شد. آزمون نشان داد که برای کلیه صفات مورد بررسی واریانس‌ها یکنواخت بود، لذا تجزیه واریانس مرکب بر اساس تصادفی بودن سال انجام گرفت. تجزیه آماری داده‌ها با نرم افزار MSTAT-C، رسم نمودارها با Excel و مقایسه میانگین‌ها در سطح احتمال ۵٪ با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن صورت گرفت.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر سال به جزء بر درصد روغن، عملکرد روغن و روز تا شروع گل دهی، روی دیگر صفات معنی‌دار نبود. اثر تاریخ کاشت به جزء درصد روغن و اثر ژنوتیپ به جزء تعداد خورجین در بوته بر سایر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و صفات مورد بررسی معنی‌دار بودند. اثرات متقابل تاریخ کاشت × ژنوتیپ به جزء روز تا شروع گلدهی بر بقیه صفات معنی‌دار نبود.

اثر تاریخ کاشت در سطح ۱ درصد بر تعداد خورجین در بوته معنی‌دار بود (جدول ۳). مقایسات میانگین تعداد خورجین در بوته در تاریخ‌های کاشت مختلف نشان می‌دهد بیشترین تعداد خورجین در بوته در تاریخ کاشت دهم آبان و کمترین در تاریخ کاشت بیست و پنجم آذر تولید گردید (جدول ۴). (Faraji 2005). عدم تغییر تعداد غلاف در بوته را با تاخیر در تاریخ کاشت گزارش نمود، اما (Fanaei, Galavi, Ghanbari Bon-, 2008) (Solouki, and Naruoiei-Rad, 2008), (Mahmmod Abadi et al., 2008) و (Ozer 2003)، کاهش عملکرد دانه در تاریخ کاشت‌های دیر را به علت کاهش تعداد خورجین در گیاه اعلام نمودند. که با نتیجه این آزمایش مطابقت داشت. همان‌طور که از جدول ۲ استنباط می‌شود به نظر می‌رسد، شرایط محیطی بهینه و درجه حرارت مناسب در ابتدای فصل رشد در تاریخ‌های کاشت زود سبب گردیده است تا ضمن افزایش طول دوره گلدهی، تعداد گلچه بیشتری نیز تبدیل به خورجین گردد و نهایتاً درصد عدم تلقیح و سقط گلچه نسبت به تاریخ کاشت‌های دیر کمتر باشد. اگرچه از لحاظ آماری در بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی، اختلاف معنی‌دار وجود نداشت اما رقم آرچی‌اس و هیبرید هایولا ۴۰۱ بیشترین و لاین PP-308/8 کمترین خورجین در بوته را داشتند (جدول ۴). در گزارش (Abrahehi, Akbari, Akbari and SamadiFirozabadi 2012) رقم آرچی‌اس نیز بیشترین خورجین در بوته را داشت. به نظر می‌رسد علاوه بر تاثیر تفاوت مورفولوژیکی (طول ساقه اصلی و تعداد شاخه فرعی)، در ارقام زودگل، مراحل غنچه دهی و شروع گل که تمایز و تکامل سلول‌های مولد خورجین در آنها انجام می‌گیرد، با شرایط بهینه محیطی برخورد نماید و این سبب می‌گردد تا تعداد زیادتری از سلول‌های مولد خورجین بر روی شاخه‌های اصلی و فرعی به مرحله

(Si and Walton 2004)، گزارش نمودند، به ازاء هر ۲ هفته تأخیر در کاشت، حدود ۱/۱ درصد روغن و ۳۰۹ کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه کاهش داشت و به ازاء هر ۱ درجه سانتی‌گراد افزایش درجه حرارت در دوره گلدهی، کاهش برابر با ۰/۶۸ درصد برای روغن و ۲۸۹ کیلوگرم در هکتار برای عملکرد دانه مشاهده گردید.

(Gunasekera, Martin, Siddique and Walton, 2006) نشان دادند که در مناطق کم باران استرالیا کشت‌های زود هنگام کلزا از عملکردهای بالاتری برخوردار بودند. در تاریخ کاشت زود، به دلیل ایجاد توازن و تعادل رشدی بین دو فاز رویشی و زایشی، توانایی گیاه در تحمل خشکی انتهای فصل و در نتیجه تولید ماده خشک و عملکرد دانه حداکثر می‌باشد.

(Farre, Robertson, Walton and Asseng, 2002)، با تجزیه و تحلیل واکنش کلزا به تاریخ کاشت، نشان دادند که کاهش عملکرد با تأخیر در تاریخ کاشت، از ۳/۲ تا ۸/۶ درصد به ترتیب به ازاء هر هفته در مناطق پر باران و کم باران متغیر است.

(Robertson, Holland and Bambach, 2004)، طی بررسی ۱۷، زمان کاشت از آوریل تا سپتامبر، در ارقام زودگل و دیرگل کلزا، گزارش نمودند در همه ارقام با تأخیر در کاشت، زمان رسیدن به ۵۰ درصد گل‌دهی و رسیدگی فیزیولوژیکی کوتاه گردید. طی سال‌های اخیر، کاهش ناگهانی درجه حرارت در اوائل فصل رشد کلزا در مناطق گرم سبب ایجاد خسارت به مزارع کلزا شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی واکنش ژنوتیپ‌های مختلف کلزا در تاریخ‌های کاشت زود و دیر هنگام از لحاظ عملکرد دانه، روغن، اجزای عملکرد و تعیین ارقام سازگار با شرایط منطقه اجراء گردید.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در دو سال زراعی ۱۳۸۴-۱۳۸۵ و ۱۳۸۳-۱۳۸۴ در اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان زهک واقع در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی زابل با ارتفاع ۴۸۳ متر از سطح دریا و متوسط بارندگی سالیانه ۵۳ میلی‌متر اجراء گردید. خاک مزرعه دارای بافت لوم شنی و زمین مورد آزمایش در سال قبل زیر کشت گندم بود. برخی از ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی خاک، تا عمق ۳۰ سانتی‌متری در جدول ۱ ارائه گردیده است. در جدول ۲ شرایط آب و هوایی و تغییرات دمایی در سال‌های انجام آزمایش ارائه شده است. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی در ۴ سطح (۱۰ آبان، ۲۵ آبان، ۱۰ آذر و ۲۵ آذر) و ژنوتیپ به عنوان فاکتور فرعی در چهار سطح (رقم آرچی‌اس، هیبرید هایولا ۴۰۱، لاین‌های PP-308/8 و PP-401/15E) در نظر گرفته شد. هر کرت فرعی شامل ۶ خط کاشت ۶ متری با فواصل خطوط ثابت ۲۰ سانتی‌متر و به مساحت ۷/۲ متر مربع بود. بر اساس نتایج تجزیه خاک، ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار P_2O_5 از منبع سوپر فسفات تریپل و ۱۷۰ کیلوگرم در هکتار پتاس از منبع سولفات دو پتاس به صورت قبل از کاشت، در خاک پخش گردید. ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره به نسبت‌های ۳۰، ۳۰ و ۴۰ درصد به ترتیب در مراحل قبل از کاشت، خروج بوته‌ها از روزت و شروع گل‌دهی به زمین داده شد. آبیاری با استفاده از سیفون و در مراحل رزت، غنچه‌دهی، گل‌دهی، خورجین‌دهی و پر شدن دانه صورت گرفت. برای مبارزه با برگ‌خوار کلزا، از سم اندوسولفان با غلظت ۲ در هزار استفاده گردید. در هر دو سال آزمایش، برای تعیین اجزای عملکرد، ۱۰ بوته متوالی از ۴ خط وسط برداشت و بر اساس یک بوته میانگین‌گیری انجام شد. وزن

معنی‌دار نشان داد. بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت دهم آبان و کمترین آن در تاریخ کاشت بیست و پنجم آذر با ۳۹ درصد کاهش، تولید گردید (جدول ۴). به نظر می‌رسد در تاریخ کاشت‌های تأخیری، ظهور مراحل فنولوژیک بعد از سبز شدن، بدلیل کوتاه شدن دوره رشد و کاهش رشد رویشی ناشی از افزایش دما و طول روز سریع تر رخ می‌دهد، با کاهش یافتن دوره رشد رویشی و زایشی در این تاریخ‌ها، تولید و تجمع مواد فتوسنتزی دچار اختلال گردیده که نتیجه‌اش کاهش عملکرد دانه بود. (Si and Walton 2004)، کاهش عملکرد دانه، معادل ۳۰۹ کیلوگرم در هکتار به ازاء هر دو هفته تأخیر در کاشت را گزارش نمودند. این محققین، تاریخ کاشت زود هنگام به همراه یک رقم زودگل را برای تولید دانه و روغن بالا در مناطق کم باران ضروری دانستند (Gunasekera et al., 2006). نتایج این بررسی با یافته‌های (Robertson et al., 2004)، (Lunn et al., 2001)، (Gunasekera 2005)، (Fanaei et al., 2008)، (Mirzaei et al., 2010) و (Fallah Heki et al., 2010) که اعلام کردند تأخیر در تاریخ کاشت باعث کاهش معنی‌دار عملکرد دانه می‌شود، مطابقت دارد. در بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی، هیبرید هایولا ۴۰۱ و لاین PR 401-15E به ترتیب بیشترین و کمترین تولید دانه را داشتند (جدول ۴). در کلزا عملکرد دانه تابعی از تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه است. اختلاف در اجزای عملکرد، اختلافات ژنتیکی، تفاوت در طول دوره رویش، طول دوره گلدهی از عوامل ایجاد اختلاف عملکرد دانه در بین ارقام می‌تواند باشد. در این آزمایش مهمترین اجزای مؤثر در افزایش عملکرد دانه هیبرید هایولا ۴۰۱ تعداد خورجین در بوته و وزن هزار دانه بالا بودند.

ارتفاع بوته

نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت و رقم در سطح احتمال ($p < 0.01$) بر ارتفاع بوته معنی‌دار شد (جدول ۳). همانطور که در جدول ۴ نشان داده شده است، با تأخیر در تاریخ کاشت از ارتفاع بوته ها کاسته شد. به طوری که در تاریخ کاشت اول و دوم بیشترین ارتفاع بوته (۱۵۸ و ۱۵۳ سانتی متر) حاصل گردید. افزایش طول دوره رویش و استفاده بهتر از نهاده ها و عوامل محیطی چون (درجه حرارت، نور، طول روز و رطوبت) در تاریخ کاشت‌های زود نسبت به تاریخ کاشت‌های تأخیری با طول دوره رشد کوتاه تر و عدم فرصت کافی برای ذخیره کردن مواد غذایی عامل اصلی در ایجاد اختلاف در ارتفاع گیاه می‌باشد. کشت به موقع کلزا در زمان مناسب، باعث رشد رویشی بیشتر و تشکیل بوته های بزرگ شد.

نتیجه بدست آمده با نتایج (Shiranei Rad et al., 1997)، (Robertson et al., 2013)، (Abra himei et al., 2013)، (Mirzaei et al., 2010) و (al., 2004) که گزارش نمودند تأخیر در کاشت سبب کاهش معنی‌دار ارتفاع بوته می‌گردد، تطابق دارد. در بین ژنوتیپ ها، لاین PR-401-15E با ۱۵۶ سانتی متر، بالاترین و هیبرید هایولا ۴۰۱ با میانگین ۱۳۴ سانتی متر، کمترین ارتفاع را داشتند (جدول ۴). در آزمایش (Mirzaei et al., 2010) نیز هیبرید هایولا ۴۰۱ کمترین ارتفاع بوته را داشت. علاوه بر عامل ژنتیک، شکل گیری شاخه های فرعی در ارتفاع بیشتری از طول ساقه اصلی و طول میانگره بیشتر از پایین تا اولین شاخه گل دهنده در افزایش ارتفاع بوته در این ژنوتیپ تأثیر داشت.

باروری برسند. اما در ارقام دیرگل، برخورد این مراحل با گرمای زود هنگام اواخر فصل، سبب کاهش تولید خورجین در بوته می‌شود.

اثر تاریخ کاشت و رقم در سطح احتمال ($p < 0.01$) بر تعداد دانه در خورجین معنی‌دار بود (جدول ۳). مقایسات میانگین تعداد دانه در خورجین در تاریخ‌های مختلف کاشت نشان داد که با تأخیر در کاشت، تعداد دانه در خورجین کاهش یافت (جدول ۴). نتیجه بدست آمده از این آزمایش با نتایج آزمایشات (Mirzaei et al., 2010) و (Anvarei 1997)، که اظهار داشتند تعداد دانه در خورجین بیشتر تحت تأثیر عوامل ژنتیکی است و کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می‌گیرد، مطابقت داشت.

(Whitfield 1992)، اظهار نمود که با بالا رفتن دما در مراحل دانه بندی، میزان تنفس غلاف‌ها به سرعت افزایش می‌یابد که سبب اتلاف بیش از حد مواد فتوسنتزی می‌شود. بنابراین، مواد غذایی کافی به دانه‌ها نرسیده و درصد دانه های سبک و پوک زیاد می‌شود. اختلاف در تداوم نوسانات رطوبتی و حرارتی در مناطق مختلف در توجیه اختلاف نتایج بدست آمده می‌تواند قابل تفسیر باشد.

ژنوتیپ PP-308/8 با متوسط ۲۲ دانه در غلاف بیشترین تعداد را داشت اگرچه تفاوت با سایر ژنوتیپ ها فاحش نبود. باید توجه داشت که افزایش تعداد دانه در غلاف محدود بوده و بیشتر به طول غلاف بستگی دارد.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت و رقم تفاوت معنی‌دار بر وزن هزار دانه داشتند (جدول ۳). به طوری که از جدول ۴ استنباط می‌شود با تأخیر در تاریخ کاشت از وزن هزار دانه کاسته شد (جدول ۴). بیشترین وزن هزار دانه در تاریخ کاشت دهم آبان و دهم آذر ماه و کمترین در تاریخ کاشت بیست و پنجم آذر ماه حاصل گردیده است (جدول ۴). وزن هزار دانه آخرین جزء عملکرد است که در گیاه شکل می‌گیرد. طبیعی است که هر قدر که دانه زودتر تشکیل گردد و بیشتر روی بوته بماند، فرصت بیشتری برای انباشت مواد ذخیره ای می‌یابد. که در تاریخ کاشت های زود نسبت به دیر این اتفاق می‌افتد. نتیجه بدست آمده با نتایج با نتایج محققان دیگر (Fanaei et al., 2008) و (Mirzaei et al., 2010) که کاهش وزن هزار دانه را در تاریخ کاشت‌های تأخیری گزارش نمودند، مطابقت داشت. انتظار می‌رود همواره با تأخیر در کاشت، وزن هزار دانه نیز به دلیل کاهش سطح فتوسنتزکننده و کوتاه شدن دوره برای پر شدن دانه کاهش یابد، ولی ممکن است اواخر دوران پر شدن دانه با وضعیت جوی مناسب تری روبرو گردد. به طوری که افزایش وزن هزار دانه در تاریخ کاشت سوم در این آزمایش نیز با این استدلال می‌تواند قابل توجیه باشد. در بین ارقام مورد بررسی، بیشترین وزن هزار دانه به هیبرید هایولا ۴۰۱ با میانگین ۳/۴۶ گرم و کمترین با میانگین ۲/۷۴ به لاین PR-401-15E تعلق داشت (جدول ۴). به نظر می‌رسد، علاوه بر این که ژنتیک ارقام در این اختلاف تأثیرگذار باشد. به دلیل این که هیبرید هایولا ۴۰۱ زودرس تر از ژنوتیپ های دیگر بود دوره پر شدن دانه آن با دماهای بالای آخر فصل برخورد کمتری داشت. معنی دار شدن اثر سال در تاریخ کاشت و اثر سال در رقم بر وزن هزار دانه، نشان از تأثیر پذیری وزن هزار دانه از شرایط متفاوت در تاریخ‌های مختلف کاشت و همچنین عکس العمل متفاوت ارقام در سال های مختلف آزمایش می‌تواند داشته باشد (جدول ۳).

چنانکه از جدول ۳ استنباط می‌شود، اثر تاریخ کاشت و رقم از لحاظ آماری بر عملکرد دانه در سطح احتمال ($p < 0.01$) اختلاف

هیبرید هایولا ۴۰۱ با میانگین ۱۰۳۹ کیلوگرم در هکتار و کمترین آن با میانگین ۹۳۶ کیلوگرم در هکتار به لاین PP-308/8 تعلق داشت. Faraji et al., 2005 و Fanaei et al., 2008، Abrahimei et al., 2013 گزارش کردند که ارقامی که دارای عملکرد دانه بالایی هستند، به همان نسبت عملکرد روغن بالایی در واحد سطح نیز دارند که با نتیجه بدست آمده از این آزمایش تطابق داشت.

تعداد روز تا شروع گل دهی

چنان که در جدول ۳ آمده است، اثر سال، تاریخ کاشت، رقم و اثرات متقابل دوگانه و سه گانه عوامل فوق در سطح ۱ درصد اختلاف معنی دار بر تعداد روز تا شروع گلدهی داشت. بیشترین تعداد روز تا شروع گلدهی در سال اول آزمایش با ۹۱ روز و کمترین با ۸۷ روز در سال دوم آزمایش اتفاق افتاده است. تغییرات در فاکتورهای دمایی و رطوبتی طی دو سال آزمایش می تواند توجیه کننده این اختلافات باشد (جدول ۲). به نظر می رسد که بارندگی بیشتر در طی ماه های دی و بهمن در سال اول، شرایط مناسب تری را از جهت طولانی تر شدن رشد رویشی فراهم نموده است.

(Faraji 2005) نیز گزارش کرد که فنولوژی کلزا به طور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر عوامل محیطی و شرایط مختلف آب و هوایی طی سال های متفاوت قرار می گیرد.

تاریخ کاشت دهم و بیست و پنجم آبان، بیشترین تعداد روز تا شروع گلدهی را داشتند. در تاریخ های کاشت زود، به دلیل شرایط دمایی و رطوبتی بهینه تر و فرصت بیشتر، طول فاز رویشی گیاه طولانی تر گردیده که به طبع آن تعداد روز تا شروع گل دهی نیز در قیاس با تاریخ های کاشت دیر افزایش یافته است (جدول ۴).

(Mendham 1990)، بیان می دارد تأخیر در کشت سبب افزایش سرعت رشد و از طرفی باعث کاهش زمان تعداد روز تا گلدهی می شود. نتایج ارائه شده در جدول ۴ نشان می دهد که ژنوتیپ های PP-308/8 و PR-401-15E دیرتر و هیبرید هایولا ۴۰۱ زودتر از سایر ارقام گلدهی داشتند.

همانطور که اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم در شکل ۱ نشان می دهد، اختلاف ژنوتیپ ها از جهت زودگل و دیرگل بودن در تاریخ کاشت های ۱۰ و ۲۵ آبان آشکارتر بود اما در کشت های تأخیری به ویژه ۲۵ آذر، عکس العمل ژنوتیپ ها مشابه بود. به نظر می رسد در کشت های تأخیری اختلاف میان ژنوتیپ های زودگل و دیرگل تحت تاثیر دما و طول روز کاهش می یابد. (Si and Walton 2004) و (Faraji 2005) گزارش کردند که تأخیر در کاشت، طول دوره گلدهی را کاهش داد و سبب گردید تا اختلاف بین ارقام از لحاظ تعداد روز تا شروع گل دهی کاهش یابد که با نتیجه این آزمایش مطابقت دارد.

ضرایب همبستگی ساده اجزای عملکرد دانه و صفات اندازه گیری شده با عملکرد دانه در جدول ۵ آورده شده است. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که از بین اجزای عملکرد، تعداد خورجین در بوته با ضریب ($r=0/82^{**}$) بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه داشت.

این نتیجه با نتایج (Fallah Heki et al., 2010)، (Jeromela et al., 2007) و (Tusar et al., 2006) در تطابق بود. همان طور که مشاهده می گردد در بین صفات دیگر، عملکرد روغن بیشترین همبستگی مثبت ($r=0/98^{**}$) را با عملکرد دانه نشان داد. همبستگی عملکرد دانه با عملکرد روغن توسط Fanaei et al., 2008 و Fallah Heki et al., 2010 گزارش شد که با نتایج این آزمایش مطابقت دارد

درصد روغن

درصد روغن در سال اول نسبت به سال دوم برتری داشت (جدول ۴)، که به نظر می رسد تغییرات درجه حرارت در آخر فصل رشد (اسفند و فروردین) در مرحله پر شدن دانه در این تغییر موثر بوده باشد. گزارش گردیده است که در صورت همزمانی ذخیره و تجمع لیپیدها در دانه ها با درجه حرارت های بالا در آخر فصل درصد روغن کاهش می یابد (Fanaei et al., 2008). نتایج تجزیه واریانس عدم اختلاف معنی دار درصد روغن در تاریخ های مختلف کاشت را نشان داد. از جدول مقایسات میانگین (جدول ۴) نیز استنباط می شود که درصد روغن در تاریخ های مختلف کاشت تغییرات مشابهی داشت. نتایج این آزمایش با یافته های (Robertson et al., 2004) (Fallah Heki et al., 2010) که کاهش درصد روغن در تاریخ کاشت های دیر را به دلیل درجه حرارت های بالا در زمان پر شدن دانه گزارش نمودند، مطابقت نداشت. با عنایت به اینکه به حداکثر رسیدن میزان روغن در بذر بر خلاف پروتئین در اواخر رشد دانه اتفاق می افتد، به نظر می رسد میزان روغن در تاریخ های کاشت مورد بررسی در این آزمایش به یک نسبت تحت تاثیر درجه حرارت های آخر فصل قرار گرفتند. اختلاف در وضعیت اقلیمی مناطق مختلف اجرای آزمایشات، می تواند در این اختلاف نتایج موثر باشد. (Cheema, Malik, Hussain, Shah and Basra., 2001) که درصد روغن تحت تاثیر عوامل ژنتیکی است، در صورتی که در مراحل آخر رشد گیاه تحت تنش نباشد درصد روغن دانه در هر رقم ثابت می ماند.

علی رغم معنی دار بودن درصد روغن در ژنوتیپ های مورد بررسی از لحاظ آماری، مقایسه میانگین نشان داد بجز هیبرید هایولا ۴۰۱ با ۴۲ درصد روغن دیگر ژنوتیپ ها در یک گروه آماری قرار داشتند (جدول ۴). (Si and Walton 2004)، گزارش نمودند ارقام زودگل از دوره گلدهی بیشتری برخوردار بودند و درصد روغن حدود ۱/۲ درصد به ازاء هر ۱۰ روز افزایش دوره گلدهی افزایش یافت. (Fanaei et al., 2008) گزارش نمودند، بین ارقام کلزا اختلاف معنی داری از نظر درصد روغن وجود دارد. (Mendham 1981) نیز معتقد بود درصد روغن واریته های مختلف ثابت بوده و تاریخ کاشت تأثیر اندکی بر آن دارد.

عملکرد روغن

نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیان گر وجود اختلاف معنی دار ($p<0/01$) در بین تاریخ های مختلف کاشت و ارقام از نظر عملکرد روغن بود (جدول ۳). روند تغییرات عملکرد روغن در تاریخ های مختلف کاشت مشابه روند تغییرات عملکرد دانه بود. بیشترین عملکرد روغن در تاریخ کاشت دهم آبان و کمترین در تاریخ کاشت بیست و پنجم آذر حاصل گردید (جدول ۴).

عملکرد روغن از حاصل ضرب عملکرد دانه و درصد روغن دانه به دست می آید. بنابراین تابعی از این دو مؤلفه می باشد. همان طور که از جدول ۵ استنباط می شود عملکرد روغن همبستگی ۹۸ درصدی با عملکرد دانه داشت (جدول ۵). لذا تاریخ کاشت مطلوب با دارا بودن عملکرد دانه بالا، بیشترین مقدار عملکرد روغن در هکتار را تولید نمود. با تأخیر در کاشت، عملکرد دانه نسبت به کاشت به موقع کاهش می یابد. بنابراین کاهش عملکرد روغن قابل توجیه است. (Fallah Heki et al., 2010)، (Fanaei et al., 2008) و (Adamsen and Coffelt 2005)، نیز کاهش عملکرد روغن را در اثر تأخیر در کاشت گزارش کردند.

ژنوتیپ ها تفاوت معنی داری از لحاظ عملکرد روغن نشان دادند. همان طور که در جدول ۴ آمده است، بیشترین عملکرد روغن به

هایولا ۴۰۱ و به دنبال آن رقم آرجی اس، به دلیل بیشتر بودن عملکرد دانه و روغن آنها نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها و نیز زودرسی می‌تواند ارقام مناسبی جهت انتخاب برای کشت به موقع در شرایط منطقه می‌باشد. همچنین با توجه نتایج این آزمایش پیشنهاد می‌شود که در صورت از دست رفتن تاریخ کشت مناسب (اوایل آبان ماه) و تأخیر در کاشت از هیبرید هایولا ۴۰۱ و رقم آرجی اس استفاده شود.

پاورقی‌ها

1. Nuclear magnetic resonance

منابع مورد استفاده

نتیجه گیری

در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که تاریخ کاشت تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد دانه، روغن و اجزای عملکرد، ژنوتیپ‌های مختلف کلزا دارد. با تأخیر در کاشت به دلیل از دست رفتن زمان‌های مناسب برای رشد، گیاه به پتانسیل بالقوه‌ی خود نمی‌رسد. به طوری که اثر آن کوتاه‌تر شدن طول دوره رشد، کاهش اندازه گیاه، کاهش اجزای عملکرد و نهایتاً عملکرد دانه بود. مشخص شد، برای اکثر صفات بهترین تاریخ کاشت ۱۰ آبان (اولین تاریخ کاشت) بود. در بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی هیبرید

جدول ۱- ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش طی دو سال زراعی

سال زراعی	هدایت الکتریکی EC*10 ³	کربن آلی O.C %	واکنش گل اشباع pII	بناسیم قابل جذب K(A.v) p.p.m	فسفر قابل جذب P(A.v) p.p.m	درصد شن	درصد سیلت	درصد رس	بافت خاک
۱۳۸۴-۱۳۸۳	۳/۸	۰/۲	۸/۳	۱۴۰	۶/۲	۵۲	۳۷	۱۱	لوم شنی
۱۳۸۵-۱۳۸۴	۴/۲	۰/۳۳	۸/۲	۱۴۵	۸/۲	۵۹	۲۹	۱۲	لوم شنی

جدول ۲- آمار هواشناسی در طول دوره رشد کلزا در سال‌های انجام آزمایش

آماره‌های هواشناسی	ماه‌های سال														
	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت							
سال	۸۳	۸۴	۸۳	۸۴	۸۳	۸۴	۸۳	۸۴	۸۳	۸۴	۸۳	۸۴	۸۳	۸۴	۸۳
حداقل درجه حرارت (°C)	۱۵/۲	۱۹/۲	۱۰/۸	۱۰/۲	۷/۲	۳/۹	۰/۷	۴/۱	۷/۶	۱۰/۷	۹	۱۲/۴	۱۴/۱۴	۲۰/۲	۲۳/۵۹
حداکثر درجه حرارت (°C)	۳۱/۵	۳۵/۱	۲۸/۲	۲۵/۳	۲۱/۷	۲۰/۱	۱۳/۸	۱۳/۲	۱۳/۹	۲۱/۶	۲۰	۲۵/۹	۲۸/۶	۳۰/۵	۳۴/۳
میانگین درجه حرارت (°C)	۲۳/۳	۲۷/۲	۱۹/۵	۱۷/۸	۱۴/۴۵	۱۲	۸/۵	۷	۹	۱۴/۶	۱۵/۳۵	۱۷/۴	۲۰/۵	۲۷/۲۵	۳۱/۹
تعداد روز یخبندان	-	-	-	-	۳	۳	-	۸	۲	۲	۲	-	-	-	-
بارندگی mm	۰	۰	۳/۴	۰	۰	۰	۴۶	۱۳	۲۹	۷	۶۳	۵/۷	۰	۱/۲	۰

منبع: ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی زهک (سال‌های ۸۳، ۸۴)

جدول ۳- تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه، اجزای عملکرد و سایر صفات مورد بررسی

منابع تغییرات درجه آزاد تعداد خورجین در بو	تعداد دانه در خورجین	وزن هزار دانه	عملکرد دانه	درصد روغن	عملکرد روغن	ارتفاع بوته	روز تا شروع گل
سال	۲۰/۱/۲۶۰ ^{ns}	۲۷/۰۹ ^{ns}	۰/۲۴۲ ^{ns}	۶۵۰۸۳۳۳/۵ ^{ns}	۲۲۰/۱۹۰**	۴۸/۱۶۷ ^{ns}	۳۴۱/۲۶۰**
تکرار در سال	۹۱۱۱/۶۶۷	۵/۰۸۳	۰/۰۶۰	۵۱۰۴۴۳/۰۲۱	۴/۳۴۵	۸۵/۱۶۷	۱/۹۵۸
تاریخ کاشت	۱۰۱۴۵۵/۰۳۱**	۱۰۲/۳۸۸**	۰/۵۲۰*	۵۴۲۷۲۰۴/۹۵۸**	۴/۱۸۷ ^{ns}	۳۴۵۳/۲۳۶**	۲۸۶۰/۲۰۵**
سال*تاریخ کاشت	۳۲۶۱/۱۱۵*	۱۰/۰۱۰ ^{ns}	۰/۵۱۳*	۱۵۹۱۳۶/۰۲۸ ^{ns}	۱/۸۶۴ ^{ns}	۱۵۸۸۲/۵۶۹ ^{ns}	۷۵۵/۷۰۵**
خطای a	۲۳۰۰/۶۶۷	۷/۲۶۴	۰/۰۹۶	۲۹۰۳۶۱/۷۴۳	۵/۷۱۱	۵۸۹۵۲/۶۱۱	۶/۱۵۳
ژنوتیپ	۲۸۴۵/۱۹۸ ^{ns}	۲۶/۴۲۷**	۰/۹۰۹**	۱۱۱۳۹۳۱/۰۴۲**	۲۶/۷۰۷**	۳۳۷۷۰۹/۴۷۲**	۲۴۴/۲۵۰**
سال*ژنوتیپ	۱۴۲۱۴/۱۱۵ ^{ns}	۱۱/۰۳۸ ^{ns}	۰/۶۰۲**	۱۱۷۸۴۵/۸۳۳ ^{ns}	۸/۹۹۳**	۶۲۳۷۹/۶۲۵ ^{ns}	۳۶/۳۷۲**
تاریخ کاشت*رقم	۱۴۵۱/۹۲۷ ^{ns}	۰/۴۹۲ ^{ns}	۰/۰۲۶ ^{ns}	۱۷۵۵۴۷/۶۲۵ ^{ns}	۲/۶۰۷ ^{ns}	۴۲۳۹۰/۷۰۴ ^{ns}	۲۰/۴۸۳**
سال*تاریخ کاشت*ژنوتیپ	۲۵۳۵/۰۱۰ ^{ns}	۱/۵۱۰ ^{ns}	۰/۰۲۰ ^{ns}	۲۰۴۴۹۲/۵۸۳ ^{ns}	۲/۶۳۸ ^{ns}	۵۳۵۲۸/۸۱۹ ^{ns}	۱۶/۲۹۷**
خطای b	۱۱۳۴۵	۱/۴۱۳	۰/۰۲۴	۱۴۴۲۵۳/۴۷۹	۲/۰۶۶	۳۱۲۸۵/۱۸۸	۴/۶۷۴
ضریب تغییرات (درصد)	۷/۵۲	۵/۵۲	۵/۳۶	۱۵/۴	۳/۴۱	۱۷/۲۲	۲/۴۱

* معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد * معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد ns عدم اختلاف معنی دار

جدول ۴- مقایسه میانگین عملکرد دانه، اجزای عملکرد و سایر صفات اندازه‌گیری شده ژنوتیپ‌های کلزا تحت تاثیر تاریخ‌های مختلف کاشت

تیمار	تعداد خورجین در بوته	تعداد دانه در خورجین	وزن هزار دانه (گرم)	عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)	محتوی روغن (درصد)	عملکرد روغن (کیلوگرم در هکتار)	ارتفاع بوته (سانتی متر)	روز تا شروع گل (روز)
سال								
سال اول	۲۰۶ ^a	۲۱ ^a	۲/۹۷ ^a	۲۶۶۶ ^a	۴۲/۷۵ ^a	۱۱۶۹ ^a	۱۴۷ ^a	۹۲ ^a
سال دوم	۲۱۳ ^a	۲۲ ^a	۲/۹۴ ^a	۲۱۵۱ ^a	۴۰/۷۵ ^b	۸۸۲ ^b	۱۴۵ ^a	۸۸ ^b
تاریخ کاشت								
۱۰ آبان	۲۴۹ ^a	۲۴ ^a	۳/۰۴۳ ^a	۲۹۸۹ ^a	۴۲ ^a	۱۲۷۴ ^a	۱۵۸ ^a	۹۹ ^a
۲۵ آبان	۲۱۶ ^b	۲۳ ^a	۲/۸۱۸ ^b	۲۳۶۲ ^b	۴۲ ^a	۹۸۷ ^b	۱۵۳ ^a	۹۸ ^a
۱۰ آذر	۱۹۲ ^c	۲۱ ^b	۳/۰۹۳ ^a	۲۴۷۰ ^b	۴۳ ^a	۱۰۵۲ ^b	۱۴۱ ^b	۸۶ ^b
۲۵ آذر	۱۶۰ ^d	۱۹ ^b	۲/۷۷۳ ^b	۱۸۲۹ ^c	۴۲ ^a	۷۹۴ ^c	۱۳۱ ^c	۷۶ ^c
ژنوتیپ								
رقم آر جی اس	۲۱۱ ^a	۲۱ ^b	۲/۷۴ ^b	۲۴۵۳ ^b	۴۲ ^b	۱۰۳۹ ^b	۱۴۲ ^c	۸۸ ^c
هیبرید هایولا ۴۰۱	۲۰۴ ^{ab}	۲۰ ^b	۳/۴۴ ^a	۲۷۰۱ ^a	۴۴ ^a	۱۱۹۰ ^a	۱۳۴ ^d	۸۶ ^d
لاین PP-308/8	۱۹۶ ^b	۲۲ ^a	۲/۷۵ ^b	۲۲۵۵ ^b	۴۱ ^b	۹۳۷ ^b	۱۵۲ ^b	۹۳ ^a
لاین PR/401-15E	۲۰۶ ^a	۲۱ ^b	۲/۷۴ ^b	۲۲۴۱ ^b	۴۲ ^b	۹۴۲ ^b	۱۴۲ ^c	۹۰ ^b

در هر ستون میانگین‌هایی که دارای یک حرف مشترک می‌باشند از نظر آماری در سطح احتمال ۵ درصد تفاوت معنی دار ندارند.

جدول ۴- مقایسه میانگین عملکرد دانه، اجزای عملکرد و سایر صفات اندازه‌گیری شده ژنوتیپ‌های کلزا تحت تاثیر تاریخ‌های مختلف کاشت


تیمار	تعداد خورجین در بوته	تعداد دانه در خورجین	وزن هزار دانه (گرم)	عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)	محتوی روغن (درصد)	عملکرد روغن (کیلوگرم در هکتار)	ارتفاع بوته (سانتی متر)	روز تا شروع گل (روز)
سال								
سال اول	۲۰۶ ^a	۲۱ ^a	۲/۹۷ ^a	۲۶۶۶ ^a	۴۲/۷۵ ^a	۱۱۶۹ ^a	۱۴۷ ^a	۹۲ ^a
سال دوم	۲۱۳ ^a	۲۲ ^a	۲/۹۴ ^a	۲۱۵۱ ^a	۴۰/۷۵ ^b	۸۸۲ ^b	۱۴۵ ^a	۸۸ ^b
تاریخ کاشت								
۱۰ آبان	۲۴۹ ^a	۲۴ ^a	۳/۰۴۳ ^a	۲۹۸۹ ^a	۴۲ ^a	۱۲۷۴ ^a	۱۵۸ ^a	۹۹ ^a
۲۵ آبان	۲۱۶ ^b	۲۳ ^a	۲/۸۱۸ ^b	۲۳۶۲ ^b	۴۲ ^a	۹۸۷ ^b	۱۵۳ ^a	۹۸ ^a
۱۰ آذر	۱۹۲ ^c	۲۱ ^b	۳/۰۹۳ ^a	۲۴۷۰ ^b	۴۳ ^a	۱۰۵۲ ^b	۱۴۱ ^b	۸۶ ^b
۲۵ آذر	۱۶۰ ^d	۱۹ ^b	۲/۷۷۳ ^b	۱۸۲۹ ^c	۴۲ ^a	۷۹۴ ^c	۱۳۱ ^c	۷۶ ^c
ژنوتیپ								
رقم آر جی اس	۲۱۱ ^a	۲۱ ^b	۲/۷۴ ^b	۲۴۵۳ ^b	۴۲ ^b	۱۰۳۹ ^b	۱۴۲ ^c	۸۸ ^c
هیبرید هایولا ۴۰۱	۲۰۴ ^{ab}	۲۰ ^b	۳/۴۴ ^a	۲۷۰۱ ^a	۴۴ ^a	۱۱۹۰ ^a	۱۳۴ ^d	۸۶ ^d
لاین PP-308/8	۱۹۶ ^b	۲۲ ^a	۲/۷۵ ^b	۲۲۵۵ ^b	۴۱ ^b	۹۳۷ ^b	۱۵۲ ^b	۹۳ ^a
لاین PR/401-15E	۲۰۶ ^a	۲۱ ^b	۲/۷۴ ^b	۲۲۴۱ ^b	۴۲ ^b	۹۴۲ ^b	۱۴۲ ^c	۹۰ ^b

در هر ستون میانگین‌هایی که دارای یک حرف مشترک می‌باشند از نظر آماری در سطح احتمال ۵ درصد تفاوت معنی دار ندارند.

جدول ۵- ضرایب همبستگی ساده بین عملکرد دانه و سایر صفات مورد بررسی

صفات	عملکرد دانه	تعداد خورجین در بوته	تعداد دانه در خورجین	وزن هزار دانه	درصد روغن	عملکرد روغن	روز تا شروع گلدهی	ارتفاع
تعداد خورجین در بوته	۰/۸۲**	۱						
تعداد دانه در خورجین	۰/۶۲**	۰/۸۵**	۱					
وزن هزار دانه	۰/۶۱**	۰/۲۰ ^{ns}	-۰/۰۴ ^{ns}	۱				
درصد روغن	۰/۵۱*	-۰/۱۲ ^{ns}	-۰/۱۳ ^{ns}	۰/۷۷**	۱			
عملکرد روغن	۰/۹۸**	۰/۷۶**	۰/۵۳*	۰/۶۸**	۰/۶۲**	۱		
روز تا شروع گلدهی	۰/۵۹**	۰/۸۶**	۰/۹۴**	-۰/۰۴ ^{ns}	-۰/۲۱ ^{ns}	۰/۴۹*	۱	
ارتفاع	۰/۳۵ ^{ns}	۰/۷۱**	۰/۹۱**	-۰/۳۳ ^{ns}	-۰/۳۳ ^{ns}	۰/۲۴ ^{ns}	۰/۱۸۶**	۱

**معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد *معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد ns عدم معنی



1. Abrahemi M., Akbari Gh. A., Akbari Gh. A., and Samadi Firozabadi B. (2012). Effect of sowing date on seed yield and its components of canola cultivars in varamin region in iran. *Seed and Plant* 28: 68-80. (In Persian).
2. Adamsen F. J. and Coffelt T. A. (2005). Planting date effects on flowering seed yield and oil content of rape and crambe cultivars. *Ind. Crops Production*. 21: 293-307.
3. Anvare M. T. (1996). Study sowing of date effect on yield and yield components of winter rapeseed cultivars. M.Sc. Thesis, Gorgan University Agric Sci and Natur Resour. Pp. 76. (In Persian).
4. Cheema. M. A., Malik, A., Hussain, S., Shah, R., and Basra, S. (2001). Effects of time and rate of nitrogen and phosphorus application on the growth and the seed and oil yields of canola (*Brassica napus L.*). *Journal of Agronomy and Crop Science* 186:
5. Fallah Heki M. H. Yadavi A. R. Movahhedi Dehnavi M. and Balouchi H. R. (2010). Evaluation of oil, protein and grain yield of canola cultivars in different planting date in Yasouj region. *Electronic Journal of Crop Production (in Persian)*. 4 (2): 207-222
6. FAO (2007). *Agricultural Data, FAOSTAT*. Available at Food and Agriculture Organization of the United Nations. <http://faostat.fao.org/faostat/collections>.
7. Fanaie H. R. Ghanbari A. Akbarimoghdam H. Souloki M. Narouirad MR. (2008). Yield comparison and yield components and some agronomic traits of rapeseed varieties in Sistan region. *Pajhoesh and Sazandaki in Agronomy and Horticultuer (in Persian)* 79:36-44
8. Fanaei H. R. Galavi M. Ghanbari Bongar A. Solouki M. and Naruoiei-Rad M. R. (2008). Effect of planting date and seeding rate on grain yield and yield components in two rapeseed (*Brassica napus L.*) cultivars under Sistan conditions. *Iranian J. Crop Sci.* 10(2): 15-30.
9. Faraji A. (2005). Determin response phenology of spring genotypes canola to temperatuer, planting date and photo-period. *Seed and Plant J* 26:25-43
10. Farre I. Robertson M. J. Walton GH. and Asseng S. 2002. Simulating phenology and yield response of canola to sowing date in western Australia. *Australian Journal Experiment Agricultural*.53:1155-1164.
11. Gunasekera C. P. Martin L. D. Siddique K. H. M. and Walton G. H. (2006). Genotype by environment interactions of Indian mustard (*Brassica juncea L.*) and canola (*Brassica. napus L.*) in Mediteranean-type environments. *Crop Growth and Seed Yield. European Journal of Agronomy*. 25:1-12.
12. Jeromela, A. M., Marinkovic, R., Mijic, A., Jankulovskaand, M and Dunic, Z. Z. 2007. Inter relationship between oil yield and other quantitative traits in rapeseed (*Brassica napus L.*). *Journal of Central European Agriculture*. Vol 8 :2.
13. Khajepour M. R. (2001). *Principals and Essentials of Crop Production*. JD Press. Isfahan University. Pp. 201. (In Persian)
14. Koocheki A. R. and Khajeh Hosseini M. (2008). *Modern Agronomy*. Jihad-e university of Mashhad press.
15. Lunn G. D. Spink J. H. Stores D. T. Clare R. W. Wade A. and Scott R. K. (2001). *Canopy management in winter oil seed rape*. Project report No.OS 47 Home. Grown Ceraals Authority, London.
16. Mahmmud Abadie A. Azizi M. and Gazachian A. (2008). Effect of sowing date on agronomic traits winter cultivars of canola in Bejnourd. *Proceeding of the 10th Iranian Crop Plant Sciences Congress*. Pp. 378
17. Mendham N. J. Russell J. and Jarosz N. K. (1990). Responses to sowing time of three contrasting Australian cultivars of oilseeds rape (*Brassica napus L.*) *The Journal of Agricultural Science Cambridge*. 114: 275-283.
18. Mendham N. J. Shipway P. A. and Scott K. K. (1981). The effects of seed size autumn nitrogen and plant population

- density. J. Agric. Sci. Camb. 96: 414-428.
19. Mirzaei M. Dashti SH. Absalan M. Siadat A. and Fathi Gh. (2010). Study the effect of planting dates on the yield, yield components and oil content of canola cultivars (*Brassica napus L.*) in Dehloran rejoin. Electronic Journal of Crop Production (in Persian). 3 (2): 159-176
 20. Ozer H. 2003. Sowing date and nitrogen rate effects on growth, yield and yield components of two summer rapeseed cultivars. European Journal of Agronomy. 19: 453-463.
 21. Robertson M. J. Holland J. F. and Bambach R. (2004). Response of canola and Indian Mustard to sowing date in the grain belt of north-eastern Australia. Australian Journal Experiment Agricultural. 44:43-52
 22. Scarth R. and Tang J. (2006). Modification of brassica oil using conventional and transgenic approaches. Crop Science. 46: 1225-1236
 23. Si P. and Walton H. (2004). Determinants of oil concentration and seed yield in canola and Indian mustard in the lower rainfall areas of Western Australia. Australian Journal Experiment Agricultural. 55: 367-377
 24. Shiranirad A. H and Ahmadi M. R. (1997). The effect of seeding date and plant density on growth two of canola varieties. M.Sc. Thesis, Tehran University. Journal Agriculture Sciences of Iran. 28:25-4
 25. Tusar P. Maiti S. and Mitra B. (2006). Variability, correlation and path analysis of the yield attributing characters of mustard (*Brassica spp.*). Reserch on Crops. 7(1): 191-193.
 26. Whitfield D. M. (1992). Effects of temperature and ageing on CO₂ exchange of pods of oilseed rape (*Brassica napus*). Field Crops Reserch. 28:271-280.