

بررسی نگرش و موانع احتمالی تاخیر در اقدام برای دریافت واکسن نوبت سوم (یادآور) کرونا در شهرستان سیاهکل

- مریم لاری سیاهکل*^۱، طاهره زاهدصفت^۲، دکتر محمد رضا شیری^۳، علیرضا محسنیپورفومنی^۴،
۱- کارشناس پرستاری، کارشناس آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیاهکل m.lari33@chmail.ir
۲- کارشناس پرستاری، کارشناس ارشد MBA، مدیر امور خدمات پرستاری گیلان Taherehzahedsefat@yahoo.com
۳- متخصص اطفال، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیاهکل arsidshiri@gmail.com
۴- کارشناس پرستاری، کارشناسی ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی، سازمان تامین اجتماعی تهران alirezamfoumany@gmail.com

مقدمه

طبق یافته‌های پژوهشی واکسیناسیون همگانی راهکار مقابله با اپیدمی کووید-۱۹ است با این حال، عده‌ای از افراد جامعه تمایل به تزریق واکسن ندارند
روش تحقیق: مطالعه حاضر به روش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود و بر روی ۲۰۰ نفر از ساکنین شهرستان سیاهکل با نمونه‌گیری داوطلبانه‌انگیزه‌های عدم تمایل به دریافت واکسن نوبت سوم (یادآور) در بین ۳۹۹۰۷ نفر از جمعیت بالای ۱۸ سال تحت پوشش شهرستان سیاهکل بر اساس مصاحبه تلفنی انجام شده توسط مراقبین سلامت و بهورزان شاغل در سطح شهرستان پس از استخراج مشخصات کلیه افرادی از جمعیت تحت پوشش خود که نوبت سوم واکسن کرونا خود را در موعد مقرر دریافت نکرده‌اند از سامانه سیب و سپس پیگیری تلفنی از آنان ماه لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ و بر اساس اظهارات مصاحبه‌شوندگان به شرح ذیل می‌باشد اجرا شد و از گمانی همچون مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از این تحقیقات نشان می‌دهد.

ردیف	دلایل امتناع افراد واجد شرایط واکسیناسیون نوبت سوم	تعداد	درصد
1	دو نوبت کافی است	0	0.0
2	ترس از عوارض واکسن	10	5.6
3	مسافرت	0	0.0
4	مشغله زیاد و فراموشی	40	22.2
5	در انتظار واکسن	0	0.0
6	عدم تمایل	0	0.0
7	بیمار شدن فرد و اطرافیان پس از دریافت دو دوز واکسن	0	0.0

44.4	80	کمبود واکسن های تأثیر گذار از نظر مردم همانند آسترازینکا واسپوتنیک و پاستو کووک	8
0.0	0	قبول نداشتن واکسن ها و باور به تأثیر گذاری بیشتر طب خانگی و سنتی	9
27.8	50	شایعات موجود در جامعه مبنی بر عدم تأثیر واکسن ها	10
0.0	0	عدم اطلاع از زمان تزریق مرحله سوم واکسن	11
0.0	0	برودت هوا	12
0.0	0	ناتوانی و کهولت سن	13
0.0	0	سهل انگاری	14
0.0	0	ترس از عوارض واکسن در دوره بارداری و بعد از زایمان	15
0.0	0	منتظر تماس تلفنی بهورز و مراقب سلامت	16
0.0	0	نابرابری در زنان و مردان	17
0.0	0	تزریق شده اما در سامانه سیب ثبت نشده	18
0.0	0	عدم دسترسی	19
0.0	0	مخالفت والدین	20
0.0	0	عدم اعتقاد به وجود بیماری کرونا	21
0.0	0	عدم پاسخگویی به تلفن	22
100.0	180	جمع نمونه بدون احتساب دلایل پزشکی	
55	110	زن	تعداد حجم نمونه با احتساب دلایل پزشکی
45	90	مرد	
62.5	125	شهری	
37.5	75	روستایی	

100	200	کل حجم نمونه	
-----	-----	--------------	--

بحث و نتیجه‌گیری:

به نظر می‌رسد مهمترین عامل برای تشویق و ترغیب مردم به تزریق واکسن، آموزش صحیح و مداوم و کنترل منابع نامعتبر و مبارزه با پخش شایعات و حمایت حقیقی و گسترده کلیه رسانه‌های (صدا و سیما، تبلیغات محیطی، گروه‌ها و کانال‌ها در شبکه فضای مجازی، رسانه‌های دیداری شنیداری، مکتوب و غیر مکتوب و دیجیتال و محلی) برای تشویق مردم به واکسیناسیون و جدی گرفتن بیماری کرونا و عوارض و عواقب آن می‌باشد.

*با توجه به اینکه در بررسی حاضر و اعلام نتایج بررسی‌های مشابه در بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، یکی از دلایل عمده عدم دریافت واکسن را مردم ترس از عوارض واکسن ذکر نموده‌اند و همچنین عدم اعتقاد به دریافت واکسن نوبت سوم، عدم اعتماد کافی به واکسن‌های موجود، قبول نداشتن واکسن‌ها و باور به تأثیر گذاری بیشتر طب خانگی و سنتی از سایر علل و عوامل موجود بوده است، لذا راهکارهای اجرایی ذیل جهت اقناع سازی پیشنهاد می‌گردد.

منابع:

۱_ کشمیری سعید، دارابی امیر حسین، طهماسبی رحیم، وحدت کتایون، نوروزی آزیتا. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش واکسن کووید-۱۹ براساس الگوی چرخه تغییر رفتار در استان بوشهر در سال ۱۳۹۹: مطالعه‌ای در بستر وب. حیات. ۱۴۰۰؛ ۲۷ (۲) ۲۰۵-۱۹۰:

URL: <http://hayat.tums.ac.ir/article-۱-۴۱۳۸-fa.html>

۲- وحدت ازیتا، نوروزی کتایون، طهماسبی رحیم، دارابی امیرحسین، کشمیری سعید

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش واکسن کووید-۱۹ براساس الگوی چرخه تغییر رفتار در استان بوشهر در سال ۱۳۹۹: مطالعه‌ای در بستر وب فصلنامه حیات فصلنامه پزشکی

واژگان کلیدی: واکسن کووید، نوبت سوم، عدم تمایل