

دررفتگی مادرزادی زانو ، جا اندازی در ۲۴ ساعت اول بعد از تولد

رویافرهادی*^۱، محمدحسین کریمی نسب^۲، فرزاد مختاری اسبویی^۳

۱. فوق تخصص نوزادان، گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مازندران dr.royafarhadi@gmail.com

۲. گروه ارتوپدی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۳. کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مقدمه : دررفتگی مادرزادی مفصل زانو یک ناهنجاری مادرزادی اسکلتی نادر است که احتمال وقوع آن یک مورد از هر ۱۰۰۰۰۰ تولد زنده است. تشخیص با مشاهده و معاینه بالینی انجام می گیرد. طبق برخی مطالعات بهترین زمان درمان دررفتگی مادرزادی زانو در ۲۴ ساعت اول است و تاخیر در درمان سبب سخت تر شدن درمان می شود، اما برخی محققین توصیه به انتظار و فرصت برای بهبود خودبخودی می نمایند. هدف از این گزارش تاکید بر درمان بدون تاخیر دررفتگی مادرزادی زانو و بررسی و معاینه دقیق جهت رد اختلالات همراه است

معرفی بیمار: بیمار ما نوزاد پسری است که در بدو تولد دچار در رفتگی مادرزادی زانوی چپ بوده است. بعد از تشخیص در ۲۴ ساعت اول بعد از تولد جاناندازی با موفقیت صورت گرفت و سپس گچ گیری سریالی انجام شد. بعد از یکسال پیگیری، حرکات زانوی بیمار نرمال است.

نتیجه گیری : به نظر میرسد در این بیماری هرچه درمان دیرتر آغاز شود جاناندازی جابجایی سخت تر میشود و بهترین زمان جا اندازی ۸ ساعت اول بعد از تولد است. درمان بدون تاخیر بعد از تولد در این ناهنجاری می تواند سبب بهبود پروگنوز بیماری شده و همچنین سبب کاهش اضطراب و نگرانی خانواده و جلوگیری از به تعویق افتادن درمان به دلیل ترس خانواده می شود.

واژه های کلیدی: نوزاد، در رفتگی مادرزادی، زان