

بررسی شیوع عفونتهای سرویکوواژینال و ارتباط آن با برخی عوامل فردی و خانوادگی در شهر فردوس در شش ماهه اول ۱۳۹۲

آزاده زارعی^۱، سیده خدیجه رضوی باباحیدری^۱، علی عالمی^۲، علی دلشاد نوقابی^۳، مجید شکوهی برآبادی (ارائه

دهنده)^۴

۱. دانشجوی کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
۲. استادیار و دکترای اپیدمیولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
۳. مربی و کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
۴. دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

زمینه و هدف:

عفونت های سرویکوواژینال از جمله شایع ترین علل ویزیت زنان در درمانگاه های زنان و مراکز بهداشتی درمانی می باشد، لذا مطالعه ی حاضر با هدف تعیین شیوع عفونتهای سرویکوواژینال و ارتباط آن با برخی عوامل فردی و خانوادگی در شهرستان فردوس در شش ماهه اول ۱۳۹۲ انجام شد.

مواد و روش ها :

در این مطالعه مقطعی-تحلیلی ۴۴۳ خانم در سنین بالای ۱۵ سال ازدواج کرده تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر فردوس که به صورت سرشماری انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از چک لیست جمع آوری و سپس با نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ و آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی آماری Tتست و کای اسکور مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

یافته ها :

نتایج نشان داد که میزان شیوع کاندیدیازیس ۴۵.۴٪، تریکومونیازیس ۱۱.۱٪ و واژینوزباکتریال ۶.۳٪ بود. ارتباط معناداری بین عفونت های سرویکوواژینال با سطح تحصیلات و شغل آزمودنی ها، سطح تحصیلات و شغل همسر آزمودنی ها، میانگین سن و میانگین تعداد زایمان در آزمودنی ها یافت شد.

نتیجه گیری :

براساس یافته های این مطالعه شیوع عفونتهای تناسلی تحتانی در گزارشهای پاپ اسمیر ۶۲.۸ درصد می باشد. ماماها و سایر متخصصان بهداشتی و درمانی می توانند با دادن آگاهی بیشتر از این عفونتها و عوامل خطر ساز آنها به زنان، نقش مهمی در ارتقاء کیفیت زندگی آنان، داشته باشند.

واژه های کلیدی:

شیوع، عفونت سرویکوواژینال، عوامل خانوادگی، عوامل فردی.