

بررسی ریسک فاکتورهای موثر در ابتلاء سرطان پستان در زنان ساکن شهرستان سمنان در سال ۱۳۹۳

هادی، زارع می‌زنی، ۱، معصومه فهیمی، (ارائه دهنده) ۲

۱. کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - مشهد - ایران

۲. کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل - بابل - ایران

زمنیہ و هدف:

سرطان مشکل عمده بهداشتی در بسیاری از کشورهای دنیا محسوب میشود. سرطان پستان، شایع ترین سرطان در میان زنان است. میزان سرطان پستان در ایران تقریباً ۲۰ مورد جدید در هر ۱۰۰ هزار زن در سال تخمین زده شده است. گرچه نمیتوان از بروز سرطان پستان جلوگیری کرد اما آگاهی از عوامل موثر در ایجاد این بیماری میتواند تاثیر بسزایی در بهسازی عادات نادرست افراد، و تلاش در برطرف کردن این عوامل داشته باشد. با توجه به نقش غربالگری در تشخیص زودرس سرطان پستان، مطالعه حاضر با هدف بررسی سنچش ریسک فاکتورهای ابتلاء به سرطان پستان در جامعه زنان شهرستان سمنان طراحی گردید.

مواد و روش ها:

این پژوهش، یک مطالعه توصیفی- مقطعی بوده که بر روی ۳۵۰ زن تا ۶۹ ساله ای ساکن شهرستان سمنان بودند، و به روش خوشه ای ساده، وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه شامل ۴ بخش: فرم رضایت نامه، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، سنجش ریسک فاکتور های ابتلا به سرطان پستان و آگاهی از راههای تشخیص زودرس بود که توسط مجریان خانم طرح به آنان تحویل داده شد. متغیر های مطالعه شامل اطلاعات دموگرافیک، سابقه ابتلا به سرطان، مصرف داروهای استروژنی، سابقه نازایی و... بود. معیار ورود نمونه ها در این مطالعه شامل همه زنان ۶۹ تا ۱۹ ساله ساکن سمنان و معیارهای خروج نمونه ها کامل پرنکردن پرسشنامه و عدم رضایت برای شرکت بود. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار spss 13 استفاده شده است. در قسمت آمار توصیفی از شاخص های میانگین، فراوانی مطلق و نسبی استفاده شد. در بخش آمار استنباطی، جهت پرورسی، دانسته بنده از آزمون independent-sample T test استفاده شد.

مافتھا:

میانگین سنی زنان در این مطالعه  $41.1 \pm 1.3$  بود. ۶۷.۱٪ آنها متاهل و ۴۴.۵٪ آنها دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر بودند. ۶۱.۸٪ خانه دار و بقیه شاغل و یا دانشجو بودند. از این افراد، ۱۸٪ سابقه سرطان پستان را در خود یا یکی از افراد خانواده (مادر، خواهر، خاله، عمه، مادر بزرگ) داشتند. ۲.۶٪ افراد شرکت کننده دچار نازایی بودند. ۴.۲٪ آنها زایمان، سزاوین، داشته و ۲٪ آنها به نوزادان خود شب مادر ندادند.

( $p=0.029$ )، ( $p=0.018$ ) و ( $p=0.029$ ) تحقیقات معناداری وجود داشت. اطیه معناداری، وحدت داشت. ( $p=0.03$ )، ( $p=0.029$ ) و ( $p=0.018$ ) میزان مصرف داروهای استروژنی، کم تحرک بودن، نازایی سابقهٔ ابتلا به سرطان پستان تحقیصات، اطیه معناداری، وحدت داشت. ( $p=0.108$ ) بین مصرف داروهای استروژنی، کم تحرک بودن، نازایی سابقهٔ ابتلا به سرطان پستان معناداری وجود نداشت.

نتحه گز،

با توجه به شیوع بالای سرطان پستان در ایران، و همچنین با توجه تعیین ریسک فاکتورهای ابتلا به سرطان پستان در زنان سمنان حاصل از این تحقیق، بنظر میرسد سیاستگذاران و برنامه ریزان بهداشتی این شهرستان می‌توانند با تدوین برنامه آموزشی در رابطه با آشنازی زنان جامعه در زمینه‌ی آموزش فاکتورهای خطرزا ابتلا به سرطان پستان، جهت ارتقای سطح آگاهی، و عملکرد بهت زنان، در مواد تشخیصی، زودرس، سرطان، پستان، مفید باشند.

**وازه های کلیدی:** سرطان، بیستان، ریسک فاکتور، زنان