

اثرات جانبی داروی اینترفرون -آلفا بر روی بیماری هپاتیت B مزمن: مروری

مهشید مبلغ ناصری^۱

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. m.moballeghnase@kmu.ac.ir

انگیزه و بیان مساله: هپاتیت B از شایع ترین بیماری های مزمن کبدی در سراسر جهان است و علت اصلی سیروز کبدی و سرطان های هپاتوسلولار می باشد. تخمین زده می شود که نزدیک به ۲۴۰ تا ۳۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتلا باشند و از این بین نزدیک به ۱ میلیون نفر به مرگ منجر می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات جانبی داروی اینترفرون -آلفا بر روی بیماری هپاتیت B مزمن است.

روش: مطالعه پیش رو نتیجه ی جستجو در پایگاه داده Pubmed و Springer بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ و پایگاه داده ی SID بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ می باشد و با تاکید بر داروی اینترفرون-آلفا و اثر آن بر روی هپاتیت B صورت گرفته است.

یافته های پژوهش: در حال حاضر برای درمان هپاتیت B هفت دارو وجود دارد که یکی از آن ها اینترفرون -آلفا می باشد و اثر آن با اندازه گیری آنتی ژن های سطحی (HBsAg) که مشخصه ی اصلی بیماری است در سرم بیمار انجام می شود. داروی اینترفرون-آلفا دارای عوارض جانبی است که در بیماران مختلف دارای درجات مختلف است. از جمله این عوارض میتوان به علائم شبه آنفلوآنزا، ریزش مو، تحریک پذیری و افسردگی اشاره کرد. که مهمترین عارضه افسردگی می باشد و کیفیت زندگی بیمار را بیش از موارد دیگر تحت تاثیر قرار می دهد.

نتیجه گیری: برای بیمار باید قبل از شروع به درمان با داروی اینترفرون -آلفا تست های روانشناسی انجام بگیرد و بیمار در مدت درمان نیز تحت مراقبت باشد تا در صورت بروز افسردگی درمان شود و این عارضه با دارو های کمکی اصلاح گردد.

کلمات کلیدی: اینترفرون-هپاتیت B-عوارض جانبی-interferon- hepatitis B- side effect